

«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель Министра
здравоохранения
Республики Беларусь


Б.Н. Андросюк
«08» 20 г.



ИНСТРУКЦИЯ
по применению спрея для слизистой оболочки полости рта
ФИТОСПРЕЙ

«СОГЛАСОВАНО»
Заместитель директора
УДТ «Центр экспертиз
и испытаний в здравоохранении»
Д.В. Гринько
«08» 20 г.

«СОГЛАСОВАНО»
Директор
ООО «Рубикон»
В.Л. Фарбер
«05» 20 г.



«СОГЛАСОВАНО»
Директор
ГУ «Республиканский
научно-практический
центр оториноларингологии»
Н.И. Гребень
« » 20 г.



«СОГЛАСОВАНО»
Главный врач
УЗ «4-я городская клиническая
больница им. И.Е. Савченко»
В.Я. Янушко
« » 20 г.



«СОГЛАСОВАНО»
Главный врач
УЗ «Витебская областная клиническая
больница»
А.В. Андрюшкин
«02» 20 г.



ИНСТРУКЦИЯ
по применению спрея для слизистой оболочки полости рта
ФИТОСПРЕЙ

Форма выпуска: спрей для слизистой оболочки полости рта.

Описание: красно-оранжевая маслянистая жидкость с запахом бергамота.

Фитоспрей - средство, содержащее натуральные масла. При применении покрывает слизистую оболочку полости рта и горла. Поддерживает слизистую влажной и упругой, уменьшает ощущение дискомфорта и боль в горле, облегчает процесс глотания.

Состав: облепиховое масло, масло календулы, масло бергамота, бета-каротин суспензия 30 %, подсолнечное масло.

Показания к применению:

Средство используют для ухода за полостью рта и горла, для уменьшения раздражения слизистой оболочки или в случаях воспаления.

Форма распыляющего устройства Фитоспрей обеспечивает однородное попадание средства на слизистую оболочку и точную дозировку, в свою очередь, масляная основа покрывает слизистую оболочку, предотвращая проникновение новых инфекций.

Способ применения:

1. Возьмите в руку бутылку и встряхните.
2. Снимите колпачок с распылителя.
3. Направьте бутылку распылителем к себе.
4. Поверните наконечник распылителя против часовой стрелки под углом в 90 градусов.
5. Поместите распылитель в рот.
6. Распылите Фитоспрей в полость рта, нажав крышку распылителя 4-6 раза. Держите бутылку вертикально! При нажатии крышки распылителя один раз распыляется примерно 100 мг средства.
7. После употребления вытрите наконечник распылителя бумажной салфеткой и поверните наконечник распылителя в первоначальную позицию. Наденьте колпачок на распылитель.

Средство предназначено для применения одним пользователем.
Использовать 3 раза в день. Желательно повторно распылять средство после еды или питья, чтобы восстановить слой, покрывающий слизистую оболочку полости рта и глотки.

Средство применяют до исчезновения симптомов болезни. Если симптомы (ощущение дискомфорта, боль в горле) не проходят после недели использования данного средства, следует проконсультироваться с врачом.

Можно применять детям с 2-х лет, детям до 6-ти лет применять под присмотром родителей.

Важно: Вскрытый флакон не использовать по истечении 3-х месяцев.

Внимание! При попадании на одежду могут появиться пятна.

Меры предосторожности:

Не использовать при повышенной чувствительности (аллергии) к какому-либо компоненту продукта.

При случайном попадании средства в глаза, незамедлительно промыть глаза проточной водой и проконсультироваться с врачом.

Условия хранения: Хранить в сухом, в защищенном от света месте, в плотно закрытой оригинальной упаковке, при комнатной температуре не выше 25 °C. *Хранить в недоступном для детей месте!*

Срок годности: 2 года.

Упаковка: По 30 мл во флаконы пластиковые или янтарного стекла с насадкой-распылителем для спрея в пачке картонной с инструкцией по применению.

Производитель:

ООО «Рубикон», РБ, 210002, г. Витебск, ул. М. Горького, 62Б,
тел.: +375 (212) 36-47-77; тел./факс: +375 (212) 36-37-06, www.rubikon.by,
e-mail: secretar@rubikon.by

