

ИНСТРУКЦИЯ**по медицинскому применению лекарственного препарата***(листок-вкладыш)***ГЛИЦЕРИН**

- *Внимательно прочитайте весь листок-вкладыш перед тем, как начать использование этого лекарственного средства, так как он содержит важную для Вас информацию.*
- *Сохраните этот листок-вкладыш. Возможно, Вам понадобится прочесть его снова.*
- *Если у Вас возникли дополнительные вопросы, пожалуйста, проконсультируйтесь с Вашим лечащим врачом.*

Торговое название препарата Глицерин**Международное непатентованное название Глицерол****Лекарственная форма: суппозитории ректальные****Состав**

В 1 суппозитории содержится:

Действующее вещество: глицерин (глицерол) - 1,24 г;*Вспомогательные вещества:* макрогол 400, стеариновая кислота 95, натрия карбонат декагидрат.**Описание**

Суппозитории торпедообразной формы, прозрачные или полупрозрачные, почти бесцветные или с желтовато-коричневатым оттенком цвета, с мажущейся поверхностью, гигроскопичны. Допускается наличие воронкообразного углубления с незначительным количеством пузырьков воздуха.

Фармакотерапевтическая группа

Прочие слабительные средства.

Код АТХ: А06АХ01.

Фармакологические свойства



Слабительное средство, смягчает и смазывает затвердевшие фекальные массы, облегчает их прохождение по толстой кишке, оказывает раздражающее действие на слизистую оболочку кишечника, рефлекторно стимулируя моторику кишечника.

Фармакокинетика

Практически не всасывается при ректальном применении.

Показания к применению

Симптоматическое лечение запоров различной этиологии.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам лекарственного средства; кишечная непроходимость, синдром раздражённого кишечника, аппендицит, желудочно-кишечное кровотечение, воспалительные заболевания прямой кишки (проктит, парапроктит), геморрой (фаза обострения), геморрагический ректоколит, опухоли прямой кишки, недиагностированная боль в животе.

Способ применения и дозы

Ректально, через 15-20 минут после приема пищи.

Детям с 3 до 7 лет - по 1 суппозиторию (1,24 г) 1 раз в сутки.

При необходимости применения у взрослых и детей старше 7 лет - по 2 суппозитория (1,24 г) 1 раз в сутки.

Продолжительность применения не должна превышать 7 дней. Длительность лечения определяется врачом индивидуально для каждого пациента с учётом особенностей заболевания, переносимости лекарственного средства и достигнутого лечебного эффекта.

Побочное действие

Аллергические реакции; местные реакции в месте введения суппозитория (чувство дискомфорта, зуд, жжение); спазмы кишечника. При длительном применении - ослабление физиологического процесса дефекации.

У пациентов с обезвоживанием после применения глицерина в виде суппозитория возможно развитие тяжёлой дегидратации, приводящей к сердечно-сосудистой недостаточности и отёку лёгких. Описаны случаи развития некетотической гиперосмолярной гипергликемической комы, которая может привести к летальному исходу.

В случае возникновения побочных реакций, в том числе не указанных в данной инструкции, следует прекратить применение лекарственного средства и обратиться к врачу.

Передозировка

О случаях передозировки при применении препарата Глицерин суппозитории ректальные не сообщалось. При правильном применении передозировка маловероятна.

Меры предосторожности

Не рекомендуется применять суппозитории более 7 дней. Систематическое применение не рекомендуется. Лечение прекращают после восстановления нормальной перистальтики кишечника.

Применять с осторожностью у пациентов с почечной недостаточностью, тошнотой и рвотой.

Не смазывать суппозитории минеральными жидкими или твёрдыми маслами.



При применении остатки суппозитория выводятся из кишечника с калом.

До и после применения суппозитория следует тщательно вымыть руки.

Применение у детей

Применение у детей младше 3 лет возможно только после консультации врача и исключения заболеваний, которые могли повлиять на задержку опорожнения кишечника.

Применение лекарственного средства у детей необходимо осуществлять под наблюдением врача.

Применение в период беременности или кормления грудью

Применение в период беременности и кормления грудью возможно только после консультации врача в случае, если польза для матери превышает возможный риск для плода/ребенка. Назначение лекарственного средства женщинам в течение первого триместра беременности не рекомендовано.

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

Данных о влиянии на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами нет.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Клинически значимые взаимодействия глицерола с другими лекарственными средствами не выявлены.

При одновременном применении других ректально вводимых лекарственных средств, следует учитывать слабительный эффект препарата. Суппозитории с глицерином могут ослабить действие лекарственных средств, которые применяются ректально. При необходимости использования других ректальных препаратов следует соблюдать интервал между их применением не менее 1 часа.

Форма выпуска

Суппозитории ректальные 1,24 г. 5 суппозитория помещают в контурную ячейковую упаковку из двухслойной пленки алюминий - полиэтилен. Две контурные ячейковые упаковки вместе с инструкцией по медицинскому применению лекарственного препарата помещают в пачку из картона.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25 °С.


Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

2 года. Не использовать препарат после истечения срока годности.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта.



Производитель/Претензии потребителей направлять по адресу:

АО «Нижфарм», Россия

603950, г. Нижний Новгород, ул. Салганская, д. 7

Тел.: (831) 278-80-88, факс: (831) 430-72-28

E-mail: med@stada.ru

