

0664 - 2021

ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ

**ИНСТРУКЦИЯ  
ПО ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА  
ТАНАКАН**

раствор для приема внутрь 40 мг/мл

**Международное непатентованное наименование:** Ginkgo folium

**СОГЛАСОВАНО**

МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
Республики Беларусь

Приказ Министерства здравоохранения  
Республики Беларусь

от « 18 » Октября 2011 г. № 158

КЛС № 1 от « 18 » Октября 2011 г.

**СОСТАВ** на 1 мл (1 дозу) в мг, мл:

**Активный ингредиент:**

Экстракт листьев Гинкго билоба стандартизованный сухой\*: ..... 40,000 мг

8,8 – 10,8 мг флавоногликозидов

1,1 – 1,4 мг гинкголидов А, В и С

1,0 – 1,3 мг билобалидов

**Вспомогательные вещества:**

Натрия сахаринат	.....	5,000 мг
Апельсиновая эссенция растворимая	.....	0,0075 мл
Лимонная эссенция растворимая	.....	0,0075 мл
Этанол	.....	0,5900 мл.
Вода очищенная	..... до	1,0000 мл

\* 1-й экстрагент: ацетон 60%

Соотношение сырья к полученному экстракту (DER) = 35-67:1

**Внимание: лекарственное средство содержит 57% этилового спирта, что составляет 0,45 г на один прием (одну дозу).**

**Описание:** Флакон коричневого стекла, содержащий жидкость коричнево-оранжевого цвета с характерным ароматическим запахом. При разведении - практически бесцветная ароматическая жидкость.

**ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:**

**Фармакотерапевтическая группа:** Прочие средства для лечения деменции.

**Код АТС:** N06DX02.

**Фармакодинамические свойства**

Механизм действия лекарственного средства не установлен.

В клинических исследованиях стандартизированного экстракта гинкго билоба продемонстрировано повышение церебральной активности по данным электроэнцефалограммы, снижение вязкости крови и агрегации тромбоцитов, увеличение перфузии в отдельных областях головного мозга у здоровых лиц в возрасте 60-70 лет. Также обнаружены сосудорасширяющие эффекты при исследовании кровеносных сосудов предплечий, что приводило к повышению регионального кровотока.

0664 - 2021

**ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:**

Симптоматическое лечение когнитивных расстройств у пациентов пожилого возраста, за исключением больных с подтвержденным диагнозом деменции, болезни Паркинсона, когнитивными расстройствами ятрогенного происхождения или вторичными когнитивными расстройствами вследствие депрессии или метаболических нарушений.

ТАНАКАН показан только для взрослых и лиц пожилого возраста.

**Способ применения и дозы:**


ТАНАКАН назначается по 1 мл раствора для приема внутрь 3 раза в сутки во время еды, растворяя в половине стакана воды.

Использовать пипетку - дозатор: 1 доза = 1 мл питьевого раствора = 40 мг чистого экстракта.

Длительность курса определяется врачом с учетом особенностей заболевания, переносимости лекарственного средства и достигнутого эффекта.

**Противопоказания:**

Гиперчувствительность к компонентам лекарственного средства.  
Беременность.  
Период кормления грудью.  
Детский возраст до 18 лет.

**Особые указания и предосторожности при применении:**

Перед началом применения препарата проконсультируйтесь с врачом.

Лекарственное средство ТАНАКАН, раствор для приема внутрь, содержит 57% этилового спирта (алкоголя), то есть до 450 мг на разовую дозу в 1 мл. Данное количество этилового спирта соответствует 11,3 мл пива или 4,7 мл вина на одну дозу. В связи с содержанием этилового спирта лекарственное средство представляет опасность при применении у больных алкоголизмом. Также данный факт следует учитывать при использовании препарата у беременных и кормящих женщин, детей до 18 лет, у пациентов с недостаточностью функции печени и эпилепсией (группы пациентов высокого риска).

С осторожностью следует назначать лекарственное средство одновременно с другими препаратами, метаболизм которых реализуется посредством цитохрома P450-3A4 (CYP3A4).

Пациентам с повышенным риском развития кровотечения (геморрагические диатезы), а также пациентам, принимающим антикоагулянтные и антиагрегантные средства, перед приемом лекарственного препарата следует проконсультироваться с врачом.

Лекарственные средства, содержащие гинкго билоба, могут увеличить риск развития кровотечения. Прием лекарственного препарата должен быть прекращен за 3-4 дня до оперативного вмешательства.

У пациентов с эпилепсией прием препаратов гинкго билоба может спровоцировать развитие судорожного приступа.

Не рекомендуется одновременное применение препаратов гинкго билоба и эфавиренза ( см. раздел «Взаимодействие с другими лекарственными средствами»).

Если во время приема лекарственного средства симптомы сохраняются или происходит ухудшение состояния, необходима консультация врача.

0664 - 2021

## Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие формы взаимодействий

Результаты клинических испытаний лекарственного взаимодействия EGb 761® продемонстрировали либо усиление, либо угнетение активности изоферментов цитохрома P450. Уровень мидазолама изменялся после введения EGb 761®, предположительно за счет их взаимодействия на CYP3A4. С осторожностью следует использовать препараты гинкго билоба с лекарственными средствами, метаболизм которых осуществляется через CYP3A4, а также с лекарствами, имеющими узкий терапевтический индекс.

Наличие в составе этанола: (0,45 г на 1 дозу) необходимо учитывать при одновременном применении со следующими лекарственными средствами:

- *Лекарственными средствами, вызывающими дисульфирамоподобную реакцию* (возникновение жара, покраснение кожных покровов, рвота, тахикардия) при совместном приеме с алкоголем:

дисульфирам, цефамандол, цефоперазон, лагамоксеф (антибактериальные средства группы цефалоспоринов), хлорамфеникол (антибактериальное средство), хлорпропамид, глибенкламид, глипизид, толбутамид (антидиабетические гипогликемические средства, производные сульфонилмочевины), гризофульвин (противогрибковое средство), нитро-5-имидаэолы (метронидазол, орнидазол, секнидазол, гинидазол), кетоконазол, прокарбазин (цитостатическое средство);

- *Лекарственными средствами, угнетающими функции центральной нервной системы.*

Необходимо избегать одновременного применения других лекарственных средств, содержащих этиловый спирт.

Лекарственные препараты на основе гинкго билоба при одновременном приеме с антикоагулянтными средствами (например, фенпрокумон, варфарин) или антиагрегантными средствами (например, клопидогрель, ацетилсалициловая кислота и другие нестероидные противовоспалительные препараты) могут вызывать усиление их действия.

Проведенные исследования не выявили взаимодействия препаратов гинкго билоба с варфарином, однако при их совместном приеме рекомендуется проводить адекватный мониторинг параметров свертывания крови в начале приема, при изменении дозы, завершении приема или при замене препарата гинкго билоба.

Исследования взаимодействия с талинололом показали, что препараты гинкго билоба могут ингибировать Р-гликопротеин в кишечнике. Это может привести к усилению воздействия лекарственных средств, метаболизм которых зависит от Р-гликопротеина, например, дабигатрана этексилата. Необходимо соблюдать осторожность при совместном назначении препаратов гинкго билоба и дабигатрана.

Гинкго билоба может повышать  $C_{max}$  нифедепина (у отдельных лиц до 100%), что сопровождается головокружением и усилением приливов.

Одновременное применение препаратов гинкго билоба и эфавиренза не рекомендуется, так как концентрация эфавиренза в плазме может быть уменьшена из-за индукции CYP3A4.

В случае одновременного приема других лекарственных средств, в том числе отпускаемых без рецепта врача, необходимо обратиться к врачу.

### Беременность и лактация:

#### Беременность

Возможно повышение риска кровотечения. Лекарственное средство противопоказано при беременности.

**Лактация**

Информация о проникновении компонентов лекарственного средства в грудное молоко отсутствует. Лекарственное средство не следует принимать во время кормления грудью в связи с отсутствием адекватных данных.

**Влияние препарата на способность управлять транспортными средствами и работать с движущимися механизмами:**

Исследования по изучению влияния EGb 761® на способность управлять транспортным средством и работать с механизмами не проводились.

Лекарственное средство содержит этиловый спирт! В период лечения следует воздержаться от управления транспортными средствами и выполнения другой работы, которая требует повышенного внимания, быстрых психических и двигательных реакций.

**Побочные эффекты**

По результатам пятилетнего клинического испытания, проведенного для оценки эффективности и безопасности применения ТАНАКАНА в дозе 120 мг дважды в день у пациентов старше 70 лет (2-31-00240-011), наиболее частыми побочными реакциями (> 5%), были боли в животе, диарея и головокружение.

Получены сообщения о развитии кровотечений различной локализации (глазные, носовые, церебральные, желудочно-кишечные) на фоне приема препаратов гинкго билоба, частота их неизвестна.

Выявленные нежелательные побочные реакции классифицируются в зависимости от частоты их возникновения: очень часто:  $\geq 1/10$ , часто: от  $\geq 1/100$  до  $< 1/10$ , нечасто: от  $\geq 1/1000$  до  $< 1/100$ , редко: от  $\geq 1/10000$  до  $< 1/1000$ , очень редко: от  $< 1/10000$ , частота не известна: не может быть оценена на основе имеющихся данных.

***Нарушения со стороны нервной системы***

Часто: головокружение, головная боль, обморок

***Нарушения со стороны иммунной системы***

Часто: реакции гиперчувствительности, одышка

Нечасто: крапивница

Редко: ангионевротический отек

***Нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта***

Часто: диарея, боли в животе, диспепсия, тошнота

***Нарушения со стороны кожи и подкожных тканей***

Часто: экзема, зуд

Нечасто: сыпь

В случае возникновения побочных реакций, в том числе не указанных в данной инструкции, следует прекратить прием лекарственного средства и обратиться к врачу.

**Отчетность о предполагаемых побочных реакциях**

Отчетность о нежелательных реакциях после регистрации препарата имеет важное значение. Это позволяет проводить непрерывный мониторинг и оценку соотношения польза/риск препарата. Специалистам в области здравоохранения следует сообщать обо всех случаях неблагоприятных реакций вследствие приема лекарственного средства в рамках национальной системы отчетности.

0664 - 2021

**Передозировка**

Информация о случаях передозировки лекарственного средства ТАНАКАН отсутствует.

**Несовместимости**

Не применимо.

**Срок годности**

3 года.

Не использовать после истечения срока годности, указанного на упаковке.

**Особые предупреждения при хранении**

Хранить при температуре не выше 25°C ГЛАСОВАНО

Хранить в недоступном для детей месте МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Приказ Министерства здравоохранения

Республики Беларусь

**Форма выпуска и упаковка**

По 30 мл раствора во флаконе из коричневого стекла, закрытого завинчивающейся крышкой белого цвета с контролем первого вскрытия, в комплекте с пипеткой-дозатором и листком-вкладышем в картонной коробке.

**УСЛОВИЯ ОТПУСКА ИЗ АПТЕК**

Лекарственное средство отпускается без рецепта.

**ПРОИЗВОДИТЕЛЬ**

БОФУР ИПСЕН ИНДУСТРИ

Рю Этэ Виртон

28100 ДРЁ

ФРАНЦИЯ