

НД РБ

2709Б-2019



**Листок-вкладыш – информация для пациента
ЦЕРАЛИН, 500 мг, 1000 мг, порошок для приготовления раствора для приема
внутрь
Действующее вещество: цитиколин**

Перед применением препарата полностью прочтайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.

- Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.
- Если у Вас возникли дополнительные вопросы, обратитесь к лечащему врачу, или к работнику аптеки, или к медицинской сестре.
- Препарат назначен именно Вам. Не передавайте его другим людям. Он может навредить им, даже если симптомы их заболевания совпадают с Вашими.
- Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу, или к работнику аптеки, или к медицинской сестре. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.

Содержание листка-вкладыша

1. Что из себя представляет препарат ЦЕРАЛИН, и для чего его применяют
2. О чём следует знать перед применением препарата ЦЕРАЛИН
3. Применение препарата ЦЕРАЛИН
4. Возможные нежелательные реакции
5. Хранение препарата ЦЕРАЛИН
6. Содержимое упаковки и прочие сведения

1. Что из себя представляет препарат ЦЕРАЛИН, и для чего его применяют

Лекарственный препарат ЦЕРАЛИН содержит в качестве действующего вещества цитиколин (в виде цитиколина натрия).

Препарат ЦЕРАЛИН применяется для лечения неврологических и когнитивных нарушений (например, ухудшение памяти, умственной работоспособности), связанных с инсультом или с травматическим повреждением головного мозга.

Препарат ЦЕРАЛИН показан к применению у взрослых.

Если улучшение не наступило или Вы чувствуете ухудшение состояния, необходимо обратиться к врачу.


2. О чём следует знать перед применением препарата ЦЕРАЛИН

Не принимайте ЦЕРАЛИН, если:

- у Вас аллергия на цитиколин или на любые другие компоненты препарата, перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша;
- у Вас повышенный тонус парасимпатической нервной системы, проявляющийся головокружением, тошнотой, снижением артериального давления, нарушением ритма сердца.
- Вы беременны или кормите грудью.

Особые указания и меры предосторожности

2709Б-2019



Перед применением препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом, или работником аптеки, или медицинской сестрой.

Дети и подростки

Не рекомендуется принимать ЦЕРАЛИН детям и подросткам в возрасте до 18 лет.

Другие препараты и препарат ЦЕРАЛИН

Сообщите лечащему врачу или работнику аптеки о том, что Вы принимаете, недавно принимали или планируете принимать другие препараты, в частности:

- леводопа (препарат для лечения болезни Паркинсона);
- меклофеноксат (препарат для улучшения кровоснабжения головного мозга).

Сообщите лечащему врачу или работнику аптеки, если Вы принимаете, недавно принимали или планируете принимать другие препараты, в частности:

- леводопа (препарат для лечения болезни Паркинсона);
- меклофеноксат (препарат для улучшения кровоснабжения головного мозга).

Беременность, грудное вскармливание и fertильность

Если Вы беременны или кормите грудью, думаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Препарат ЦЕРАЛИН не следует принимать во время беременности или кормления грудью, если иное не назначено врачом.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

Препарат ЦЕРАЛИН может вызывать галлюцинации, головную боль, усталость, головокружение. Если Вы наблюдаете у себя данные симптомы, воздержитесь от управления транспортными средствами и от работы с механизмами.

Препарат ЦЕРАЛИН содержит аспартам, который противопоказан пациентам с фенилкетонурией.

Препарат ЦЕРАЛИН содержит сахар. Если у Вас непереносимость некоторых сахаров, обратитесь к лечащему врачу перед приемом данного лекарственного препарата.

3. Применение препарата ЦЕРАЛИН

Всегда применяйте препарат в полном соответствии с листком-вкладышем, а также в соответствии с рекомендациями лечащего врача или работника аптеки. При появлении сомнений проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки.

Рекомендуемая доза

Взрослые - от 500 до 2000 мг в сутки в зависимости от тяжести симптоматики.

Разовую дозу, кратность приема и длительность курса лечения определяет Ваш лечащий врач.

Пациенты пожилого возраста

Нет необходимости в коррекции дозы.

Пациенты с нарушением функции печени

Нет необходимости в коррекции дозы.

Пациенты с нарушением функции почек

Нет необходимости в коррекции дозы.

Применение у детей и подростков

Не следует применять ЦЕРАЛИН у детей и подростков младше 18 лет.

Способ применения

Для приема внутрь.

Содержимое 1 пакета растворить в половине стакана кипяченой воды комнатной температуры.

Приготовленный раствор представляет собой бесцветный или с желтоватым оттенком прозрачный или опалесцирующий раствор.

Принимать во время еды или между приемами пищи.

Раствор хранению не подлежит, его следует принять сразу после приготовления.

Не использовать лекарственный препарат из поврежденных пакетов.

Если Вы приняли препарата ЦЕРАЛИН больше, чем следовало

При передозировке препарата немедленно обратитесь к врачу, работнику аптеки или в приемное отделение ближайшего лечебного учреждения. Не забудьте взять с собой упаковку данного препарата или этот листок-вкладыш.

Если Вы забыли принять препарат ЦЕРАЛИН

Если Вы забыли принять дозу препарата, примите ее сразу же, как только вспомните об этом, за исключением случаев, если пришло время принять следующую дозу препарата. В этом случае просто примите следующую дозу препарата. Не принимайте двойную дозу препарата для восполнения пропущенной.

Если Вы прекратили прием препарата ЦЕРАЛИН

Принимайте препарат ЦЕРАЛИН регулярно и до тех пор, пока его назначает Ваш врач. Не прекращайте прием препарата, не посоветовавшись предварительно с врачом.

При наличии вопросов по применению препарата обратитесь к лечащему врачу или к работнику аптеки.

4. Возможные нежелательные реакции

Подобно всем лекарственным препаратам, препарат ЦЕРАЛИН может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

Серьезные нежелательные реакции, требующие срочного обращения к врачу

При возникновении любого из следующих симптомов, которые могут быть признаками аллергической реакции, следует немедленно прекратить применение препарата и обратиться к врачу или в ближайшее лечебное учреждение:

- гиперемия (покраснение кожи), кожная сыпь, в том числе крапивница (зудящие высыпания), пурпур (высыпания пурпурного цвета), зуд;
- ангионевротический отек (отек лица, губ, языка или горла);
- анафилактический шок (тяжелая аллергическая реакция немедленного типа).

Другие нежелательные реакции, связанные с применением препарата ЦЕРАЛИН

Очень редко (могут возникать не более чем у 1 человека из 10 000):

- аллергические реакции: гиперемия, крапивница, сыпь, пурпур, зуд, ангионевротический отек, анафилактический шок;
- галлюцинации;



- головная боль, головокружение;
- тахикардия (учащенное сердцебиение);
- артериальная гипертензия (повышенное артериальное давление), артериальная гипотензия (пониженное артериальное давление);
- диспноэ (одышка);
- тошнота, рвота, диарея;
- озноб, отек, повышение температуры тела, повышенная потливость.

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в данном листке-вкладыше.

Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

5. Хранение препарата ЦЕРАЛИН

В защищенном от влаги и света месте при температуре не выше 25°C.

Хранить в недоступном и невидном для детей месте.

Не применяйте после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Датой истечения срока годности является последний день месяца.

Не выбрасывайте препарат в канализацию. Уточните у работника аптеки, как следует утилизировать препарат, который больше не потребуется. Данные меры позволят защитить окружающую среду.

6. Содержимое упаковки и прочие сведения

Каждый пакет содержит:

действующее вещество: цитиколин (в виде цитиколина натрия) – 500 мг или 1000 мг;

вспомогательные вещества: лимонная кислота безводная, аспартам (E 951), сахар.

Внешний вид препарата ЦЕРАЛИН и содержимое упаковки

Порошок для приготовления раствора для приема внутрь.

Порошок белого или белого с желтоватым или сероватым оттенком цвета. Допускается наличие мягких комков.

Внешний вид раствора: бесцветный или с желтоватым оттенком прозрачный или опалесцирующий раствор.

По 3,000 г порошка для дозировки 500 мг или 6,000 г порошка для дозировки 1000 мг в пакете из комбинированного материала (пленка полизилентерефталатная прозрачная, пленка полипропиленовая белая, фольга, пленка полиэтиленовая прозрачная), запаянном с четырех сторон.

По пять или десять пакетов вместе с инструкцией по медицинскому применению в пачке из картона.

Условия отпуска: по рецепту врача.

Держатель регистрационного удостоверения и производитель

СООО «Лекфарм», Республика Беларусь, 223141, г. Логойск, ул. Минская, д. 2а, к. 301.

Тел./факс: (01774)-53801.

Электронная почта: office@lekpharm.by.

НД РБ

2709Б-2019

СОГЛАСОВАНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Приказ Министерства здравоохранения
Республики Беларусь

За любой информацией о лекарственном препарате, а также в случаях появления претензий, возникновения нежелательных реакций следует обращаться в отдел фармаконадзора и медицинской поддержки держателя регистрационного удостоверения:

СООО «Лекфарм», Республика Беларусь, 223141, г. Логойск, ул. Минская, д. 2а, к. 301.
Тел./факс: (01774)-53801.

Электронная почта: office@lekpharm.by, sideeff@lekpharm.by.

Листок-вкладыш пересмотрен:

Прочие источники информации

Подробные сведения о данном препарате содержатся на веб-сайте УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении»: www.rceth.by.