

Листок-вкладыш для пациента



**Следует внимательно прочитать весь листок-вкладыш, поскольку он содержит важную информацию для пациента.**

Данное лекарственное средство отпускают без рецепта, чтобы можно было лечить некоторые заболевания без помощи врача. Однако чтобы получить хороший результат лечения, следует принимать Ларемид с осторожностью и в соответствии с информацией в листке-вкладыше.

- Следует сохранить этот листок-вкладыш, чтобы при необходимости можно было прочитать его снова.
- Следует обратиться к врачу или фармацевту, когда необходимы консультация или дополнительная информация.
- Если симптомы усиливаются или не проходят через 2 дня у взрослых или через 2 дня у детей, следует обратиться к врачу.

**Ларемид** 2 мг, таблетки  
(*Loperamidi hydrochloridum*)

1 таблетка содержит:

активное вещество: лоперамида гидрохлорид 2,0 мг

вспомогательные вещества: лактоза, кукурузный крахмал, поливинилпирролидон 25, стеариновая кислота.

**Описание:** таблетки белого или почти белого цвета, плоские с обеих сторон, с обрезанными краями.

**Упаковка**

Препарат упаковывают в блистры AL/PBX. В картонной пачке вместе с листком-вкладышем находится один блистр (10 штук) или два блистра по 15 штук (всего 30 штук).

**Название и адрес ответственного субъекта**

АО Варшавский фармацевтический завод Польфа  
ул. Каролькова 22/24; 01-207 Варшава, Польша

**Фармакотерапевтическая группа:**

Препараты снижающие перистальтику желудочно-кишечного тракта

Код АТС: А07ДА03.

**1. Чем является Ларемид, и с какой целью он применяется?**

Ларемид оказывает противодиарейное действие. Увеличивает время прохождения химуса по желудочно-кишечному тракту, снижает выделение воды и электролитов в кишечнике, а также повышает тонус анального сфинктера. Эффектом действия

лекарственного средства Ларемид является снижение частоты и количества опорожнений. Действие сохраняется приблизительно до 24 часов.

Ларемид применяется:

- для симптоматического лечения острой и хронической диареи, наступающей при:
  - функциональных нарушениях кишечника,
  - воспалительных заболеваниях кишечника.
- для уменьшения объема стула у пациентов с илеостомой, после колэктомии или обширных резекций кишечника.

## **2. Прежде чем принимать Ларемид**

***Не следует принимать лекарственное средство Ларемид, если***

- установлена повышенная чувствительность к компонентам препарата,
- имеются противопоказания, связанные с торможением перистальтики кишечника, особенно такие как: паралитическая непроходимость кишечника, запор, вздутие живота у предельно обезвоженных детей, псевдомембранозный колит, в первую очередь, связанный с применением антибиотиков широкого спектра действия (может дойти до острого вздутия ободочной кишки),
- при острой бактериальной дизентерии с наличием крови в кале и повышением температуры тела,
- при других острых бактериальных диареях.

***Соблюдать особую осторожность, принимая Ларемид, если***

- у пациента подтверждена болезнь Крона.

Угнетение перистальтики кишечника может маскировать или усиливать симптомы дефицита воды и электролитов, особенно у детей. Поэтому при применении ларемиды следует вводить пациенту надлежащее количество воды и минеральных солей.

Ларемид может вызывать нарушения мочеиспускания.

*Следует проконсультироваться с врачом, даже если указанные предупреждения касаются ситуаций имевших место в прошлом.*

***Соблюдение особой осторожности у отдельных групп, принимающих лекарственное средство***

***Применение лекарственного средства Ларемид у детей:***

Не рекомендуется применять у детей младше 6 лет.

У детей, особенно младше 3 лет, чаще наступают побочные действия со стороны центральной нервной системы.

***Применение лекарственного средства Ларемид у пациентов с нарушениями функции печени:***

Следует соблюдать осторожность во время применения лекарственного средства лицам с печеночной недостаточностью.

Лекарственное средство биотрансформируется в печени и, следовательно, у лиц с печеночной недостаточностью имеется риск токсического действия на центральную нервную систему.

***Беременность:***

*Перед применением лекарственного средства следует проконсультироваться с врачом.*

Препарат можно применять при беременности только в случае крайней необходимости.

***Кормление грудью:***

*Перед применением лекарственного средства следует проконсультироваться с врачом.*

Следует с осторожностью применять у женщин в период грудного вскармливания.

***Управление транспортными средствами и обслуживание механизмов:***

Ларемид не влияет на способность к управлению транспортом и обслуживанию механизмов, разве что наступают такие побочные действия, как сонливость или головокружения.

***Применение других лекарственных средств:***

Одновременное применение лекарственного средства Ларемид и наркотических анальгетиков повышает риск наступления тяжелых запоров.

**3. Как принимать Ларемид?**

*Ларемид следует принимать в соответствии с прилагаемым листком-вкладышем.*

*В случае сомнений следует обратиться к врачу.*

*Обычно применяемые дозы лекарственного средства Ларемид:*

Взрослые и дети старше 12 лет:

***Острая диарея***

Первая доза 4 мг (2 таблетки), затем 2 мг (1 таблетка) после каждого жидкого стула. Не следует принимать больше 16 мг в сутки (8 таблеток). Обычно принимается 3-4 таблетки в сутки.

Улучшение наступает обычно до истечения 48 часов.

Дети от 9 до 12 лет:

2 мг (1 таблетка) 4 раза в сутки до момента прекращения симптомов диареи (не больше чем 5 дней).

Дети от 6 до 8 лет:

1 мг (½ таблетки) 3-4 раза в сутки в период до 3 дней.

Не рекомендуется применять лоперамид у детей младше 6 лет.

***Хроническая диарея***

В начале 2 мг (1 таблетка) 2 раза в сутки. В случае необходимости дозу можно увеличить до 8 мг (4 таблеток), максимально до 12 мг (6 таблеток) в сутки.

При хронической диарее лоперамид не следует принимать более 10 дней.

*Если возникнет подозрение, что действие лекарственного средства Ларемид слишком сильное или слишком слабое, следует обратиться к врачу.*

***В случае приема большей дозы лекарственного средства Ларемид, чем рекомендуемая:***

Могут наступить: запоры, повышенный мышечный тонус, сонливость, пртоз, брадикардия. Можно провести промывание желудка с добавлением активированного угля. Антидот: налоксон.

*В случае приема большей дозы лекарственного средства, чем рекомендуемая, следует безотлагательно обратиться к врачу или фармацевту.*

***Если вы забыли принять дозу лекарственного средства Ларемид:***

Не следует принимать двойную дозу с целью восполнения пропущенной дозы.

#### **4. Возможные побочные действия**

*Как каждое лекарственное средство, Ларемид может вызывать побочные действия.*

Редко, особенно при продолжительном применении, могут наступить: аллергические реакции в форме кожной сыпи, болей в животе, метеоризма, тошноты и рвоты, запоров, сонливости, головокружения, сухости во рту, отсутствия аппетита.

Следует сообщить врачу как можно быстрее, если наступят симптомы, свидетельствующие о передозировке (запоры, повышенный мышечный тонус, сонливость, протоз, брадикардия).

Следует прекратить применение препарата в случае отсутствия улучшения, несмотря на применение лекарственного средства Ларемид на протяжении 48 часов, а также в случае развития запоров, метеоризма или симптомов непроходимости.

*У некоторых лиц в период применения лекарственного препарата Ларемид могут наступить другие побочные действия*

*В случае наступления других побочных действий, не перечисленных в этом листке-вкладыше, следует сообщить о них врачу.*

#### **5. Хранение лекарственного средства Ларемид**

Хранить при температуре не выше 25°C.

Хранить в недоступном для детей месте.

*Не следует принимать лекарственное средство Ларемид после истечения срока годности, указанного на упаковке.*

#### **6. Дополнительная информация**

*С целью получения более подробной информации следует обратиться к ответственному субъекту:*

АО Варшавский фармацевтический завод Польфа  
ул. Каролькова 22/24; 01-207 Варшава, Польша