

«УТВЕРЖДАЮ»  
Заместитель Министра  
здравоохранения  
Республики Беларусь

Б. Н. Андросюк  
«28» 10 г.



**ИНСТРУКЦИЯ**  
по применению  
изделия медицинского назначения  
**ГИНОФЕМ**  
суппозитории вагинальные

«СОГЛАСОВАНО»

Заместитель директора  
УП «Центр экспертиз  
и испытаний в здравоохранении»

Д. В. Гринько  
«30» 01 2020 г.

«СОГЛАСОВАНО»

Директор  
ООО «Рубикон»  
В. Л. Фарбер  
«84» 01 2020 г.

«СОГЛАСОВАНО»

Директор  
ГУ «Республиканский  
научно-практический  
центр «Мать и дитя»

С. А. Васильев  
«28» 10 2019 г.

«СОГЛАСОВАНО»

Главный врач  
УЗ «3-я городская клиническая  
больница им. Е. В. Клумова»  
Н. И. Саевич-Официери  
2019 г.

«СОГЛАСОВАНО»

Главный врач  
УЗ «Гродненский областной  
клинический перинатальный центр»  
В. Л. Зверко  
2019 г.

**ИНСТРУКЦИЯ**  
по применению  
**изделия медицинского назначения**  
**ГИНОФЕМ**  
суппозитории вагинальные

**Состав на один суппозиторий:**

Натрия гиалуронат 5,0 мг,  
Макроголглицерина гидроксистеарат 25,0 мг,  
Жир твердый до 2500,0 мг.

**Описание изделия и его назначение**

Вагинальные суппозитории «Гинофем» предназначены для местного применения, вагинально, с целью увлажнения, восстановления и защиты слизистой оболочки влагалища. Присутствующая в составе суппозитория гиалуроновая кислота, попадая на слизистую влагалища, образует на ее поверхности защитную гелевую пленку, которая способствует восстановлению физиологических функций слизистой влагалища, снимает воспаление, облегчает и ускоряет процессы заживления, восстанавливает нормальную влажность влагалища.

**Показания к применению**

Суппозитории «Гинофем» рекомендуются к широкому применению для увлажнения, восстановления и защиты слизистой оболочки влагалища при следующих состояниях, а именно:

- для предотвращения появления симптомов сухости влагалища, связанной с возрастными изменениями (в период перименопаузы, в климактерии), дефицитом эстрогенов, заместительной гормональной терапией или использованием контрацептивов;
- для смягчения и предотвращения воспалений вокруг половых губ;
- при сухости слизистой оболочки влагалища, сопровождающейся покраснением и отеком;
- в качестве вспомогательного средства при повреждении слизистой влагалища после родов, гинекологических и хирургических вмешательств;
- в качестве вспомогательного средства при наличии симптомов атрофии слизистой влагалища, в результате химиотерапии, лучевой или радиотерапии;
- при ослаблении тонуса мышц влагалища, дискомфорте, болезненности во время полового акта;
- как заключительный этап при санации влагалища;
- как часть мероприятий по уходу в любом периоде жизни женщины.

**Способ применения и дозы**

Перед введением суппозитория тщательно вымойте руки. Извлеките суппозиторий из оболочки и введите глубоко во влагалище.

Если суппозиторий слишком мягкий, перед использованием необходимо на несколько минут поместить его в холодильник.

Для введения используется один суппозиторий – перед сном, один раз в сутки в течение 14-20 дней (но не более). Допускаются изменения по количеству и кратности применения суппозиториев по рекомендации врача.

Применение суппозиториев следует запланировать так, чтобы лечение не было прервано менструацией.

**Особые указания**

Суппозитории предназначены только для вагинального применения!

Не глотать!

Не рекомендуется применение суппозиториев во время менструации. Женщины в период беременности и лактации могут применять суппозитории исключительно после консультации с врачом.

Суппозитории с гиалуроновой кислотой не рекомендуется использовать одновременно с другими средствами, предназначенными для вагинального введения.

Не рекомендовано применение суппозиториев во время использования латексного презерватива (возможно взаимодействие активных составляющих суппозиториев с компонентами латекса).

### **Меры предосторожности**

Не применять при повышенной чувствительности к какому-либо из компонентов изделия медицинского назначения. Если после применения суппозиториев произошло усиление неблагоприятных ощущений во влагалище или другие не наблюдавшиеся ранее симптомы и проявления на наружных половых органах, следует прекратить их использование и обратиться за консультацией к врачу.

Использование суппозиториев местного действия продолжительное время может вызвать сенсибилизацию. В случае, если это произошло, прекратите применение и обратитесь к врачу для соответствующей консультации.

Не следует использовать суппозитории при нарушении целостности упаковки.

### **Упаковка**

По 5 суппозиториев в контурной ячейковой упаковке. По 2 контурные ячейковые упаковки с инструкцией по применению в картонной пачке.

### **Условия хранения**

Хранить в сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25 °C.

Хранить в недоступном для детей месте!

### **Срок годности**

2 года.

Не использовать изделие медицинского назначения после истечения срока годности.

### **Производитель:**

ООО «Рубикон», РБ, 210002, г. Витебск, ул. М. Горького, 62Б,  
тел.: +375 (212) 36-47-77; тел./факс: +375 (212) 36-37-06, [www.rubikon.by](http://www.rubikon.by),  
e-mail: [secretar@rubikon.by](mailto:secretar@rubikon.by)

