



### ОКСОЛИН-АВ, 2,5 мг/г, мазь назальная

**Действующее вещество:** диоксотетрагидрокситетрагидронафталин (оксолин).

**Перед применением препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.**

- Всегда применяйте препарат в точности с данным листком-вкладышем или рекомендациями лечащего врача или работника аптеки.
- Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.
- Если Вам нужны дополнительные сведения или рекомендации, обратитесь к работнику аптеки.
- Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.
- Если состояние не улучшается или оно ухудшается, через 3-4 дня Вам следует обратиться к врачу.

#### Содержание листка-вкладыша

1. Что из себя представляет препарат Оксолин-АВ и для чего его применяют.
2. О чем следует знать перед применением препарата Оксолин-АВ.
3. Применение препарата Оксолин-АВ.
4. Возможные нежелательные реакции.
5. Хранение препарата Оксолин-АВ.
6. Содержимое упаковки и прочие сведения.

#### 1. ЧТО ИЗ СЕБЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ПРЕПАРАТ ОКСОЛИН-АВ И ДЛЯ ЧЕГО ЕГО ПРИМЕНЯЮТ

Препарат Оксолин-АВ содержит действующее вещество диоксотетрагидрокситетрагидронафталин (оксолин), относится к группе противовирусных препаратов.

Препарат Оксолин-АВ применяется для профилактики гриппа, лечения вирусных ринитов у взрослых, подростков и детей с 2 лет.

Противовирусное действие препарата связано с тем, что, блокируя места связывания вируса гриппа с поверхностью клетки, он защищает ее от проникновения вируса.

В организме не накапливается и выводится в основном почками в течение суток.

Применение лекарственного препарата основано на опыте длительного применения.

При лечении вирусных ринитов у детей применение необходимо осуществлять под наблюдением врача.

При лечении вирусных ринитов у взрослых препарат допускается для самостоятельного приема в течение 3-4 дней.

Если улучшение не наступило или Вы чувствуете ухудшение через 3-4 дня, необходимо обратиться к врачу.

## 2. О ЧЕМ СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРЕПАРАТА ОКСОЛИН-АВ

Не применяйте препарат Оксолин-АВ:

- если у Вас или Вашего ребенка аллергия на диоксотетрагидрокситетрагидронафталин (оксолин) или любые другие компоненты препарата, перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша;
- у детей до 2 лет.

### **Особые указания и меры предосторожности**

Перед применением препарата Оксолин-АВ проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

С осторожностью применяйте препарат при беременности, в период грудного вскармливания.

Следует избегать контакта препарата с глазами. При попадании на слизистую оболочку глаза мазь нужно смыть большим количеством теплой воды. Если после промывания глаз водой неприятные ощущения сохраняются, необходимо обратиться к врачу.

Препарат при попадании на кожу не оказывает раздражающего действия.

При выявлении повышенной чувствительности к диоксотетрагидрокситетрагидронафталину или к любому из вспомогательных веществ препарата необходима отмена препарата и симптоматическое лечение.

Препарат Оксолин-АВ не предназначен для лечения вирусных заболеваний глаз (вирусного конъюнктивита, вирусного блефарита, офтальмогерпеса и т. д.).

### Дети

Применение препарата Оксолин-АВ у детей необходимо осуществлять под наблюдением врача.

### **Другие препараты и препарат Оксолин-АВ**

Сообщите лечащему врачу или работнику аптеки о том, что Вы применяете, недавно применяли или можете начать применять какие-либо другие препараты.

Взаимодействия препарата Оксолин-АВ с другими лекарственными препаратами не изучались.

### **Препарат Оксолин-АВ с пищей и напитками**

Препарат не взаимодействует с пищей и напитками.

Препарат нельзя использовать в ротовой полости и глотать его.

### **Беременность, грудное вскармливание и фертильность**

Если Вы беременны или кормите грудью, думаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

До настоящего времени не опубликовано сообщений о риске, связанном с применением мази Оксолин-АВ для беременных и кормящих грудью женщин и их детей. Применение препарата Оксолин-АВ возможно, если польза для матери больше, чем вероятность отрицательного влияния на ребенка.

### **Управление транспортными средствами и работа с механизмами**

Препарат не оказывает влияния на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами.

## 3. ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА ОКСОЛИН-АВ

Всегда применяйте данный препарат в полном соответствии с данным листком-вкладышем или рекомендациями лечащего врача или работника аптеки. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

### **Рекомендуемая доза**

Для профилактики гриппа: полоской мази от 3 до 5 мм смазывают ежедневно 2-3 раза в день слизистую оболочку полости носа в период подъема и максимального развития

эпидемической вспышки гриппа или при контакте с больным гриппом. Длительность применения - 25 дней.

Лечение вирусного ринита: полоской мази от 3 до 5 мм смазывают слизистую оболочку полости носа 2-3 раза в день. Длительность применения - от 3 до 4 дней.

Если в течение 3-4 дней улучшение не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом.

#### **Применение у детей**

Препарат Оксолин-АВ не следует применять у детей в возрасте до 2 лет.

Применение препарата Оксолин-АВ у детей необходимо осуществлять под наблюдением врача.

При наличии вопросов по применению препарата обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.

#### **Способ применения**

Наносите препарат на слизистую оболочку полости носа чистыми руками.

Перед применением алюминиевую трубу вскрыть при помощи пластикового колпачка, навинчивая его стороной, снабженной конусообразным приспособлением для прокола защитной мембраны. Извлечь 3 – 5 мм мази с помощью аккуратного надавливания на кончик трубы.

Не используйте препарат в ротовой полости и не глотайте его. При случайном проглатывании препарата необходимо обратиться к врачу.

При попадании на слизистую оболочку глаз смойте мазь большим количеством теплой воды. Если после промывания глаз водой неприятные ощущения сохраняются, Вам необходимо обратиться к врачу.

#### **Если Вы применили препарата Оксолин-АВ больше, чем следовало**

Если Вы применили больше препарата и Вы или Ваш ребенок чувствуете ухудшение, жжение слизистой оболочки полости носа, обильные слизистые (водянистые) выделения из полости носа, насморк – необходимо обратиться к врачу.

#### **Если Вы забыли применить препарат Оксолин-АВ**

Нанесите мазь при первой возможности, однако предварительно убедитесь, что Вы не превышаете частоту (2-3 раза в день) применения препарата. Не следует удваивать дозу во время следующего применения препарата.

#### **Если Вы прекратили применение препарата Оксолин-АВ**

Отмена препарата не вызывает нежелательных реакций.

При наличии вопросов по применению препарата обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.

### **4. ВОЗМОЖНЫЕ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ РЕАКЦИИ**

Подобно всем лекарственным препаратам, препарат Оксолин-АВ может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

Препарат Оксолин-АВ может вызвать следующие нежелательные реакции:

- редко (могут возникать менее чем у 1 человека из 1000) – синее окрашивание слизистой оболочки полости носа;

- частота неизвестна – быстропроходящее чувство жжения слизистой оболочки полости носа, обильные слизистые (водянистые) выделения из полости носа, насморк.

#### **Сообщение о нежелательных реакциях**

Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях в информационную базу данных по нежелательным реакциям (действиям) на лекарственные препараты,

включая сообщения о неэффективности лекарственных препаратов, (РУП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении», перейдя на сайт <https://www.rceth.by>). Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

## 5. ХРАНЕНИЕ ПРЕПАРАТА ОКСОЛИН-АВ

Хранить при температуре от 2 до 8 °С.

Храните в недоступном для детей месте.

Не применяйте препарат после истечения срока годности (срока хранения), указанного на картонной пачке и алюминиевой тубе после надписи «Годен до».

Датой истечения срока годности является последний день месяца.

Нет особых требований к утилизации.

## 6. СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ И ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ

### Полное перечисление действующего вещества и вспомогательных веществ

Препарат Оксолин-АВ содержит

Действующим веществом является диоксотетрагидрокситетрагидронафталин.

1 г препарата содержит 2,5 мг диоксотетрагидрокситетрагидронафталина.

Прочими ингредиентами (вспомогательными веществами) являются: вазелиновое масло, вазелин.

### Внешний вид препарата Оксолин-АВ и содержимое его упаковки

Мазь от белого до светло-желтого цвета. При хранении допускается появление розового оттенка.

Мазь назальная, 2,5 мг/г, по 10 г упакована в тубу алюминиевую.

Тубу вместе с листком-вкладышем помещают в пачку из картона.

**Условия отпуска из аптек:** без рецепта.

### Держатель регистрационного удостоверения и производитель

АО «Алтайвитамины», Российская Федерация

Адрес: 659325, Россия, Алтайский край, г. Бийск, ул. Заводская, д. 69

Телефоны: (3854) 338-719, 326-948

Факс (3854) 326-943

Эл. почта: [office@altayvitamin.ru](mailto:office@altayvitamin.ru)

За любой информацией о препарате, а также в случаях возникновения претензий следует обращаться к держателю регистрационного удостоверения.

Подробные сведения о препарате содержатся на веб-сайте: [www.rceth.by](http://www.rceth.by).

Листок-вкладыш доступен на русском языке на веб-сайте: [www.rceth.by](http://www.rceth.by).