

НД РБ
1523 Б-2016



**Листок-вкладыш – информация для потребителя
ТРИКАРДИН, настойка**

Перед применением препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для вас сведения.

- Сохраните листок-вкладыш. Возможно, вам потребуется прочитать его еще раз.
- Если у вас возникли дополнительные вопросы, обратитесь к лечащему врачу.
- Препарат назначен именно вам. Не передавайте его другим людям. Он может навредить им, даже если симптомы их заболевания совпадают с вашими.
- Если у вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.

Содержание листка-вкладыша

1. Что собой представляет препарат ТРИКАРДИН, и для чего его применяют
2. О чем следует знать перед применением препарата ТРИКАРДИН
3. Применение препарата ТРИКАРДИН
4. Возможные нежелательные реакции
5. Хранение препарата ТРИКАРДИН
6. Содержимое упаковки и прочие сведения

**1. Что собой представляет препарат ТРИКАРДИН,
и для чего его применяют**

Препарат ТРИКАРДИН, настойка, является средством растительного происхождения. Лекарственное средство представляет комбинацию спиртовых извлечений корневищ с корнями валерианы, травы пустырника и плодов боярышника. Биологически активные вещества корня валерианы обладают седативным действием, облегчают наступление сна и улучшают качество сна. Биологически активные вещества, которые содержатся в плодах боярышника, способствуют увеличению коронарного кровотока, обладают кардиотоническим действием. Биологически активные вещества, которые содержатся в траве пустырника, оказывают седативное, гипотензивное и кардиотоническое действие. Применяется в комплексной терапии функциональных нарушений центральной нервной системы (нарушения сна и неврастения); в комплексной терапии функциональных нарушений сердечно-сосудистой деятельности.

**2. О чем следует знать перед применением
препарата ТРИКАРДИН**

Препарат ТРИКАРДИН противопоказан:

- при повышенной чувствительности на компоненты препарата, перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша;
- при одновременном приеме препаратов, которые содержат алкоголь, алкоголизме в анамнезе;
- при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, обострении эрозивного гастрита;
- при заболеваниях печени;
- при выраженной артериальной гипотензии и брадикардии;

- при эпилепсии;
- при черепно-мозговой травме и других заболеваниях головного мозга со снижением судорожного порога;
- при беременности и в период грудного вскармливания;
- детям до 18 лет.

Если что-либо из вышеперечисленного относится к вам, сообщите лечащему врачу перед началом приема препарата.

Особые указания и меры предосторожности

Перед началом приема препарата ТРИКАРДИН проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Препарат ТРИКАРДИН, настойка, содержит этанол!

Данный лекарственный препарат содержит не менее 64,0 % (об/об) этанола, что соответствует от 554 мг до 1108 мг на разовую дозу (20-40 капель), что эквивалентно от 14 мл до 28,1 мл пива или от 5,9 мл до 11,7 мл вина на дозу.

Вреден для лиц с алкоголизмом.

В связи с содержанием этилового спирта лекарственный препарат не следует принимать беременным и кормящим женщинам, детям до 18 лет, а также пациентам с заболеваниями печени, эпилепсией, черепно-мозговой травмой и другими заболеваниями головного мозга со снижением судорожного порога.

Во время лечения необходим контроль артериального давления и ЭКГ.

Прекратите прием препарата и обратитесь к врачу, если во время лечения у вас:

- симптомы сохраняются или происходит ухудшение состояния,
- развиваются отеки нижних конечностей.

Необходима немедленная медицинская помощь при возникновении боли в области сердца с иррадиацией в руку, верхнюю часть живота, шею, или в случае развития дыхательной недостаточности (например, одышки).

При появлении симптомов угнетения центральной нервной системы ваш врач может уменьшить дозу или временно отменить лекарственный препарат.

Дети и подростки

В связи с отсутствием достаточных данных и содержанием этилового спирта препарат ТРИКАРДИН, настойка, противопоказан для назначения детям до 18 лет.

Другие препараты и препарат ТРИКАРДИН

Сообщите лечащему врачу о том, что вы принимаете, недавно принимали или можете начать принимать какие-либо другие препараты. Это относится также к любым растительным препаратам или препаратам, которые вы купили без назначения врача.

Не рекомендуется одновременное применение с антиаритмиками III класса (удлиняют период реполяризации – амиодарон, соталол, бретилия тозилат, бутилид), с цизапридом (повышает моторику в верхних отделах желудочно-кишечного тракта).

Препарат ТРИКАРДИН может усилить действие успокоительных (седативных), снотворных, анксиолитических (противотревожных), кардиотонических, спазмолитических, анальгезирующих и других лекарственных препаратов, угнетающих центральную нервную систему. При применении вместе с синтетическими седативными средствами необходимо медицинское наблюдение.

Препарат содержит этанол. Необходимо избегать совместного приема с препаратами, вызывающими дисульфирамоподобную реакцию при приеме с алкоголем (ощущение жара, покраснение кожных покровов, рвота, тахикардия):

- дисульфирам (препарат для лечения алкоголизма);
- антибиотики (цефамандол, цефоперазон, латамоксеф, хлорамфеникол);
- препараты, снижающие уровень сахара в крови (хлорпропамид, глибенкламид, глипизид, толбутамид);

1523 Б-2016



- противогрибковые препараты (гризефульвин, кетоконазол);
- противомикробные препараты, производные нитро-5-имидазола (например, метронидазол, орнидазол, тинидазол);
- прокарбазин (противоопухолевый препарат).

Необходимо также избегать совместного приема с лекарственными препаратами, угнетающими функции центральной нервной системы.

Необходимо избегать одновременного применения других лекарственных препаратов, содержащих этанол.

Прием препарата ТРИКАРДИН с пищей, напитками и алкоголем

Препарат ТРИКАРДИН следует принимать до еды. В период лечения следует избегать употребления алкоголя и алкогольсодержащих напитков.

Беременность, грудное вскармливание и фертильность

Противопоказано применение препарата ТРИКАРДИН, настойка во время беременности и в период грудного вскармливания.

Если вы беременны, думаете, что можете быть беременны, или планируете беременность, проконсультируйтесь с вашим врачом, прежде чем принимать данный препарат.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

Препарат ТРИКАРДИН, настойка содержит этанол. В период лечения откажитесь от управления транспортными средствами и занятия другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

3. Применение препарата ТРИКАРДИН

Всегда принимайте этот препарат в полном соответствии с рекомендациями лечащего врача. При появлении сомнений, проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Режим дозирования и длительность лечения устанавливаются индивидуально в зависимости от особенностей заболевания, переносимости лекарственного средства и достигнутого лечебного эффекта.

Обычная доза для взрослых – по 20-40 капель 2-3 раза в сутки. Внутрь, до еды.

Рекомендуемую дозу капель разводят в 1/4 стакана воды.

Не рекомендуется применять препарат в течение длительного времени из-за содержания этанола. Во время лечения необходимо избегать приема других этанолсодержащих препаратов.

Применение у детей и подростков

Применение препарата Трикардин у детей и подростков до 18 лет противопоказано.

Если вы приняли больше, чем назначено

Если вы приняли больше назначенной дозы препарата ТРИКАРДИН, настойка, возможно появление чувства угнетенности, головной боли, сонливости, дискомфорта со стороны желудочно-кишечного тракта, тошноты, снижения работоспособности, артериальной гипотензии, нарушения сердечной деятельности (брадикардии). Острая передозировка может вызвать алкогольную интоксикацию, появление болей в животе спастического характера, чувство стеснения в груди, головокружение, тремор рук и расширение зрачков.

При появлении симптомов передозировки следует прекратить прием препарата и обратиться к врачу. При острой передозировке необходимо провести индукцию рвоты, промывание желудка. Проводится симптоматическая терапия.

Если вы забыли принять препарат ТРИКАРДИН

Не следует принимать двойную дозу (две дозы в одно время), чтобы компенсировать пропущенную дозу. Примите следующую дозу в обычное время.

Если вы прекратите прием препарата ТРИКАРДИН

Обратитесь за консультацией к лечащему врачу, если вы хотите прекратить прием препарата ТРИКАРДИН раньше, чем рекомендовано.

Если у вас есть любые дополнительные вопросы об использовании этого лекарственного средства, обратитесь к своему врачу.

4. Возможные нежелательные реакции

Подобно всем лекарственным препаратам, ТРИКАРДИН, настойка может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

При приеме препарата возможно развитие следующих нежелательных реакций:

- аллергические реакции (кожная сыпь, зуд, гиперемия, отек кожи);
- головная боль, общая слабость, головокружение, снижение работоспособности, сонливость;
- раздражительность, тревожность;
- желудочно-кишечные расстройства (изжога, тошнота, отрыжка, боли в животе);
- снижение артериального давления.

Большие дозы могут привести к брадикардии и аритмии, а также снижению моторики кишечника (запор).

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у вас или у вашего ребенка возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях напрямую в информационную базу данных по нежелательным реакциям (действиям) на лекарственные препараты, включая сообщения о неэффективности лекарственных препаратов, через www.rceth.by. Сообщая о нежелательных реакциях, вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

5. Хранение препарата ТРИКАРДИН

Хранить в защищенном от света месте при температуре не выше 25°C.

Хранить в недоступном для детей месте.

В процессе хранения возможно выпадение осадка.

Беречь от огня.

Срок годности – 2 года.

Не применять препарат после окончания срока годности, указанного на упаковке.

Не выбрасывать препарат в канализацию. Уточнить у работника аптеки, как избавиться от препаратов, которые больше не потребуются. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

6. Содержимое упаковки и прочие сведения

Состав на один флакон 30 мл:

Активный компонент: валерианы корневища с корнями, пустырника трава, боярышника плоды – 2 г:2 г:1 г; *вспомогательное вещество:* этанол (этиловый спирт) 70 % – до 30 мл настойки.

Состав на один флакон 50 мл:

Активный компонент: валерианы корневища с корнями, пустырника трава, боярышника плоды – 3,3 г:3,3 г:1,7 г; *вспомогательное вещество:* этанол (этиловый спирт) 70 % – до 50 мл настойки.

Внешний вид препарата ТРИКАРДИН и содержимое упаковки

ТРИКАРДИН представляет собой прозрачную жидкость от зеленовато-коричневого до буро-коричневого цвета с выраженным специфическим запахом. В процессе хранения возможно выпадение осадка.

1523 Б-2016



По 30 мл или 50 мл во флаконах из стекла, укупоренных пробками-капельницами и крышками навинчиваемыми.

По 30 мл или 50 мл во флаконах из стекла, укупоренных пробками-капельницами и крышками укупорочно – навинчиваемыми с контролем первого вскрытия.

Каждый флакон с этикеткой самоклеящейся вместе с листком - вкладышем помещен в пачку из картона. Флаконы с этикеткой многостраничной помещены в ящики из гофрированного картона.

Условия отпуска: без рецепта.

Держатель регистрационного удостоверения и производитель

РУП «Белмедпрепараты»,

Республика Беларусь, 220007, г. Минск,

ул. Фабрициуса, 30, тел./факс: (+375 17) 220 37 16,

e-mail: medic@belmedpreparaty.com



Листок-вкладыш пересмотрен: