

Листок-вкладыш: информация для пациента/потребителя

АДЕНОПРОСИН 150 мг суппозитории ректальные

активный комплекс Аденопросин®



Перед применением препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для вас сведения.

- Сохраните этот листок-вкладыш. Возможно, вам потребуется прочитать его еще раз.
- Если у вас возникли дополнительные вопросы, обратитесь к лечащему врачу или фармацевту.
- Этот препарат назначен именно вам. Не передавайте его другим. Он может навредить этим людям, даже если симптомы их заболевания совпадают с вашими.
- Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу или фармацевту. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.

Содержание листка-вкладыша

1. Что из себя представляет препарат Аденопросин и для чего его применяют
2. О чем следует знать перед применением препарата Аденопросин
3. Применение препарата Аденопросин
4. Возможные нежелательные реакции
5. Хранение препарата Аденопросин
6. Содержимое упаковки и прочие сведения

1. Что из себя представляет препарат Аденопросин и для чего его применяют

Аденопросин рекомендуется мужчинам при лечении следующих заболеваний:

- доброкачественная гиперплазия предстательной железы;
- хронический простатит (в комбинированной терапии).

Доброкачественная гиперплазия предстательной железы и/или хронический простатит могут вызвать проблемы с мочеиспусканием (затрудненное и учащенное мочеиспускание).

Препарат Аденопросин регулирует тонус и перистальтику нижних сегментов мочевыводящих путей, снижая частоту мочеиспускания, в том числе в ночное время, и уменьшая дизурические явления, чувство неполного опорожнения мочевого пузыря и напряжение при мочеиспускании. Препарат снижает проницаемость капилляров, уменьшает отек простаты, улучшает микроциркуляцию в предстательной железе, индуцирует апоптоз клеток, тем самым уменьшает размеры гиперплазированной предстательной железы.

Препарат Аденопросин уже в первые дни после начала применения улучшает уродинамические параметры (увеличивает значение максимальной объемной скорости потока мочи, уменьшает время мочеиспускания, снижает количество остаточной мочи) и общее состояние пациентов с доброкачественной гиперплазией предстательной железы (ДГПЖ) и хроническим простатитом (уменьшает индекс хронического простатита, уменьшает содержание лейкоцитов в секрете предстательной железы, улучшает однородность её эхоструктуры).

2. О чем следует знать перед применением препарата Аденопросин

Не применяйте препарат Аденопросин:

- если у вас аллергия (гиперчувствительность) на действующее вещество или любые другие компоненты препарата (перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша);
- если у вас острая задержка мочи;
- если вы женщина (потому что этот препарат предназначен только для мужчин);
- если у вас детский возраст до 18 лет.

Особые указания и меры предосторожности

Без особенностей.

Перед применением препарата, проконсультируйтесь с лечащим врачом или фармацевтом.

16.09.2025

Дети и подростки

Не следует применять детям и подросткам моложе 18-ти лет.

Другие препараты и препарат Аденопросин

Сообщите лечащему врачу или фармацевту о том, что вы применяете, недавно применяли или можете начать применять какие-либо препараты.

В настоящее время о случаях клинически значимого лекарственного взаимодействия препарата Аденопросин с другими лекарствами не сообщалось.

Препарат Аденопросин с пищей и напитками

Не применимо.

Беременность и грудное вскармливание

Не применимо.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

Применение препарата не оказывает влияния на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами.

3. Применение препарата Аденопросин

Всегда применяйте препарат в полном соответствии с листком-вкладышем или с рекомендациями лечащего врача или фармацевта. При появлении сомнений, посоветуйтесь с лечащим врачом или фармацевтом.

Способ применения

Препарат предназначен для ректального применения.

Применяют по одному суппозиторию один раз в день (предпочтительно на ночь в одно и то же время). Препарат следует применять после дефекации или клизмы. Рекомендуются после введения препарата пребывание пациента в положении лежа в течение 30-40 минут.

Продолжительность лечения составляет от 1 до 3 месяцев в зависимости от интенсивности воспалительных процессов на уровне простаты и выраженности симптомов аденомы предстательной железы, а также их сочетания. При необходимости курс лечения можно повторить.

Если Вы применили препарата Аденопросин больше, чем следовало

Если Вы применили более высокие дозы, чем вам назначено, обратитесь к лечащему врачу для получения дальнейших указаний.

Если Вы забыли применить препарат Аденопросин

Если вы забыли применить очередную дозу препарата, примените ее, как только вспомнили, затем продолжайте лечение в прежнем режиме.

Не применяйте двойную дозу, чтобы компенсировать пропущенную дозу.

Если Вы прекратили применение препарата Аденопросин

Не прерывайте лечение. Проконсультируйтесь с лечащим врачом или фармацевтом, прежде чем прекратить лечение.

При наличии вопросов по применению препарата, обратитесь к лечащему врачу или фармацевту.

4. Возможные нежелательные реакции

Подобно всем лекарственным препаратам, данный препарат может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

Во время лечения могут возникнуть следующие нежелательные реакции:

Со стороны пищеварительного тракта: редко - диарея или учащенный стул.

СОГЛАСОВАНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Приказ Министерства здравоохранения
Республики Беларусь

16.09.2025

Сообщения о нежелательных реакциях

Если у вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях напрямую через национальную систему сообщений, сведения о которой опубликованы на веб-сайте республиканского УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении» Республики Беларусь (Фармаконадзор): www.rceth.by или по электронному адресу: rcpl@rceth.by.

Сообщая о нежелательных реакциях, вы помогаете получить больше сведений о безопасности данного препарата.

5. Хранение препарата Аденопросин

Храните препарат в недоступном и невидном для детей месте.

Хранить при температуре не выше 25 °С.

Не применяйте препарат по истечении срока годности, указанного на упаковке после «Годен до». Датой истечения срока годности является последний день данного месяца.

Не выбрасывайте препараты в канализацию. Уточните у фармацевта, как избавиться от препаратов, которые больше не потребуются. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

6. Содержание упаковки и прочие сведения**Препарат Аденопросин содержит**

1 суппозиторий содержит:

- *действующее вещество*: активный комплекс Аденопросин® 150 мг, в пересчете на общий белок 29 мг;

- *вспомогательные вещества*: твердый жир.

Внешний вид Аденопросин и содержимое упаковки

Суппозитории цилиндрической формы от желтого до коричневого цвета. Допускается неоднородность окраски, в том числе в виде вкраплений более темного цвета.

По 5 суппозитория в контурной ячейковой упаковке. По 2 контурных ячейковых упаковок вместе с листком-вкладышем в картонной пачке.

Условия отпуска

По рецепту врача.

Держатель регистрационного удостоверения и производитель**Держатель регистрационного удостоверения**

Биотехнос С.А.

ул. Горунулуй № 3-5, город Отопень, уезд Илфов, 075100, Румыния

Тел: + 40 31 710 23 83; + 40 31 710 24 02

Факс: + 40 31 710 24 00

Эл. адрес: office@biotehnos.com

Производитель

ООО «ФАРМАПРИМ»

ул. Кринилор, 5, с. Порумбень, р-он Криулень,
Республика Молдова, MD-4829

www.farmaprim.md

