

ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ - ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПАЦИЕНТА

Базацил, 25 мг/г, гель для наружного применения

Бензоила пероксид

Перед применением препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для вас сведения.

Всегда применяйте препарат в точности с данным листком или рекомендациями лечащего врача, или работника аптеки.

Сохраните листок-вкладыш. Возможно, вам потребуется прочитать его еще раз.

Если вам нужны дополнительные сведения или рекомендации, обратитесь к работнику аптеки.

Если у вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.

Если состояние не улучшается или оно ухудшается, вам следует обратиться к врачу.

В этом листке-вкладыше содержится информация:

1. Что из себя представляет препарат Базацил, и для чего его применяют.
2. О чем следует знать перед применением препарата Базацил.
3. Применение препарата Базацил.
4. Возможные нежелательные реакции.
5. Хранение препарата Базацил.
6. Содержимое упаковки и прочие сведения.

1. ЧТО ИЗ СЕБЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ПРЕПАРАТ БАЗАЦИЛ И ДЛЯ ЧЕГО ЕГО ПРИМЕНЯЮТ

Препарат Базацил содержит действующее вещество бензоила пероксид и относится к препаратам для лечения угревой сыпи применяемым наружно.

Показания к применению

Базацил гель применяется для местного лечения обыкновенных угрей (акне).

Акне проявляется в виде черных и белых угрей, которые часто называют прыщами. Этим лекарством можно лечить угревую сыпь на лице, груди или спине.

Гель Базацил содержит бензоила пероксид, обладающий антимикробной активностью в отношении бактерий, которые в чрезмерных количествах присутствуют в волосяных фолликулах при акне и являются основной причиной воспалительных явлений. Препарат также оказывает кератолитическое действие (способствует размягчению и отторжению рогового слоя эпидермиса) и подавляет избыточную продукцию кожного сала в сальных железах.

Если симптомы не улучшаются или ухудшаются после 4 недель лечения, следует обратиться к врачу для переоценки клинической ситуации.

2. О ЧЕМ СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРЕПАРАТА БАЗАЦИЛ

Противопоказания.

Не применяйте препарат Базацил, если у вас аллергия на бензоила пероксид или любые другие компоненты препарата (перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша).

Особые указания и меры предосторожности.

Перед применением препарата Базацил проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

При первом применении геля может возникнуть ощущение легкого жжения, а в течение нескольких дней – покраснение и шелушение кожи. У большинства пациентов в первые недели лечения появляется заметное шелушение кожи. Это не опасно и, как правило, проходит в течение одного или двух дней при временном прекращении лечения. При возникновении тяжелого раздражения кожи следует уменьшить частоту нанесения препарата, временно или полностью прекратить применение препарата.

При применении бензоила пероксида могут возникать такие симптомы, как отеки и образование волдырей на коже. В этом случае необходимо прекратить лечение препаратом.

Избегайте попадания геля на слизистые оболочки глаз, рта и носа. При случайном попадании препарата на слизистые оболочки необходимо тщательно промыть их теплой водой.

Особую осторожность следует соблюдать людям со светлой кожей и при нанесении препарата на чувствительные области (лицо, шея, декольте).

Избегайте чрезмерного воздействия солнечного света и ультрафиолетового излучения.

Не наносите гель бензоила пероксида на поврежденную кожу.

Контакт с окрашенными материалами, включая волосы и окрашенные ткани, может привести к изменению их цвета или обесцвечиванию.

Другие препараты и препарат Базацил.

Сообщите лечащему врачу или работнику аптеки о том, что вы принимаете, недавно принимали или можете начать принимать какие-либо другие препараты.

Вам не следует использовать лекарства с отшелушивающим, раздражающим и подсушивающим действием (например, средства, содержащие спирт) одновременно с Базацилом.

Не используйте Базацил с любыми другими средствами от прыщей, которые наносятся на кожу, если только ваш врач не сказал вам, что это следует делать.

Применение беременными и кормящими грудью женщинами, сведения о фертильности.

Если вы беременны или кормите грудью, думаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Беременность

Отсутствует опыт применения бензоила пероксида у беременных. Бензоила пероксид следует применять у беременных женщин только после консультации с врачом.

Кормление грудью

Избегайте использования этого лекарства, если вы кормите грудью, если только ваш врач не сказал вам об обратном. Если ваш врач рекомендовал использовать этот продукт во время грудного вскармливания, вы не должны наносить гель на грудь. Это делается для того, чтобы избежать воздействия этого лекарства на вашего ребенка.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами.

Гель Базацил не оказывает влияния на способность к управлению транспортными средствами и работе с механизмами.

Особые указания, касающиеся вспомогательных веществ.

Гель Базацил содержит пропиленгликоль, который может вызывать раздражение кожи. В период лечения рекомендуется применять щадящие очищающие средства (мытьё не чаще двух раз в день), воздержаться от использования любой косметики, парфюмерных или спиртосодержащих средств.

3. ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА БАЗАЦИЛ

Всегда применяйте данный препарат в полном соответствии с данным листком или рекомендациями лечащего врача или работника аптеки. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Базацил предназначен ТОЛЬКО для НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ.

Перед применением промойте пораженный участок мягким средством для очищения кожи и водой и аккуратно вытрите кожу насухо. Наносите гель тонким слоем один или два раза в день (утром и вечером) на все пораженные участки.

Если у вас чувствительная кожа, наносите гель один раз в день.

При применении Базацила могут появиться сухость или шелушение кожи. Для уменьшения этих симптомов уменьшите количество применений, например, один раз в день или раз в два дня, пока ваша кожа не привыкнет к лекарству.

После применения Базацила следует вымыть руки.

При использовании Базацила вам следует стараться избегать воздействия сильного солнечного света. Если воздействие неизбежно, используйте подходящий солнцезащитный лосьон и нанесите Базацил на пораженный участок, не забыв промыть его перед использованием.

Длительность лечения Базацилом, зависит от того, насколько быстро улучшится ваше состояние. После того, как вы использовали его в течение одного месяца, вам следует снова обратиться к своему врачу для того, чтобы он или она проверили улучшение вашего состояния.

Если вы забыли применить Базацил или применили недостаточное количество

Не волнуйтесь, если вы забудете использовать свой гель в нужное время. Когда вы вспомните, начните использовать лекарство снова, таким же образом, как и раньше. Не удваивайте дозу, чтобы компенсировать пропущенное применение препарата.

Если вы применили препарат Базацил больше, чем следовало.

Если вы случайно нанесете слишком много геля, у вас может появиться раздражение кожи. Смойте столько геля, сколько сможете, и когда раздражение пройдет, начните использовать его снова в соответствии с указаниями врача.

В случаях, когда вы случайно проглотили это лекарство, обратитесь за консультацией к врачу.

При наличии вопросов по применению препарата, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.

4. ВОЗМОЖНЫЕ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ РЕАКЦИИ

Подобно всем лекарственным препаратам Базацил может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

Самыми серьезными нежелательными реакциями являются аллергические реакции: реакции в виде затруднения дыхания, отека лица, губ, языка и полости рта, обморока.

Если у вас появились указанные симптомы, немедленно прекратите применение препарата и сразу обратитесь за неотложной медицинской помощью.

Очень частыми (могут возникать у более чем 1 человека из 10) нежелательными реакциями являются: сухость кожи, покраснение кожи, шелушение кожи, ощущение жжения кожи.

Частыми (не более чем у 1 человека из 10) нежелательными реакциями являются: зуд, боль, покалывание на коже, раздражение кожи.

Нечастой (не более чем у 1 человека из 100) нежелательной реакцией является: аллергический контактный дерматит.

Нежелательные реакции, частота которых неизвестна (исходя из имеющихся данных частоту возникновения определить невозможно): отек лица, кожная сыпь, фоточувствительность, отек век.

Если вы отмечаете любой из указанных симптомов, прекратите прием препарата и обратитесь к лечащему врачу.

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки. Данная рекомендация распространяется на

любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях в информационную базу данных по нежелательным реакциям (действиям) на лекарственные препараты, включая сообщения об неэффективности лекарственных препаратов через национальную систему сообщений (см. ниже). Сообщая о нежелательных реакциях, вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

Республика Беларусь

УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении»

Адрес: г Минск, Товарищеский пер., 2а, 220037

Тел. +375(17) 242 00 29

5. ХРАНЕНИЕ ПРЕПАРАТА БАЗАЦИЛ

Храните препарат в недоступном для ребенка месте так, чтобы ребенок не мог увидеть его.

Не применяйте препарат после истечения срока годности (срока хранения), указанного на картонной пачке. Датой истечения срока годности является последний день месяца.

После вскрытия тубы препарат годен в течение 6 месяцев.

Храните препарат при температуре ниже 25°C.

Не выбрасывайте препарат в канализацию. Уточните у работника аптеки, как следует утилизировать (уничтожать) препараты, которые больше не потребуются. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

6. СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ И ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ

Препарат Базацил содержит

1 г геля содержит:


Активные вещества: бензоила пероксид (в виде бензоила пероксида водного) – 25 мг;

Вспомогательные вещества: сепинео Р 600 (сополимер акриламида и натрия акрилоилдиметилтаурата, изогексадекан, полисорбат 80, сорбитан олеат, вода), докузат натрия, динатрия эдетат, глицерин, полоксамер 124, пропиленгликоль, вода очищенная.

Внешний вид препарата Базацил и содержимое упаковки

Гель от белого до бледно-желтого цвета по 30 г в алюминиевой тубе с контролем первого вскрытия. Одну тубу с листком-вкладышем (информация для пациента) помещают в картонную пачку.

7.ДЕРЖАТЕЛЬ РЕГИСТРАЦИОННОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ И
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
Республика Беларусь



ООО «Ламира-Фармакар», по лицензии ЛАМИРА ЛЛП, Соединенное Королевство
Великобритании и Северной Ирландии.
222215, Минская область, Смолевичский район, Озерицко-Слободской с/с, 10Б
вблизи аг. Слобода, комната 55.
Тел/факс: + 375 (17) 555-52-76
E-mail: info@lphc.by

Представитель держателя регистрационного удостоверения

Претензии потребителей отправлять по адресу: Республика Беларусь, ООО
"Ламира-Фармакар"
222215, Минская область, Смолевичский район, Озерицко-Слободской с/с, 10Б
вблизи аг. Слобода, комната 55.
Тел/факс: + 375 (17) 555-52-76
E-mail: info@lphc.by

Отпуск из аптек

Отпускают без рецепта врача.

Листок-вкладыш пересмотрен

Июль 2023