


Листок-вкладыш - информация для пациента**Фильтрум[®], 400 мг, таблетки****Действующее вещество: лигнин гидролизный**

Перед приемом препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения

Всегда принимайте препарат в точности с листком-вкладышем или рекомендациями лечащего врача или работника аптеки.

Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.

Если Вам нужны дополнительные сведения или рекомендации, обратитесь к работнику аптеки.

Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.

Если состояние не улучшается или оно ухудшается, Вам следует обратиться к врачу.

Содержание листка-вкладыша

1. Что из себя представляет препарат Фильтрум[®], и для чего его применяют.
2. О чем следует знать перед приемом препарата Фильтрум[®].
3. Прием препарата Фильтрум[®].
4. Возможные нежелательные реакции.
5. Хранение препарата Фильтрум[®].
6. Содержимое упаковки и прочие сведения.

1. Что из себя представляет препарат Фильтрум[®], и для чего его применяют

Препарат Фильтрум[®] содержит действующее вещество: лигнин гидролизный.

Лигнин гидролизный – природный энтеросорбент, состоящий из продуктов гидролиза компонентов древесины – полимера лигнина, структурными элементами которого являются производные фенилпропана и гидроцеллюлозы.

Обладает высокой сорбирующей активностью и неспецифическим дезинтоксикационным действием.

Связывает и выводит из организма патогенные бактерии и бактериальные токсины, лекарственные препараты, яды, соли тяжелых металлов, алкоголь,

аллергены, а также избыток некоторых продуктов обмена веществ, в том числе билирубина, холестерина, мочевины, метаболитов, ответственных за развитие эндогенного токсикоза.

Не токсичен, не всасывается, полностью выводится из кишечника в течение 24 часов.

Показания к применению

В качестве дезинтоксикационного средства у взрослых и детей при экзогенных и эндогенных интоксикациях различного происхождения:

- острые отравления лекарственными препаратами, алкалоидами, солями тяжелых металлов, алкоголем и другими ядами;
- комплексное лечение пищевых токсикоинфекций, сальмонеллеза, дизентерии, диспепсии;
- гнойно-воспалительные заболевания, сопровождающиеся выраженной интоксикацией;
- гипербилирубинемия и гиперазотемия (печеночная и почечная недостаточность);
- пищевая и лекарственная аллергия;
- профилактика хронических интоксикаций у работников вредных производств.

Если улучшение не наступило или Вы чувствуете ухудшение, необходимо обратиться к врачу.

2. О чем следует знать перед приемом препарата Филтрум®

Противопоказания

Не принимайте препарат Филтрум®, если у Вас:


- аллергия на лигнин гидролизный или любые другие компоненты препарата (перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша),
- нежелательно использовать препарат при обострении язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки, атонии кишечника.

Особые указания и меры предосторожности

Перед приемом препарата Филтрум® проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Ввиду отсутствия системного действия, выявленных значимых лекарственных взаимодействий, а также установленных серьезных нежелательных реакций, особых мер предосторожности при применении лекарственного препарата Филтрум® не требуется.

Другие препараты и препарат Филтрум®



Препарат может использоваться в комплексной терапии совместно с другими лекарственными препаратами при соблюдении правила раздельного приема.

Принимать после предварительного измельчения (при необходимости), запивая водой, за час до еды и приема других лекарственных средств.

Нет данных относительно использования препарата в период беременности и лактации.

Препарат не оказывает негативного влияния на способность управлять транспортными средствами и/или другими механизмами.

детям до 1 года — по ½ таблетки 3–4 раза в день.

При необходимости, по рекомендации врача суточная доза может быть увеличена до 20–30 г в 3–4 приема.

Внутрь, желательно после предварительного измельчения, запивая водой, за час до еды и приема других лекарственных средств.

Длительность лечения при острых состояниях 3–5 дней, при аллергических заболеваниях и хронических интоксикациях до 14–21 дней.

Повторные курсы должны проводиться не ранее чем через 2 недели только по рекомендации врача.

Симптомы: специфических симптомов передозировки не описано.

Лечение: при подозрении на передозировку рекомендуется отмена препарата и стандартные меры неотложной помощи.

При пропуске одной или нескольких доз лекарственного препарата Фильтрум® не следует принимать двойную дозу препарата, чтобы компенсировать пропущенную дозу.

При возникновении дополнительных вопросов о применении препарата пациенту необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.

Подобно всем лекарственным препаратам, препарат может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

- аллергические реакции

- запор

- нарушение всасывания витаминов, кальция*

* - длительное применение может приводить к нарушению всасывания витаминов, кальция, в связи с чем рекомендуется профилактический прием поливитаминов и препаратов кальция.

Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом. Данная рекомендация распространяется на

СОГЛАСОВАНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Приказ Министерства здравоохранения
Республики Беларусь от 14.06.2017 № 10/01

любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях напрямую (см. ниже). Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

Республика Беларусь

Адрес: 220037, г. Минск, пер. Товарищеский, 2а

УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении»

Телефон: +375 (17) 242-00-29

Факс: +375 (17) 242-00-29

Электронная почта: rcpl@rceth.by

<https://www.rceth.by>

5. Хранение препарата Фильтрум®

Храните препарат в недоступном и невидном для детей месте.

Храните препарат в оригинальной упаковке (пачке) при температуре не выше 25 °С.

Не применяйте препарат после истечения срока годности (срока хранения), указанного на картонной пачке после «Годен до:».

Датой истечения срока годности является последний день данного месяца.

Не выбрасывайте препарат в канализацию. Уточните у работника аптеки, как следует утилизировать (уничтожать) препарат, который больше не потребуется. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

6. Содержимое упаковки и прочие сведения

Препарат Фильтрум® содержит

Действующим веществом является лигнин гидролизный.

Каждая таблетка содержит:

лигнин гидролизный (в пересчете на 100 % вещество) – 400,00 мг.

Прочими ингредиентами (вспомогательными веществами) являются: повидон К-17 (поливинилпирролидон), тальк, кальция стеарат, кремния диоксид коллоидный безводный, кроскармеллоза натрия, целлюлоза микрокристаллическая.

Внешний вид препарата Фильтрум® и содержимое упаковки

Таблетки.



6924 - 2025

Капсуловидные двояковыпуклые таблетки темно-коричневого цвета с вкраплениями от серого до коричневого цвета с риской с одной стороны таблетки.

По 10 таблеток помещают в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой печатной лакированной.

По 5 контурных ячейковых упаковок по 10 таблеток вместе с листком-вкладышем помещают в пачку из картона.

Держатель регистрационного удостоверения

Кипр

АВВА Фармасьютикалс Лтд.,

23А Спиру Киприану, 4001 Меса Гейтония, Лимассол.

Производитель

АО «АВВА РУС», Россия

Кировская обл., г. Киров, ул. Луганская, д. 53А.

За любой информацией о препарате следует обращаться к представителю держателя регистрационного удостоверения:

Россия

АО «АВВА РУС»

121614, г. Москва, ул. Крылатские Холмы, д. 30, корп. 9.

Тел.: +7 (495) 956-75-54.

info@avva-rus.ru

Листок-вкладыш пересмотрен

