


Листок-вкладыш: Информация для пациента**Флавамед® форте шипучие таблетки,**(амброксола гидрохлорид);
60 мг, шипучие таблетки.

Для взрослых и подростков старше 12 лет



Перед применением препарата полностью прочтайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для вас сведения.

Всегда принимайте препарат в точности с листком-вкладышем или рекомендациями лечащего врача или работника аптеки.

- Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.
- Если вам нужны дополнительные сведения или рекомендации, обратитесь к работнику аптеки.
- Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.
- Если состояние не улучшается или оно ухудшается, через 4-5 дней Вам следует обратиться к врачу.

Содержание данного листка-вкладыша

1. Что из себя представляет препарат Флавамед® форте, и для чего его применяют.
2. О чем следует знать перед приемом препарата Флавамед® форте.
3. Прием препарата Флавамед® форте.
4. Возможные нежелательные реакции.
5. Хранение препарата Флавамед® форте.
6. Содержимое упаковки и прочие сведения.

1 Что из себя представляет препарат Флавамед® форте и для чего его применяют

В препарате Флавамед® форте содержится действующее вещество амброксола гидрохлорид, который относится к отхаркивающим средствам, применяемым при кашле и простудных заболеваниях. Амброксола гидрохлорид применяется для разжижения слизи при респираторных заболеваниях (острых и хронических заболеваниях бронхов и легких), сопровождающихся выделением вязкой, трудноотделяемой мокроты.

Если улучшение не наступило или вы чувствуете ухудшение через 4-5 дней, необходимо обратиться к врачу.

Под влиянием препарата Флавамед® форте слизь становится более жидкой, и ее легче откашливать.

Препарат Флавамед® форте шипучие таблетки показан взрослым и подросткам старше 12 лет.

2 О чем следует знать перед приемом препарата Флавамед® форте**Не принимайте Флавамед® форте**

- Если у Вас аллергия на амброксола гидрохлорид или любой другой из компонентов данного лекарственного препарата (см. раздел 6).

- У детей в возрасте до 12 лет.

8539 - 2017

Особые указания и меры предосторожности

Перед приемом препарата Флавамед® форте обратитесь за консультацией к своему врачу или работнику аптеки

- Если у Вас в прошлом имели место очень тяжелые реакции повышенной чувствительности со стороны кожи (синдром Стивенса-Джонсона, синдром Лайелла).

- Синдром Стивенса-Джонсона представляет собой заболевание, характеризующееся высокой температурой тела и сыпью с образованием пузырей на коже и слизистых оболочках.
- Синдром Лайелла, представляющий угрозу для жизни, известен также как синдром ошпаренной кожи. Его признаками являются крупные пузыри на коже – как при ожоге.

Имеются сообщения о тяжелых кожных реакциях, связанных с приемом амброксола. Если у Вас появилась кожная сыпь (включая поражения слизистых оболочек рта, горла, носа, глаз, половых органов), прекратите использование препарата Флавамед® форте и немедленно обратитесь к врачу.

- Если Вы страдаете непереносимостью гистамина. В этом случае следует избегать длительного приема препарата Флавамед® форте, так как его действующее вещество оказывает влияние на обмен гистамина и может вызвать симптомы непереносимости (например, головная боль, насморк, зуд).

- Если Вы страдаете нарушением функции почек или тяжелым заболеванием печени. В таких случаях Вам следует принимать препарат Флавамед® форте лишь с соблюдением особой осторожности (т.е. с более длительными промежутками времени между приемами или в меньшей дозе – обратитесь за советом к своему врачу). При нарушении функции почек тяжелой степени возможно накопление продуктов распада действующего вещества препарата Флавамед® форте.

- Если Вы страдаете редким заболеванием бронхов, сопровождающимся усиленной выработкой слизи (например, синдром неподвижных ресничек). При этом удаление слизи из легких становится невозможным. В этом случае Вам следует принимать Флавамед® форте только под наблюдением врача.

- Если Вы в прошлом страдали язвенной болезнью, Вам следует посоветоваться со своим врачом, как принимать препарат Флавамед® форте, поскольку муколитики могут нарушать целостность слизистой оболочки желудка. Перед приемом препарата Флавамед® форте проконсультируйтесь со своим врачом.

Дети и подростки

Флавамед® форте шипучие таблетки, 60 мг не подходит для детей в возрасте до 12 лет из-за высокого содержания действующего вещества.

Другие лекарственные препараты и препарат Флавамед® форте

Сообщите лечащему врачу или работнику аптеки о том, что вы применяете, недавно применяли или можете начать применять какие-либо другие препараты, в том числе отпускаемые без рецепта врача.

Средства, подавляющие кашель (противокашлевые средства)

Во время приема препарата Флавамед® форте какие-либо лекарственные средства, подавляющие кашлевой рефлекс (так называемые противокашлевые средства) использовать нельзя. Кашлевой рефлекс важен для откашливания разжиженной мокроты и, таким образом, для ее удаления из легких.

СОГЛАСОВАНО

МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Приказ Министерства здравоохранения

Республики Беларусь

Беременность, грудное вскармливание и fertильность

СОГЛАСОВАНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Приказ Министерства здравоохранения
Республики Беларусь

8539 - 207

Если Вы беременны или кормите грудью, предполагаете, что беременны, или планируете беременность, перед приемом данного лекарственного препарата обратитесь за консультацией к своему врачу или работнику аптеки.

Беременность:

Препарат Флавамед® форте допустимо принимать во время беременности или кормления грудью исключительно по прямому указанию Вашего врача! Препарат Флавамед® форте не рекомендуется применять, главным образом, в течение первых трех месяцев беременности.

Грудное вскармливание:

Установлено, что действующее вещество препарата Флавамед® форте переходит в молоко матери. В период кормления грудью препарат Флавамед® форте к использованию не рекомендуется.

Фертильность:

В исследованиях на животных вредного воздействия амброксола на детородную функцию не обнаружено.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

Препарат Флавамед® форте не влияет или же оказывает незначительное воздействие на способность к управлению транспортными средствами и обслуживанию механизмов.

В препарате Флавамед® форте содержатся лактоза, сорбит, натрий и бензиловый спирт.

Лактоза

Если от врача Вам известно, что у Вас имеет место непереносимость сахара некоторых видов, то, прежде чем принимать данное лекарственное средство, проконсультируйтесь со своим врачом.

Сорбит

В одной шипучей таблетке данного лекарственного препарата содержится 29,29 мг сорбита.

Натрий

В одной шипучей таблетке данного лекарственного препарата содержится 126,5 мг натрия (основной компонент поваренной/столовой соли). Это соответствует 6,33% от рекомендуемой максимальной суточной нормы потребления натрия с пищей для взрослого человека.


Бензиловый спирт

В одной шипучей таблетке данного лекарственного препарата содержится 0,78 мг бензилового спирта. Бензиловый спирт может вызывать аллергические реакции. Если Вы беременны или кормите грудью, обратитесь за советом к своему врачу или работнику аптеки. Это связано с тем, что у Вас в организме может в большом количестве накапливаться бензиловый спирт, который в состоянии вызывать побочные эффекты (так называемый «метаболический ацидоз»). Если у Вас имеются заболевания печени или почек, обратитесь за советом к своему врачу или работнику аптеки. Это связано с тем, что у Вас в организме может в большом количестве накапливаться бензиловый спирт, который в состоянии вызывать побочные эффекты (так называемый «метаболический ацидоз»).

3 Как принимать Флавамед® форте

Данный препарат всегда используйте в точности так, как описано в данном листке-вкладыше, или же так, как Вам объяснил Ваш врач или работник аптеки. Если Вы в чем-то не уверены, посоветуйтесь со своим врачом или работником аптеки.

При отсутствии дополнительных указаний врача Флавамед® форте принимают так, как описано ниже. Соблюдайте инструкцию по применению, поскольку в противном случае препарат Флавамед® форте не будет действовать должным образом!



Рекомендуемая доза:

Взрослые и подростки старше 12 лет: как правило, ½ шипучей таблетки (эквивалентно 30 мг амброксола гидрохлорида 3 раза в день) 3 раза в день в течение первых 2-3 дней, после чего по ½ шипучей таблетки 2 раза в день (эквивалентно 30 мг амброксола гидрохлорида 2 раза в день).

Для взрослых возможно повышение эффективности препарата за счет приема по 1 шипучей таблетке 2 раза в сутки (эквивалентно 120 мг амброксола гидрохлорида/сутки).

Способ применения

Для приема внутрь. Шипучие таблетки следует растворить в стакане воды и после еды этот раствор выпить. Раствор принимают сразу после приготовления.

Таблетку можно разделить на 2 равные дозы.

Длительность применения

Флавамед® форте не следует принимать дольше 4-5 дней без консультации с врачом. Если на протяжении 4-5 дней Ваше состояние не улучшится или даже ухудшится, следует немедленно обратиться к врачу!

Сообщите своему врачу или работнику аптеки, если Вам кажется, что действие препарата Флавамед® форте слишком сильное или же слишком слабое.

Если Вы приняли препарат Флавамед® форте в большем количестве, чем Вам следовало

Как сообщалось, симптомы, наблюдаемые при случайной передозировке и/или ошибке при использовании препарата, схожи с возможными побочными действиями препарата Флавамед® форте шипучие таблетки, 60 мг при его приеме в рекомендуемых дозах. В случае передозировки обратитесь к врачу, который должен назначить лечение в соответствии с возникшими признаками передозировки.

Если Вы забыли принять препарат Флавамед® форте

или приняли его слишком мало, просто примите лекарственный препарат в рекомендуемой дозе во время следующего приема.

Не принимайте препарат в двойной дозе для восполнения пропущенного приема.

Если у Вас имеются дальнейшие вопросы относительно использования данного препарата, обратитесь к своему врачу или работнику аптеки.

4 Возможные нежелательные реакции

Подобно всем лекарственным препаратам Флавамед® форте шипучие таблетки может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

Нежелательные реакции

Часто (могут возникать менее чем у 1 человека из 10):

- Дисгевзия (т.е. изменение вкусовых ощущений)
- Тошнота, снижение чувствительности рта и горла

Нечасто (могут возникать менее чем у 1 человека из 100):


- Рвота, понос, нарушение пищеварения, боли в животе и сухость во рту
- Повышение температуры тела

Редко (могут возникать менее чем у 1 человека из 1000):

- Реакции повышенной чувствительности
- Сыпь, крапивница

Неизвестно (исходя из имеющихся данных, частоту возникновения определить невозможно):

- Анафилактические реакции, включая анафилактический шок, ангионевротический отек (быстро развивающийся отек кожи и тканей подкожной клетчатки, слизистой оболочки, тканей подслизистого слоя) и суд
- Тяжелые нежелательные реакции со стороны кожи (включая многоформную эритему, синдром Стивенса-Джонсона /токсический эпидермальный некролиз и острый генерализованный экзантематозный пустулез)
- Сухость в горле



Сообщение о нежелательных реакциях

Если у вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в листке-вкладыше. Сообщая о нежелательных реакциях, вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

5 Как хранить препарат Флавамед® форте

Данное лекарственное средство храните в недоступном для детей месте.

Не используйте данный препарат после истечения срока годности, указанного на этикетке многодозовой емкости и на складной картонной коробочке после слов «Годен до». Датой истечения срока годности является последний день указанного месяца.

Хранить при температуре не выше 30°C.

Для защиты от света и влаги тубы хранить в плотно укупоренном контейнере (полипропиленовые тубы с полиэтиленовой крышкой, содержащей влагопоглотитель). Никакие лекарственные препараты не выбрасывайте в канализацию или с бытовым мусором. В отношении утилизации ненужного лекарственного препарата проконсультируйтесь у работника аптеки. Эти меры способствуют защите окружающей среды.

6 Содержимое упаковки и прочие сведения

Состав препарата Флавамед® форте

Действующим веществом является амброксола гидрохлорид.

В одной шипучей таблетке содержится 60 мг амброксола гидрохлорида.

Прочие компоненты:

Лимонная кислота, безводная

Натрия гидрокарбонат

Натрия карбонат, безводный

Сахарина натриевая соль

Натрия цикламат

Натрия хлорид

Натрия цитрат

Лактоза

Маннит (E 421)

Сорбит (E 420)

Вишневый ароматизатор «ALH» (код 801), в котором содержатся сорбит, натрий, пропиленгликоль и бензиловый спирт

Симетикон

Внешний вид препарата Флавамед® форте и содержимое упаковки

Внешний вид шипучих таблеток: Круглые белые таблетки с насечкой для деления на одной стороне и с фаской с обеих сторон.

Внешний вид раствора: Бесцветный, прозрачный, не содержащий механических включений.

Таблетку можно разделять на равные дозы.

НД РБ
8539 - 2017

Полипропиленовые тубы с полиэтиленовой пробкой, в которой содержится осушитель.

В одной оригинальной (фирменной) упаковке содержится одна туба с 10 шипучими таблетками и листок-вкладыш.

Условия отпуска

Данный лекарственный препарат отпускается без рецепта.



Держатель регистрационного удостоверения и производитель

БЕРЛИН-ХЕМИ АГ

Глиникер Вег 125

12489 Берлин

Тел.: (030) 67 07-0

Факс: (030) 67 07-21 20

Email: info@berlin-chemie.de

За любой информацией о препарате, а также в случаях возникновения претензий следует обращаться к представителю держателя регистрационного удостоверения:

Республика Беларусь

ОАО «Berlin-Chemie AG» (ФРГ) представительство в Республике Беларусь,

ул. Замковая 27, оф. 2,

220004, Минск.

Тел.: 2702680, 2702681

Факс: 2702684.

e-mail: bc-bel-minsk@berlin-chemie.com

Данный листок-вкладыш пересмотрен:

Прочие источники информации

Подробные сведения о данном препарате содержатся на веб-сайте УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении»: www.rceth.by