

29.7.16 - 2021

**Инструкция по медицинскому применению
ФУРАЦИЛИН ФЛ,
таблетки для приготовления раствора
для местного применения 20 мг**

Действующее вещество: НИТРОФУРАЛ

ПЕРЕД ПРИЕМОМ ДАННОГО ПРЕПАРАТА ПОЛНОСТЬЮ ПРОЧИТАЙТЕ ЭТОТ ЛИСТОК. ПОСКОЛЬКУ В НЕМ СОДЕРЖАТЬСЯ ВАЖНЫЕ ДЛЯ ВАС СВЕДЕНИЯ

- Сохраните этот листок. Возможно, вам потребуется прочитать его еще раз.
- Если у Вас возникли дополнительные вопросы, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки. Этот препарат назначен именно Вам. Не передавайте его другим. Он может навредить этим людям, даже если симптомы их заболевания совпадают с Вашими.
- Если у вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе не перечисленные в данном листке.

СОДЕРЖАНИЕ ДАННОГО ЛИСТКА

1. Что из себя представляет ФУРАЦИЛИН ФЛ, и для чего его применяют
2. О чём следует знать перед приемом ФУРАЦИЛИН ФЛ
3. Применение ФУРАЦИЛИН ФЛ
4. Возможные нежелательные реакции
5. Хранение ФУРАЦИЛИН ФЛ
6. Содержимое упаковки и прочие сведения



1. ЧТО ИЗ СЕБЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ФУРАЦИЛИН ФЛ, И ДЛЯ ЧЕГО ЕГО ПРИМЕНЯЮТ

Каждая таблетка ФУРАЦИЛИН ФЛ содержит действующее вещество нитрофурал. Нитрофурал – синтетическое противомикробное средство для лечения бактериальных инфекций.

ФУРАЦИЛИН ФЛ применяют

- Наружно для лечения гнойных ран, пролежней, ожогов II-III степени, мелких повреждений кожи (в т.ч. ссадин, порезов, царапин, трещин).
- Местно для лечения острого тонзиллита, стоматита, гингивита.

2. О ЧЕМ СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ФУРАЦИЛИН ФЛ

Не принимайте ФУРАЦИЛИН ФЛ если у Вас:

- Повышенная чувствительность к нитрофуралу, производным нитрофурана или любому другому компоненту этого лекарства (см. раздел 6 «Содержимое упаковки и прочие сведения»)
- аллергические повреждения кожи
- сильно снижена функция почек

Если что-то из перечисленного касается Вас, сообщите об этом лечащему врачу или работнику аптеки.

Меры предосторожности при приеме ФУРАЦИЛИН ФЛ:

Только для наружного и местного применения!

В связи с отсутствием достаточных данных о безопасном применении препарата не рекомендуется

применения у детей и подростков до 18 лет.

При применении лекарственного препарата возможно развитие повышенной чувствительности. Чтобы избежать этого рекомендуется использовать препарат не более 5 дней.

В случаях применения препарата при тяжелых ожогах на больших поверхностях на фоне нарушения функции почек возможно прогрессирование почечной недостаточности. Рекомендуется тщательное наблюдение за функцией почек при применении лекарственного препарата на больших поверхностях кожи, в частности при тяжелых ожогах. Использование нитрофурана может привести к чрезмерному росту грибков или бактерий, не чувствительных к лекарственному препарату, которые могут привести к развитию **вторичной инфекции**.

Если при применении лекарственного препарата **симптомы заболевания сохраняются или состояние ухудшается, необходимо отменить применения лекарственного препарата** и обратиться к врачу.

СОЛДАНО
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Приказ Министерства здравоохранения
Республики Беларусь

ФУРАЦИЛИН ФЛ несовместим с:

- Эpineфрином (адреналин), тетракаином, прокаином (новокаин), резорцином (резорцин) и другими восстановителями, так как разлагается с образованием окрашенных в розовый или бурый цвет продуктов.
- Перманганатом калия, перекисью водорода и другими окислителями вследствие окисления лекарственного препарата.

Беременность и кормление грудью

При назначении беременным женщинам, женщинам в период грудного вскармливания рекомендуется учитывать возможное соотношение риска и пользы от применения данного лекарственного препарата.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

Влияние на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с потенциально опасными механизмами не наблюдалось.

3. ПРИМЕНЕНИЕ ФУРАЦИЛИН ФЛ

Всегда принимайте данный препарат точно так назначил лечащий врач. Проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки, если Вы не уверены.

Как принимать ФУРАЦИЛИН ФЛ

ФУРАЦИЛИН ФЛ применяется наружно и местно, в виде водного 0,02 % раствора. Для приготовления водного раствора 1 таблетку растворить в 100 мл воды (для быстрого растворения использовать горячую или кипящую воду). После этого раствор охладить до комнатной температуры.

При гнойных ранах, пролежнях, ожогах II-III степени, мелких повреждениях кожи рану орошают водным раствором ФУРАЦИЛИН ФЛ и накладывают влажные повязки.

При остром тонзиллите, стоматите, гингивите – полоскание рта и горла 100 мл 0,02 % раствора ФУРАЦИЛИН ФЛ (растворив 1 таблетку в 100 мл воды) 2-3 раза в день.

Продолжительность курса лечения по показаниям зависит от характера течения заболевания, локализации патологического процесса.

4. ВОЗМОЖНЫЕ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ РЕАКЦИИ

Подобно всем лекарственным препаратам, данный препарат может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех. При приеме препарата могут возникнуть следующие побочные эффекты:

аллергических реакций, включающие гиперемию, зуд, дерматиты, ангионевротический отек.

При появлении указанных либо других побочных реакций, неуказанный в инструкции, необходимо прекратить применения препарата и обратиться к врачу.

Сообщение о подозреваемых нежелательных реакциях

Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, рекомендуется проконсультироваться с лечащим врачом. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в инструкции по применению препарата. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях через национальную систему сообщения о нежелательных реакциях и неэффективности лекарственных препаратов (УП «Центр экспертизы и испытаний в здравоохранении», <https://www.rceth.by>). Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

СОГЛАСОВАНО
Министерством здравоохранения
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Приказ Министерства здравоохранения
Республики Беларусь

5. ХРАНЕНИЕ ФУРАЦИЛИН ФЛ

Храните препарат в недоступном и невидном для детей месте.

Срок годности: 2 года. Не применяйте данный препарат после истечения срока годности, указанного на упаковке. Датой истечения срока годности является последний день месяца.

Храните в защищённом от света и влаги месте, при температуре не выше 25 °C.

Готовый раствор можно хранить в течение 14 дней в хорошо закупоренных банках из темного стекла, в прохладном (8-15°C) и защищенном от света месте.

НД РБ

6. СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ И ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ

29716 - 2021

ФУРАЦИЛИН ФЛ содержит. Действующим веществом является нитрофурал. Каждая таблетка содержит 20 миллиграмм нитрофураля.

Вспомогательными веществами являются: натрия хлорид.

Внешний вид таблеток ФУРАЦИЛИН ФЛ и содержимое упаковки

Форма выпуска и описание. Таблетки для приготовления раствора для местного применения. Таблетки желтого или зеленовато-желтого цвета с неравномерной окраской поверхности, плоскоцилиндрической формы с фаской и риской на одной стороне. Риска не предназначена для разделения таблетки.

Упаковка. По 10 таблеток в контурную ячейковую упаковку из фольги алюминиевой и пленки поливинилхлоридной. По 30 таблеток в банках полимерных с крышкой натягиваемой с контролем первого вскрытия, уплотнительное средство – вата медицинская.

Одну, две или три контурные ячейковые упаковки или одну банку вместе с инструкцией по медицинскому применению помещают во вторичную упаковку (пачку) из картона коробочного.

Условия отпуска из аптек: Без рецепта.

Производитель:

Белорусско-голландское совместное предприятие общество с ограниченной ответственностью «Фармлэнд» (СП ООО «Фармлэнд»), Республика Беларусь, г. Несвиж, ул. Ленинская, 124, к. 3, тел/факс (+375 17) 373-31-90.