

**Инструкция по применению
лекарственного средства для потребителей
(листок-вкладыш)**

ИБЕРОГАСТ® (Iberogast®)




2095 - 2017

Торговое название

Иберогаст

Лекарственная форма

Капли для приема внутрь



Состав

1 мл содержит 9 экстрактов трав:

иберис горький (целого свежего растения экстракт жидкий) (1 : 1,5 - 2,5) 0,15 мл
(экстрагент: 50% этанол (о/о));

экстракт жидкий:

дягиля лекарственного корней сухих (1 : 2,5 - 3,5) 0,1 мл

ромашки аптечной цветков сухих (1 : 2 - 4) 0,2 мл

тмина обыкновенного плодов сухих (1 : 2,5 - 3,5) 0,1 мл

расторопши пятнистой зрелых плодов сухих (1:2,5-3,5) 0,1мл

мелиссы лекарственной листьев сухих (1 : 2,5 - 3,5) 0,1 мл

мяты перечной листьев сухих (1 : 2,5 - 3,5) 0,05 мл

чистотела майского травы сухой (1 : 2,5 - 3,5) 0,1 мл

солодки голой корней сухих (1 : 2,5 - 3,5) 0,1 мл

(экстрагент для всего сухого лекарственного сырья: 30% этанол (о/о)).

Содержание спирта 31% (о/о).

Фармакотерапевтическая группа

Средства для лечения функциональных расстройств желудочно-кишечного тракта. Код АТС: А03

Показания к применению

Для лечения функциональных и связанных с моторностью желудочно-кишечных расстройств, таких как функциональная диспепсия и синдром раздраженного кишечника, а также в комплексной терапии для симптоматического лечения гастрита.

Эти расстройства проявляются, в основном, такими симптомами, как боль в желудке, вздутие, метеоризм, желудочно-кишечные спазмы, тошнота и изжога.

Способ применения и дозы

Если врач не назначил другой дозировки, Иберогаст принимают 3 раза в день до или во время еды с небольшим количеством жидкости:

взрослые и подростки с 13 лет по 20 капель;

дети от 6 до 12 лет по 15 капель;

дети от 3 до 5 лет по 10 капель.

Принципиально нет никаких ограничений относительно продолжительности применения.

Продолжительность применения зависит от вида, тяжести и течения болезни.

Перед применением взболтать!

Открывая флакон в первый раз:


1. Снимите зеленую крышку. Отвинтите белую крышку от флакона и выбросьте ее.

2. Плотно завинтите зеленую крышку, содержащую капельницу для дозирования на флакон.

3. Снимите зеленую крышку и убедитесь, что капельница надежно закреплена.

СОУ ЛАСОВАНО
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Приказ Министерства здравоохранения
Республики Беларусь

НД РБ
2095 - 2017



При дозировании флакон следует держать под углом 45°. Плотно завинтите зеленую крышку после использования.

Нежелательные реакции

Нарушения со стороны иммунной системы: очень редко - реакции повышенной чувствительности, например, кожная сыпь, зуд, одышка.

Нарушения со стороны печени и желчевыводящих путей: частота неизвестна - сообщалось об отдельных случаях поражения печени, острой печеночной недостаточности, гепатите и неблагоприятном влиянии на показатели функции печени (повышение уровня трансаминаз и/или билирубина).

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях в информационную базу данных по нежелательным реакциям (действиям) на лекарственные препараты, включая сообщения о неэффективности лекарственных препаратов. Сообщая о нежелательных реакциях, вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к действующим веществам.

Иберогаст не следует принимать детям младше 3-х лет в связи с недостатком данных о применении в данной возрастной группе.

Препарат нельзя принимать при имеющихся заболеваниях печени или при наличии в анамнезе, а также при одновременном применении препаратов с гепатоповреждающими свойствами.

Передозировка

Если пациент примет слишком большое количество препарата или забудет принять его, в следующий раз следует продолжить прием согласно предписаниям врача или инструкции по дозировке. До сих пор случаев острой передозировки не наблюдалось.

Меры предосторожности

При боли в животе у детей до 6 лет нужно обязательно обратиться к врачу.

Если после приема данного препарата в течение одной недели симптомы сохраняются, либо ожидаемый эффект не достигнут, следует обратиться к врачу, чтобы исключить органические

причины. Если во время приема препарата Иберогаст симптомы ухудшатся или появятся новые симптомы, следует обратиться к врачу.

Иберогаст содержит 31% (по объему) этанола, т.е. 240 мг на разовую дозу для взрослых (20 капель), что равно 6,2 мл пива или 2,6 мл вина. Вреден для лиц с алкоголизмом.

Сообщалось о случаях лекарственного поражения печени, включая печеночную недостаточность. При появлении признаков поражения печени (пожелтение кожи или глаз, темная моча, обесцвеченный стул, боли в верхней части живота) пациенты должны немедленно прекратить прием препарата и обратиться к врачу.

ИДРБ
2095 - 2017

Беременность и лактация

Иберогаст не следует принимать беременным и кормящим женщинам.

Влияние на способность к вождению автомобиля и управлению механизмами

Лекарственное средство содержит этиловый спирт. В период лечения необходимо воздержаться от вождения автотранспорта и занятия другими потенциально-опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

До сих пор не известно о каких-либо формах взаимодействия.

Условия хранения

При температуре не выше 25 °С, в недоступном для детей месте.

В процессе хранения возможно помутнение или выпадение осадка, что не влияет на эффективность препарата.

Срок годности

2 года. Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Срок годности после вскрытия флакона: 8 недель.

Форма выпуска

Флаконы по 20 мл, 50 мл или 100 мл. Флакон вместе с листком-вкладышем помещен в картонную коробку.

Условия отпуска

Без рецепта.

Название фирмы-заявителя/производителя, адрес

Байер Консьюмер Кэр АГ,
Петер Мериан-Штрассе 84, 4052 Базель, Швейцария

ШТАЙГЕРВАЛЬД Арцнаймиттельверк ГмбХ,
Хафельштрассе 5, 64295 Дармштадт, Германия