

НД РБ

9799 - 2023
ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ



информация для потребителей
по медицинскому применению лекарственного средства

ИНГАЛИПТ-АВ
Inhalypum-AV

Регистрационный номер:

Торговое наименование: Ингалипт-АВ

Лекарственная форма: аэрозоль для местного применения

Состав на один баллон: 30 мл

Активные вещества:

Сульфаниламид натрия
(стрептоцид растворимый) – 750 мг

Сульфатиазол натрия пентагидрат – 750 мг

Эвкалиптовое масло – 15 мг

Мяты перечной масло – 15 мг

Тимол – 15 мг

Вспомогательные вещества:

Этиловый спирт 95 % – 1800 мг

Сахароза – 1500 мг

Глицерин – 2100 мг

Полисорбат 80 – 900 мг

Вода очищенная – до 30 мл

Азот газообразный – от 300 до 400 мг

Описание

Прозрачная жидкость от светло-желтого до темно-желтого цвета, при выходе из баллона образует струю с характерным запахом тимола и ментола.

Фармакотерапевтическая группа. Средства для лечения заболеваний гортани и глотки. Антисептические средства.

Код АТХ: R02AA20

Фармакологические свойства

Фармакологические эффекты лекарственного средства обусловлены действием компонентов, входящих в его состав. Стрептоцид растворимый и сульфатиазол натрия оказывают антимикробное действие в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий, вызывающих заболевания полости рта и глотки. При нанесении на слизистые оболочки препарат оказывает противовоспалительный и легкий обезболивающий эффект.

Показания к применению

Тонзиллит, фарингит, ларингит, афтозный и язвенный стоматит.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к любому из компонентов препарата, детский возраст (до 3 лет), тяжелая почечная недостаточность, тиреотоксикоз, заболевания крови, врожденный дефицит глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы, беременность, период лактации, наличие у детей судорог в анамнезе.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Противопоказано применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания. При необходимости использования препарата следует прекратить грудное вскармливание, т.к. сульфаниламиды проникают в грудное молоко и могут вызвать ядерную желтуху у новорожденных.

Способ применения и дозы

Местно. Сняв предохранительный колпачок с флакона и надев прилагаемый распылитель, распыляют взвесь в полость рта 1-2 секунды. Препарат удерживают в полости рта 5-7 минут. Орошение проводится 3-4 раза в сутки с предварительным прополаскиванием рта кипяченой водой.

Во избежание закупорки отверстия распылителя по окончании манипуляции его необходимо продуть или поместить в стакан с чистой водой.

При использовании баллон следует держать строго вертикально.

Побочное действие

Со стороны иммунной системы: аллергические реакции, включая бронхоспазм, ангионевротический отек;

Со стороны желудочно-кишечного тракта: тошнота, рвота;

Со стороны кожи и подкожной клетчатки: сыпь, зуд, крапивница;

Общие нарушения и реакции в месте введения: ощущение жжения во рту, першение в горле, гиперемия слизистой оболочки зева, отек в месте контакта.

При возникновении побочных реакций применение препарата следует прекратить и обратиться к врачу.

Передозировка

Симптомы: тошнота, рвота, связанные с заглатыванием части препарата.

Лечение: специфический антидот отсутствует, симптоматическая и поддерживающая терапия.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Возможно ослабление противомикробного действия сульфаниламидов при одновременном применении с препаратами – производными парааминобензойной кислоты (новокаин, анестезин, дикаин).

Меры предосторожности

Применение препарата Ингалипт у детей возможно только по рекомендации врача.

Не допускать попадания препарата в глаза!

У пациентов, страдающих от изжоги или грыжи пищевода, после приема масла мяты перечной возможно обострение симптомов. В этом случае лечение должно быть прекращено. Препарат следует использовать с осторожностью при камнях в желчном пузыре, заболеваниях печени и желчевыводящих путей, а также при воспалительных заболеваниях и изъязвлениях желудочно-кишечного тракта.

Не следует применять препарат длительно (более 7 дней) без консультации врача.

При распылении препарата в течение 1-2 секунд в ротовую полость попадает 30 мг этанола.

Поскольку лекарственное средство содержит сахарозу, пациентам с редко встречающейся наследственной непереносимостью фруктозы или глюкозо-галактозной мальабсорбцией не следует применять этот препарат.

Если во время применения лекарственного средства симптомы заболевания сохраняются или происходит ухудшение состояния, необходимо обратиться к врачу.

Влияние на способность управлять транспортными средствами и механизмами

Информация о неблагоприятном влиянии на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами – не зарегистрирована.

Форма выпуска

По 30 мл в баллоны аэрозольные алюминиевые, снабженные клапаном непрерывного действия, распылительной насадкой и предохранительным колпачком.

На баллон аэрозольный алюминиевый наклеивают этикетку из самоклеящейся бумаги.

Каждый баллон вместе с листком-вкладышем помещают в пачку из картона

Условия хранения

При температуре не выше 30 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

2 года.

Не применять после истечения срока годности.

НД РБ

9799 - 2023

Условия отпуска из аптек

Отпускают без рецепта.

Владелец РУ/предприятие-производитель/организация, принимающая претензии по качеству:

ЗАО «Алтайвитамины»

Адрес: 659325, Россия, Алтайский край, г. Бийск, ул. Заводская, 69

Телефон: (3854) 338-719, 326-948

Факс: (3854) 326-943

www.altayvitamin.ru

