

**Листок-вкладыш
лекарственного средства**

**КЛОТРИМАЗОЛ
суппозитории вагинальные**

- Перед использованием лекарственного средства КЛОТРИМАЗОЛ вы должны проконсультироваться с врачом.
- Внимательно прочтайте весь листок-вкладыш перед тем, как начать прием/использование этого лекарственного средства, так как он содержит важную для Вас информацию.
- Для достижения оптимальных результатов лекарственное средство следует использовать, строго выполняя все рекомендации, изложенные в инструкции (листке-вкладыше).
- Сохраните этот листок-вкладыш. Возможно, Вам понадобится прочесть его снова.
- Если у Вас возникли вопросы, обратитесь к врачу.
- Обратитесь к врачу, если Ваше состояние ухудшилось или улучшение не наступило после проведенного лечения.
- Это лекарственное средство прописано только Вам. Не передавайте его другим лицам. Это может нанести им вред, даже если симптомы их заболевания совпадают с Вашими.

**Торговое название
КЛОТРИМАЗОЛ**

**Международное непатентованное название (МНН)
Клотrimазол**

Общая характеристика

Суппозитории цилиндроконической формы, белого или белого с желтоватым оттенком цвета.

СОГЛАСОВАНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Приказ Министерства здравоохранения
Республики Беларусь
от «29» 11 2019 г. № 1422
КЛС № 10 от «04» 11 2019 г.

Состав

1 суппозиторий содержит:

активное вещество: клотrimазол 100 мг;

вспомогательное вещество: твердый жир.

Форма выпуска

Суппозитории вагинальные

Фармакотерапевтическая группа и код АТХ

Антисептические и противомикробные средства для применения в гинекологии.
Производные имидазола.

Код АТХ: G01AF02.

Показания к применению

Генитальные инфекции, вызванные дрожжевыми грибами рода Candida (кандидозного вагинита).
Если Вам требуется дополнительная информация о Вашем состоянии, обратитесь за советом к своему врачу.

Способ применения и дозы

Применение данного лекарственного средства возможно только после консультации с врачом!
Не прекращайте прием КЛОТРИМАЗОЛ без предварительной консультации с лечащим врачом!
Если у Вас возникли сомнения или вопросы, обратитесь к своему лечащему врачу.

Интравагинально

По одному суппозиторию (100 мг) 2 раза в день в течение 3 дней или по одному суппозиторию (100 мг) в день в течение 6 дней вечером, перед сном.

При необходимости курс лечения повторяют после консультации врача.

Лечение должно быть завершено до начала менструации.

Во время лечения препаратом Клотримазол не следует применять тампоны, спринцевание, спермициды или другие препараты, вводимые интравагинально.

Рекомендуется избегать вагинального полового акта при применении препарата, так как инфекция может передаться партнеру, и эффективность, и безопасность латексных продуктов, таких как презервативы, может быть снижена.

Дети: не применять детям в возрасте до 16 лет.

Нежелательные реакции

При появлении побочных эффектов сообщите об этом лечащему врачу. Это касается всех возможных побочных эффектов, в том числе не описанных в данном листке-вкладыше.

Перечисленные нежелательные эффекты выявлены на основе спонтанных сообщений, определить точную частоту возникновения не представляется возможным.

Нарушения со стороны иммунной системы: аллергические реакции (обморок, артериальная гипотензия, одышка, крапивница, зуд).

Нарушения со стороны репродуктивной системы и молочных желез: шелушение кожи в области половых органов, зуд, сыпь, отеки, дискомфорт, раздражение, чувство жжения, боль в области таза, вагинальное кровотечение.

Нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта: боль в животе.

Противопоказания

- Гиперчувствительность к клотримазолу или вспомогательному веществу;
- менструальный период;
- I триместр беременности;
- период кормления грудью;
- детский возраст до 16 лет.

Передозировка

В связи с низкой абсорбцией препарата передозировка при интравагинальном применении маловероятна.

В случае непредусмотренного применения препарата внутрь возможны головокружение, тошнота, рвота.

Лечение: специфического антидота нет. При необходимости – симптоматическое лечение.

Меры предосторожности

Если пациентка впервые обнаружила симптомы вагинального кандидоза, следует обратиться к врачу.

Перед использованием вагинальных суппозиториев Клотримазол необходимо обратиться за консультацией специалиста, если имеется любая из следующих ситуаций:

- более двух случаев развития кандидозного вагинита за последние шесть месяцев
- предшествующие случаи заболеваний, передающихся половым путем или наличие полового партнера с данным видом заболеваний
- беременность или предполагаемая беременность
- возраст до 16 лет или старше 60 лет
- известная гиперчувствительность к имидазолу или другим вагинальным противогрибковым препаратам.

Вагинальные суппозитории Клотримазол не должны использоваться, если у пациентки имеется любой из следующих симптомов, после чего необходимо обратиться за консультацией специалиста:

- нерегулярные вагинальные кровотечения
- аномальные вагинальные кровотечения или кровянистые выделения
- язвы, пузыри или раны наружных женских половых органов или влагалища
- боль внизу живота или дизурия
- покраснение, раздражение, отек слизистой, ассоциированые с терапией
- лихорадка или озноб



- тошнота или рвота
- диарея
- неприятный запах из влагалища

Если состояние пациентки не улучшается в течение одной недели лечения, следует обратиться за консультацией к врачу. Клотримазол суппозитории вагинальные можно применять повторно, если симптомы возобновились через 7 дней. Если выявлен рецидив инфекции чаще, чем два раза на протяжении шести месяцев, необходимо проконсультироваться с врачом.

Беременность и лактация

Если Вы беременны или кормите грудью, если Вы предполагаете, что беременны или не исключаете у себя вероятности наступления беременности, сообщите об этом своему лечащему врачу.

Препарат противопоказан в I триместре беременности. Во II и III триместрах беременности препарат применяется только по назначению врача, когда предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода.

При необходимости применения препарата кормление грудью следует прекратить.

Влияние на способность управлять механическими средствами передвижения и обслуживать механические устройства, находящиеся в движении

Препарат не оказывает или оказывает незначительное влияние на способность управлять транспортным средством или потенциально опасными механизмами.

Взаимодействия с другими лекарственными средствами

Если в настоящее время или в недавнем прошлом Вы принимали другие лекарственные средства, сообщите об этом врачу.

Препарат может приводить к повреждению латексных контрацептивов и тем самым ослабить их эффективность. Пациенты должны использовать альтернативные методы контрацепции как минимум на протяжении 5 дней после окончания курса терапии препаратом Клотримазол.

Одновременное применение клотримазола интравагинально и такролимуса перорально (FK-506; иммуносупрессант) может вызвать повышение уровня такролимуса в плазме крови и подобный эффект наблюдается при одновременном приеме с сиролимусом. Таким образом, пациентов следует тщательно контролировать для выявления симптомов передозировки такролимуса или сиролимусом, при необходимости определять их концентрации в плазме крови.

Условия и срок хранения

В защищенном от влаги и света месте, при температуре не выше 25 °C.

Не замораживать.

Хранить в недоступном для детей месте!

Срок годности

3 года. Не применять после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска

Без рецепта

Упаковка

По 6 суппозиториев в контурной ячейковой упаковке из ПВХ/ПЭ пленки.

По 1 контурной ячейковой упаковке вместе с листком-вкладышем в картонной пачке.

Информация о производителе

ЗАО «ИНТЕГРАФАРМ»

Республика Беларусь, 223045, Минская область, Минский р-н,
Юзуфовский с/с, 8-5, р-н а/г Юзуфово.

