



Перед употреблением лекарственного средства обязательно прочитайте листок-вкладыш!

ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ
(информация для пациента)
КУКУРУЗЫ СТОЛБИКИ С РЫЛЬЦАМИ
ZEAE MAYDIS STYLI CUM STIGMATIS

Регистрационный номер _____

Форма выпуска

Измельченное сырье.

Общая характеристика

Смесь измельченных мягких шелковистых нитей (столбиков), собранных пучками или частично перепутанных, на верхушке которых находятся двухлопастные рыльца. Столбики несколько скривленные, плоские, шириной 0,1-0,15 мм, длиной от 0,5 см до 20 см, рыльца короткие, длиной от 0,4 мм до 3 мм. Часто встречаются столбики без рылец. Цвет коричневый, коричнево-красный, светло-желтый. Запах слабый, своеобразный.

Фармакотерапевтическая группа

Прочие средства, применяемые для лечения заболеваний желчевыводящих путей.

Фармакологические свойства

Средство растительного происхождения. Оказывает желчегонное и диуретическое действие, способствует повышению свертываемости крови.

Показания к применению

Внутрь: в комплексной терапии некалькулезного холецистита и дискинезии желчевыводящих путей; в качестве диуретического средства в комплексной терапии заболеваний мочевыводящих путей.

Применение по указанным назначениям основывается только на опыте продолжительного применения.

Противопоказания

Гиперчувствительность. Желчнокаменная болезнь, обтурационная желтуха, повышенная свертываемость крови, анорексия, беременность, период лактации, детский возраст до 18 лет.

Способ применения и дозы

10 г (3 столовые ложки) сырья помещают в эмалированную посуду, заливают водой комнатной температуры 200 мл (1 стакан), закрывают крышкой и нагревают в кипящей воде (водяной бане) 30 мин. Охлаждают при комнатной температуре 10 мин, процеживают. Оставшееся сырье отжимают. Объем полученного отвара доводят кипяченой водой до 200 мл. Внутрь взрослые принимают по 1-3 столовых ложки 3-4 раза в день. Кратность приема и длительность курса лечения определяются врачом с учетом особенностей заболевания, достигнутого эффекта и переносимости лекарственного средства.

Побочное действие

Аллергические реакции. В случае возникновения побочных реакций, в том числе не указанных в данной инструкции, необходимо прекратить прием лекарственного средства и обратиться к врачу.

Меры предосторожности

Перед применением проконсультируйтесь с врачом. Если во время приема лекарственного средства симптомы сохраняются или происходит ухудшение состояния, необходимо прекратить применение лекарственного средства и обратиться к врачу.

Применение при беременности и лактации Лекарственное средство не следует принимать во время беременности. В связи с отсутствием достаточных данных не рекомендуется принимать во время лактации.

Применение у детей. Применение у детей в возрасте до 18 лет не рекомендуется в связи с отсутствием достаточных данных.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с другими механизмами. Исследования не проводились.

Передозировка

Информация о случаях передозировки отсутствует. В связи с диуретическим действием длительный прием может привести к развитию гипокалиемии. В случае передозировки необходимо обратиться к врачу. Лечение симптоматическое.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Информация о взаимодействии с другими лекарственными средствами отсутствует.

В случае одновременного приема других лекарственных средств необходимо проконсультироваться с врачом.

Условия и сроки хранения

В защищенном от света и влаги месте при температуре (15-25) °С. Хранить в недоступном для детей месте. Приготовленный отвар - не более 2-х суток при температуре (8-15) °С.

Срок годности 3 года.

Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска

Без рецепта врача.

Упаковка

По 40 г в пакете бумажном в пачке. Листок-вкладыш (информация для пациента) вкладывается в пачку.

Производитель: ООО "Падис'С"

Республика Беларусь, 220040, г. Минск, ул. Некрасова, 35/2, тел/факс (017) 331-99-12, www.padiss.by.

