



ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ: информация для пациента

Нексиум

Таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг

Действующее вещество: эзомепразол

Внимательно прочтите этот листок-вкладыш до конца перед тем, как начать применение данного лекарственного препарата, так как он содержит важную для Вас информацию.

- Сохраните этот листок-вкладыш. Вам может понадобиться прочитать его снова.
- Если у Вас возникли дополнительные вопросы, обратитесь к своему лечащему врачу или фармацевту.
- Данный лекарственный препарат выписан для Вас. Не передавайте его другим лицам, это может навредить им, даже если симптомы их заболеваний схожи с Вашими.
- Если у Вас наблюдаются какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к своему лечащему врачу или фармацевту. Это касается также любых нежелательных реакций, не перечисленных в этом листке-вкладыше (см. раздел 4).

В этом листке-вкладыше содержится следующая информация:

1. Что такое лекарственный препарат Нексиум, и в каких случаях он применяется.
2. Что необходимо знать перед тем, как начать применение лекарственного препарата Нексиум.
3. Как применять лекарственный препарат Нексиум.
4. Возможные нежелательные реакции.
5. Как хранить лекарственный препарат Нексиум.
6. Содержимое упаковки и дополнительная информация.

1. Что такое лекарственный препарат Нексиум, и в каких случаях он применяется.

Лекарственный препарат Нексиум содержит действующее вещество: эзомепразол. Он принадлежит к группе лекарственных препаратов, называемых «ингибиторами протонной помпы». Данные лекарственные препараты уменьшают количество кислоты, образующейся в желудке человека.

Лекарственный препарат Нексиум применяется для лечения следующих состояний:

У взрослых пациентов:

- «Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь» (ГЭРБ). При этой патологии происходит заброс кислоты из желудка в пищевод (полую трубку, соединяющую глотку с желудком), что приводит к развитию болевых ощущений, воспаления и изжоги.
- Язва желудка или верхнего отдела кишечника, вызванная бактериями, называемыми *«Helicobacter pylori»*. Если у Вас наблюдается данная патология, Ваш лечащий врач может дополнительно назначить антибиотики для лечения инфекции и заживления язвы.
- Язва желудка, вызванная приемом нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП). Лекарственный препарат Нексиум может применяться для предотвращения развития язвы желудка, если Вы принимаете НПВП.
- Избыточное количество кислоты в желудке, вызванное разрастанием поджелудочной железы (синдром Золлингера-Эллисона).
- Длительное лечение после внутривенного введения лекарственного препарата Нексиум с целью профилактики повторного кровотечения из язвы.

У подростков в возрасте от 12 лет и старше:

- «Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь» (ГЭРБ). При этой патологии происходит заброс кислоты из желудка в пищевод (полую трубку, соединяющую глотку с желудком), что приводит к развитию болевых ощущений, воспаления и изжоги.
- Язва желудка или верхнего отдела кишечника, вызванная бактериями, называемыми *«Helicobacter pylori»*. Если у Вас наблюдается данная патология, Ваш лечащий врач может дополнительно назначить антибиотики для лечения инфекции и заживления язвы.

2. Что необходимо знать перед тем, как начать применение лекарственного препарата Нексиум.

Не применяйте лекарственный препарат Нексиум:

- Если у Вас наблюдается повышенная чувствительность (аллергия) к действующему веществу (эзомепразол), либо к вспомогательным веществам данного лекарственного препарата (перечислены в разделе 6 листка-вкладыша).
- Если у Вас наблюдается аллергия на другие ингибиторы протонной помпы (например, пантопразол, лансопразол, рабепразол, омепразол).
- Если Вы принимаете препараты, содержащие нелфинавир (применяется для лечения ВИЧ-инфекции).

Не принимайте лекарственный препарат Нексиум в вышеперечисленных случаях. Если Вы не уверены, относится ли к Вам приведенная выше информация, проконсультируйтесь с Вашим лечащим врачом или фармацевтом перед началом применения лекарственного препарата Нексиум.

Предупреждения и меры предосторожности

Проконсультируйтесь с Вашим лечащим врачом или фармацевтом перед началом применения лекарственного препарата Нексиум в следующих случаях:

- Если у Вас тяжелые заболевания печени.
- Если у Вас тяжелые заболевания почек.
- Если у Вас когда-либо наблюдалась кожная реакция после приема лекарственного препарата, аналогичного лекарственному препарату Нексиум, т.е. препарата, который уменьшает количество кислоты, образующейся в желудке.
- Если Вам предстоит выполнить специфический анализ крови (Хромогранин А).

Прием лекарственного препарата Нексиум может маскировать симптомы других заболеваний. Поэтому, если у Вас наблюдается любой из перечисленных ниже симптомов до начала приема или во время приема лекарственного препарата Нексиум, немедленно проконсультируйтесь с Вашим лечащим врачом:

- У Вас наблюдается существенная потеря веса без явной причины, и Вы испытываете проблемы при глотании.
- Вы чувствуете боль в животе или у Вас несварение желудка.
- У Вас рвота или рвота с кровью.
- Ваш кал окрашен в черный цвет (примесь крови в кале).

Если Вы принимаете лекарственный препарат Нексиум «по требованию», но при этом симптомы Вашего заболевания сохраняются или характер симптомов изменяется, Вам следует обратиться к врачу.

Применение ингибитора протонной помпы, например, лекарственного препарата Нексиум, особенно в течение длительного периода времени (более одного года), может привести к некоторому увеличению риска перелома бедра, запястья или позвоночника. Сообщите своему врачу, если у Вас остеопороз или если Вы принимаете кортикоステроиды (прием кортикостероидов может увеличить риск развития остеопороза).

В случае появления сыпи на коже, в особенности на участках кожи, подверженных воздействию солнечного света, сообщите об этом Вашему лечащему врачу как можно скорее, так как Вам может потребоваться прекратить прием лекарственного препарата Нексиум. Проинформируйте Вашего лечащего врача о возникновении любых других болевых ощущений, например, боли в суставах.

Дети в возрасте младше 12 лет

Лекарственный препарат Нексиум в данной лекарственной форме (таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой) не рекомендован для применения у детей в возрасте младше 12 лет. Проконсультируйтесь с Вашим лечащим врачом или фармацевтом, если Вам потребуется дополнительная информация.

Применение лекарственного препарата Нексиум одновременно с другими лекарственными препаратами

Проинформируйте Вашего лечащего врача или фармацевта, если Вы принимаете, недавно принимали или планируете принимать любые другие лекарственные препараты. Это предупреждение касается также лекарственных препаратов, отпускаемых без рецепта врача. Лекарственный препарат Нексиум может оказывать влияние на эффективность действия других лекарственных препаратов, и наоборот.

Не принимайте лекарственный препарат Нексиум, если Вы принимаете препараты, содержащие нелфинавир (применяется для лечения ВИЧ-инфекции).

Проинформируйте Вашего лечащего врача или фармацевта, если Вы принимаете, следующие лекарственные препараты:

- Атазанавир (применяется для лечения ВИЧ-инфекции).
- Клопидогрел (применяется для предотвращения образования тромбов).
- Кетоконазол, итраконазол или вориконазол (применяются для лечения грибковых инфекций).
- Эрлотиниб (применяется для лечения опухолевых заболеваний).
- Циталопрам, имипрамин или кломипрамин (применяются для лечения депрессии).
- Диазепам (применяется для лечения тревожных расстройств, расслабления мышц или эпилепсии).
- Фенитоин (применяется для лечения эпилепсии). Если Вы принимаете фенитоин, Ваш лечащий врач должен будет наблюдать за Вашим состоянием в момент начала или прекращения приема лекарственного препарата Нексиум.
- Препараты, которые используются для разжижения крови, такие как варфарин. Вашему лечащему врачу может потребоваться наблюдение за Вашим состоянием в момент начала или прекращения приема лекарственного препарата Нексиум.
- Циостазол (применяется для лечения перемежающейся хромоты – боли в ногах при ходьбе, вызванной недостаточным кровоснабжением).
- Цизаприд (применяется при несварении желудка и изжоге).
- Дигоксин (применяется при заболеваниях сердца).
- Метотрексат (химиотерапевтический лекарственный препарат, применяется в высоких дозах для лечения онкологических заболеваний). Если Вы принимаете

высокую дозу метотрексата, Ваш лечащий врач может принять решение о приостановке терапии лекарственным препаратом Нексиум.

- Таксолимус (применяется после трансплантации органов).
- Рифампицин (применяется для лечения туберкулеза).
- Зверобой продырявленный (*Hypericum perforatum*) (применяется для лечения депрессии).

Если лечащий врач назначил Вам антибиотики амоксициллин и кларитромицин одновременно с лекарственным препаратом Нексиум для лечения язвы, вызванной бактерией *Helicobacter pylori*, крайне важно проинформировать врача о любых других принимаемых Вами лекарственных препаратах.

Прием лекарственного препарата Нексиум с пищей и напитками

Таблетки лекарственного препарата Нексиум можно принимать во время приема пищи или натощак.

Беременность и кормление грудью

Если Вы беременны, считаете, что беременны или планируете беременность, проконсультируйтесь с Вашим лечащим врачом или фармацевтом перед тем, как начать прием лекарственного препарата Нексиум. Ваш лечащий врач примет решение о возможности приема лекарственного препарата Нексиум во время беременности.

Неизвестно, выделяется ли лекарственный препарат Нексиум в грудное молоко человека. Не принимайте данный лекарственный препарат в период грудного вскармливания.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

Маловероятно, что лекарственный препарат Нексиум оказывает влияние на способность управлять транспортными средствами или работать с механизмами.

Однако при приеме лекарственного препарата Нексиум могут возникать такие нежелательные реакции, как головокружение и нечеткость зрения (частота возникновения – нечасто или редко, см. раздел 4). В случае развития таких нежелательных реакций Вам не следует управлять транспортными средствами или работать с механизмами.

Лекарственный препарат Нексиум содержит сахарозу

Лекарственный препарат Нексиум содержит сахарные шарики, которые содержат сахарозу, разновидность сахара. Если у Вас непереносимость некоторых сахаров, Вам следует проконсультироваться с врачом, прежде чем начать прием данного лекарственного препарата.

Содержание натрия

Лекарственный препарат Нексиум содержит менее 1 ммоль натрия (23 мг) в одной таблетке, то есть практически не содержит натрия.

3. Как применять лекарственный препарат Нексиум.

Всегда применяйте лекарственный препарат Нексиум именно так, как рекомендовал Ваш лечащий врач или фармацевт. Если Вы не уверены в правильности применения лекарственного препарата, проконсультируйтесь у своего лечащего врача или фармацевта.

- Если Вы принимаете лекарственный препарат Нексиум в течение длительного периода времени, Ваш лечащий врач должен будет контролировать Ваше состояние (особенно, если продолжительность приема лекарственного препарата составляет более года).
- Если лечащий врач назначил Вам прием данного лекарственного препарата «по требованию», проинформируйте врача в случае изменения характера Ваших симптомов.

Рекомендуемая доза

- Ваш лечащий врач назначит Вам необходимую дозу лекарственного препарата Нексиум и проинформирует Вас о продолжительности лечения – в зависимости от Вашего состояния, возраста и функции печени.
- Рекомендуемые дозы лекарственного препарата Нексиум приведены ниже.

Применение лекарственного препарата Нексиум у взрослых пациентов в возрасте 18 лет и старше

Лечение изжоги, вызванной гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью (ГЭРБ):

- Если Ваш лечащий врач обнаружит у Вас незначительные повреждения пищевода, рекомендуемая доза лекарственного препарата Нексиум составит 40 мг один раз в сутки в течение 4 недель. Ваш лечащий врач может порекомендовать Вам продолжить прием той же дозы лекарственного препарата в течение дополнительных 4 недель, если пищевод еще не зажил.
- Рекомендуемая доза лекарственного препарата Нексиум после заживления пищевода составляет: одна таблетка кишечнорастворимая, покрытая пленочной оболочкой, 20 мг, один раз в сутки.
- Если Ваш пищевод не поврежден, рекомендуемая доза лекарственного препарата Нексиум составляет: одна таблетка кишечнорастворимая, покрытая пленочной оболочкой, 20 мг, один раз в сутки. Как только состояние стабилизируется, Ваш врач может порекомендовать Вам принимать лекарственный препарат Нексиум по мере



необходимости («по требованию»), максимальная доза в этом случае составляет: одна таблетка, покрытая пленочной оболочкой, 20 мг, один раз в сутки.

- Если у Вас тяжелое заболевание печени, Ваш лечащий врач может назначить Вам более низкую дозу лекарственного препарата Нексиум.

Лечение язвы, вызванной *Helicobacter pylori*, и профилактика повторного возникновения язвы:

- Рекомендуемая доза лекарственного препарата Нексиум составляет: одна таблетка кишечнорастворимая, покрытая пленочной оболочкой, 20 мг, два раза в сутки, в течение одной недели.
- Ваш лечащий врач также может порекомендовать Вам принимать антибиотики, например, амоксициллин и кларитромицин.

Лечение язвы желудка, вызванной приемом нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП):

- Рекомендуемая доза лекарственного препарата Нексиум составляет: одна таблетка кишечнорастворимая, покрытая пленочной оболочкой, 20 мг, один раз в сутки, в течение 4–8 недель.

Профилактика язвы желудка при приеме НПВП:

- Рекомендуемая доза лекарственного препарата Нексиум составляет: одна таблетка кишечнорастворимая, покрытая пленочной оболочкой, 20 мг, один раз в сутки.

Избыточное количество кислоты в желудке, вызванное разрастанием поджелудочной железы (синдром Золлингера-Эллисона):

- Рекомендуемая доза лекарственного препарата Нексиум составляет 40 мг два раза в сутки.
- Ваш лечащий врач скорректирует дозу в зависимости от Вашего состояния, а также определит продолжительность приема лекарственного препарата. Максимальная доза лекарственного препарата Нексиум составляет 80 мг два раза в сутки.

Длительное лечение после внутривенного введения лекарственного препарата Нексиум с целью профилактики повторного кровотечения из язвы:

- Рекомендуемая доза лекарственного препарата Нексиум составляет 40 мг один раз в сутки в течение 4 недель.

Применение лекарственного препарата Нексиум у подростков в возрасте от 12 лет и старше

Лечение изжоги, вызванной гастроэзофагальной рефлюксной болезнью (ГЭРБ):

- Если Ваш лечащий врач обнаружит у Вас незначительные повреждения пищевода, рекомендуемая доза лекарственного препарата Нексиум составит 40 мг один раз в сутки в течение 4 недель. Ваш лечащий врач может порекомендовать Вам продолжить прием той же дозы лекарственного препарата в течение дополнительных 4 недель, если пищевод еще не зажил.
- Рекомендуемая доза лекарственного препарата Нексиум после заживления пищевода составляет: одна таблетка кишечнорастворимая, покрытая пленочной оболочкой, 20 мг, один раз в сутки.
- Если Ваш пищевод не поврежден, рекомендуемая доза лекарственного препарата Нексиум составляет: одна таблетка кишечнорастворимая, покрытая пленочной оболочкой, 20 мг, один раз в сутки.
- Если у Вас тяжелое заболевание печени, Ваш лечащий врач может назначить Вам более низкую дозу лекарственного препарата Нексиум.

Лечение язвы, вызванной *Helicobacter pylori*, и профилактика повторного возникновения язвы:

- Рекомендуемая доза лекарственного препарата Нексиум составляет: одна таблетка кишечнорастворимая, покрытая пленочной оболочкой, 20 мг, два раза в сутки, в течение одной недели.
- Ваш лечащий врач также может порекомендовать Вам принимать антибиотики, например, амоксициллин и кларитромицин.

Способ применения лекарственного препарата Нексиум

- Вы можете принимать таблетки в любое время суток.
- Вы можете принимать таблетки во время приема пищи или натощак.
- Таблетки следует проглатывать целиком, запивая их водой. Не следует разжевывать или измельчать таблетки. Это связано с тем, что таблетки содержат покрытые оболочкой гранулы, которые предотвращают разрушение препарата в желудке под действием кислоты. Важно не повредить содержащиеся в таблетке гранулы при приеме.

Что делать, если у Вас имеются затруднения с проглатыванием таблеток

- Если у Вас имеются затруднения с проглатыванием таблеток:
 - Поместите таблетки в стакан с негазированной водой. Не используйте других жидкостей для растворения таблеток.
 - Перемешивайте жидкость до тех пор, пока таблетки не растворятся (смесь будет непрозрачной). Выпейте смесь непосредственно после приготовления или в течение 30 минут после приготовления. Всегда перемешивайте смесь перед тем, как ее выпить.



- Следует убедиться, что Вы выпили весь лекарственный препарат. Для этого тщательно прополоските стакан половиной стакана воды и выпейте ее. Твердые частицы содержат лекарственное средство – не разжёгивайте и не измельчайте их.
- Если Вы вообще не можете глотать, таблетку можно смешать с небольшим количеством воды и поместить в шприц. Затем раствор может быть введен Вам через трубку («желудочный зонд») непосредственно в желудок.

Применение лекарственного препарата Нексиум у детей в возрасте до 12 лет

Лекарственный препарат Нексиум в данной лекарственной форме (таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой) не рекомендован для применения у детей в возрасте младше 12 лет. Проконсультируйтесь с Вашим лечащим врачом или фармацевтом, если Вам потребуется дополнительная информация.

Применение лекарственного препарата Нексиум у пациентов пожилого возраста

Корректировка дозы лекарственного препарата Нексиум у пациентов пожилого возраста не требуется.

Если Вы приняли больше таблеток лекарственного препарата Нексиум, чем Вам назначено

Если Вы приняли больше таблеток лекарственного препарата Нексиум, чем Вам назначено, незамедлительно свяжитесь с Вашим лечащим врачом или фармацевтом.

Если Вы забыли принять лекарственный препарат Нексиум

- Если Вы забыли принять лекарственный препарат Нексиум, примите таблетку, как только Вы вспомнили о пропущенной дозе. Однако, если приближается время приема следующей дозы, не принимайте пропущенную дозу.
- Не принимайте двойную дозу лекарственного препарата Нексиум для восполнения пропущенной.

Если у Вас возникнут дополнительные вопросы по применению лекарственного препарата Нексиум, обратитесь к Вашему лечащему врачу или фармацевту.

4. Возможные нежелательные реакции.

Как и все лекарственные препараты, лекарственный препарат Нексиум может вызывать нежелательные реакции, хотя они возникают не у всех пациентов.

Прекратите прием лекарственного препарата Нексиум и незамедлительно свяжитесь с Вашим лечащим врачом, если у Вас наблюдаются следующие серьезные нежелательные реакции:

- Внезапное свистящее дыхание, отек губ, языка и горла или тела, сыпь, обморок или затруднения при глотании (тяжелая аллергическая реакция).
- Покраснение кожи, появление волдырей или шелушения. Появление крупных волдырей и кровотечение в области губ, глаз, рта, носа и гениталий («синдром Стивенса-Джонсона» или «стоксический эпидермальный некролиз»).
- Пожелтение кожи, потемнение мочи и повышенная утомляемость. Данные симптомы могут свидетельствовать о заболеваниях печени.

Вышеперечисленные нежелательные реакции являются редкими, частота возникновения составляет – менее чем у 1 пациента из 1000 человек.

Ниже перечислены иные нежелательные реакции, которые могут развиваться при применении лекарственного препарата Нексиум:

Частые нежелательные реакции (частота возникновения – менее чем у 1 пациента из 10 человек):

- Головная боль.
- Нежелательные реакции со стороны желудочно-кишечного тракта: диарея, боль в животе, запор, метеоризм.
- Чувство тошноты или рвоты.
- Добропачественные полипы желудка.

Нечастые нежелательные реакции (частота возникновения – менее чем у 1 пациента из 100 человек):

- Отек стоп и подъязыков.
- Нарушения сна (бессонница).
- Головокружение, ощущение покалывания, чувство сонливости.
- Вертиго (ощущение вращения окружающих предметов вокруг тела или, наоборот, тела вокруг окружающих предметов).
- Сухость во рту.
- Изменение лабораторных показателей, отражающих работу печени.
- Кожная сыпь, крапивница, зуд кожи.
- Перелом бедра, запястья или позвоночника (при применении лекарственного препарата Нексиум в высоких дозах в течение длительного промежутка времени).

Редкие нежелательные реакции (частота возникновения – менее чем у 1 пациента из 1000 человек):

- Нарушения со стороны кровеносной системы, такие как, снижение количества лейкоцитов или тромбоцитов. При этом может наблюдаться слабость, появление кровоподтеков, а также увеличивается риск развития инфекций.
- Снижение уровня натрия в крови: сопровождается слабостью, тошнотой (рвотой) и судорогами.
- Чувство возбуждения, спутанность сознания или депрессия.
- Вкусовые расстройства.
- Нарушения зрения, в частности затуманенное зрение (нечеткость зрения).
- Внезапное появление хрипов или одышки (бронхоспазм).
- Воспаление слизистой оболочки полости рта.
- Кандидоз кишечника (молочница) – инфекция, вызываемая патогенным грибком.
- Заболевания печени, включая желтуху, при которой могут наблюдаться пожелтение кожи, потемнение мочи и повышенная утомляемость.
- Выпадение волос (алопеция).
- Кожная сыпь, возникающая под действием солнечных лучей.
- Боль в суставах (артралгия) или боль в мышцах (миалгия).
- Общее недомогание и недостаток энергии (снижение работоспособности).
- Повышенное потоотделение.

Очень редкие нежелательные реакции (частота возникновения – менее чем у 1 пациента из 10000 человек):

- Изменения в общем анализе крови, включая агранулоцитоз (снижение количества лейкоцитов).
- Агрессия.
- Состояние, при котором Вы можете видеть, слышать или ощущать то, чего нет (галлюцинации).
- Тяжелые заболевания печени, приводящие к печеночной недостаточности и воспалению головного мозга.
- Внезапное появление сильной сыпи, волдырей или шелушения кожи. Данные симптомы могут сопровождаться повышением температуры и болями в суставах (мультиформная эритема, синдром Стивенса-Джонсона, токсический эпидермальный некролиз).
- Мышечная слабость.
- Тяжелые заболевания почек.
- Увеличение груди у мужчин.

Частота возникновения неизвестна (не может быть установлена на основании имеющихся данных):

- Если Вы принимаете лекарственный препарат Нексиум более трех месяцев, уровень магния в крови может снижаться. Низкий уровень магния может являться причиной утомляемости, непроизвольных сокращений мышц, дезориентации, судорог, головокружения или учащенного сердцебиения. Если у Вас появятся какие-либо из вышеперечисленных симптомов, немедленно сообщите об этом своему лечащему врачу. Низкий уровень магния также может привести к снижению уровня калия или кальция в крови. Ваш лечащий врач может принять решение о выполнении регулярных анализов крови в целях контроля уровня магния.
- Воспаление кишечника (приводящее к диарее).
- Сыпь, возможно, сопровождающаяся болью в суставах.

Лекарственный препарат Нексиум в очень редких случаях может оказывать влияние на лейкоциты, приводя к развитию иммунодефицита. Если у Вас инфекция, сопровождающаяся лихорадкой с резким ухудшением общего состояния, или лихорадка с симптомами местной инфекции, такими как, боль в области шеи, горла, полости рта, затрудненное мочеиспускание, Вам следует незамедлительно проконсультироваться с Вашим лечащим врачом и выполнить анализ крови, чтобы исключить агранулоцитоз (снижение количества лейкоцитов). Проинформируйте Вашего лечащего врача обо всех принимаемых лекарственных препаратах.

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у Вас наблюдаются какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к Вашему лечащему врачу или фармацевту. Это также относится к проявлению любых возможных нежелательных реакций, не перечисленных в этом листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях в информационную базу данных по нежелательным реакциям на лекарственные препараты, в Республиканское унитарное предприятие «Центр экспертизы и испытаний в здравоохранении» (см. раздел «Сообщения о нежелательных реакциях, выявленных на территории Республики Беларусь, направлять по адресу»).

Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше информации о безопасности данного лекарственного препарата.

5. Как хранить лекарственный препарат Нексиум.

Хранить при температуре не выше 30 °C.

Хранить в недоступном для детей месте.

Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Срок годности: 3 года.

6. Содержимое упаковки и дополнительная информация.

Что содержит лекарственный препарат Нексиум

- Действующее вещество: эзомепразол. Каждая таблетка кишечнорастворимая, покрытая пленочной оболочкой, содержит эзомепразола 20,0 мг, в виде эзомепразола магния тригидрата 22,3 мг.
- Вспомогательные вещества: глицерол моностеарат 40-55, гидроксипропилцеллULOЗА, гипромеллоза, железа оксид красновато-коричневый CI 77491 (Е 172), железа оксид желтый CI 77492 (Е 172), магния стеарат, метакриловой и этакриловой кислот сополимер (1:1), целлюлоза микрокристаллическая, парафин синтетический, макрогол 6000, полисорбат 80, кросповидон, натрия стеарилфумарат, сахара сферические гранулы с диаметром 0,250 - 0,355 мм, содержащие: сахарозу, кукурузный крахмал (с добавками гидролизатов крахмала и пигментов); титана диоксид CI 77891 (Е171), тальк, триэтилцитрат.

Внешний вид лекарственного препарата Нексиум и содержимое упаковки

Продолговатая, двояковыпуклая таблетка, покрытая пленочной оболочкой светло-розового цвета, с гравировкой «20 MG» на одной стороне и «^AЕН» на другой стороне.

Упаковка: по 7 таблеток в блистере из алюминиевой фольги. 4 блистера вместе с листком-вкладышем помещают в картонную пачку с защитной наклейкой с информацией переменного характера.

Условия отпуска из аптек

По рецепту.

Держатель регистрационного удостоверения: AstraZeneca UK Limited, Великобритания.

Сообщения о нежелательных реакциях, выявленных на территории Республики Беларусь, направлять по адресу:

Республиканское унитарное предприятие «Центр экспертизы и испытаний в здравоохранении»

Товарищеский пер., 2а, 220037, г. Минск, Республика Беларусь

Адрес эл. почты: rcpl@rceth.by

Также Вы можете использовать электронный адрес производителя:

Frontiers-PV@astrazeneca.com, или передать сообщение по телефону 24/7: +375 29 158-98-00.

Если у Вас возник вопрос, касающийся применения, эффективности и/или безопасности лекарственного препарата, Вы можете отправить запрос на получение медицинской информации на электронный адрес: Frontiers-MI@astrazeneca.com.

Нижеприведенная информация предназначена только для медицинских работников:

Введение лекарственного препарата Нексиум через желудочный зонд:

1. Поместите таблетку в шприц соответствующего объема и заполните шприц примерно 25 мл воды и 5 мл воздуха. Для некоторых желудочных зондов может потребоваться растворение таблеток в 50 мл воды, чтобы гранулы препарата не застревали в зонде.
2. Непосредственно после этого встряхивайте шприц в течение примерно 2 минут, чтобы таблетки растворились.
3. Держите шприц наконечником вверх и убедитесь, что наконечник не засорен.
4. Присоедините шприц к зонду, сохранив указанное положение шприца.
5. Встряхните шприц и расположите его наконечником вниз. Немедленно введите 5-10 мл раствора в зонд. Переверните шприц после инъекции и встряхните (шприц следует держать наконечником вверх для предотвращения засорения наконечника).
6. Переверните шприц наконечником вниз и немедленно введите в зонд еще 5-10 мл раствора. Повторяйте эту процедуру до тех пор, пока весь раствор не будет введен.
7. Наполните шприц 25 мл воды и 5 мл воздуха и, при необходимости, повторите шаг 5, чтобы смыть оставшийся в шприце осадок. Для некоторых зондов может потребоваться 50 мл воды.