

Листок-вкладыш: Информация для пациента/потребителя

**Облепиховое масло, 500 мг, суппозитории ректальные**  
*Облепихи крушиновидной плодов масло*

**Перед применением препарата полностью прочтайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для вас сведения.**

Всегда применяйте препарат в точности с данным листком или рекомендациями лечащего врача или фармацевта.

- Сохраните листок-вкладыш. Возможно, вам потребуется прочитать его еще раз.
- Если вам нужны дополнительные сведения или рекомендации, обратитесь к фармацевту.
- Если у вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу или фармацевту. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.
- Если состояние не улучшается или оно ухудшается, Вам следует обратиться к врачу.

**Содержание листка-вкладыша**

1. Что из себя представляет препарат Облепиховое масло и для чего его применяют
2. О чем следует знать перед применением препарата Облепиховое масло
3. Применение препарата Облепиховое масло
4. Возможные нежелательные реакции
5. Хранение препарата Облепиховое масло
6. Содержимое упаковки и прочие сведения

**1. Что из себя представляет препарат Облепиховое масло и для чего его применяют**  
Облепиховое масло относится к группе препаратов для лечения геморроя и анальных трещин для местного применения.

Облепиховое масло - препарат на основе масла из плодов облепихи крушиновидной, стимулирует reparативные процессы в коже и слизистых оболочках, ускоряет заживление поврежденных тканей, оказывает противовоспалительное действие. Обладает также антиоксидантным и цитопротекторным действием.

**Показания к применению**

Геморрой, трещины заднего прохода, язвы прямой кишки, проктит, эрозивно-язвенный сфинктерит и проктит, катаральный и атрофический проктит, лучевое поражение слизистой оболочки нижних отделов толстой кишки.

Если улучшение не наступило или вы чувствуете ухудшение, необходимо обратиться к врачу.

**2. О чем следует знать перед применением препарата Облепиховое масло**

**Не применяйте препарат Облепиховое масло:**

- если у вас аллергия (гиперчувствительность) на действующее вещество или любые другие компоненты препарата, перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша;
- если у вас диарея (жидкий стул);
- у детей в возрасте до 6 лет.

**Особые указания и меры предосторожности**

Перед применением препарата, проконсультируйтесь с лечащим врачом или фармацевтом. С осторожностью применять лицам с повышенной чувствительностью и предрасположенным к развитию аллергии.

Не применяйте препарат дольше установленного срока без консультации врача.

Если улучшения не наступает или признаки заболевания ухудшаются, обратитесь к врачу за консультацией.

### **Дети и подростки**

Препарат противопоказан к применению в детском возрасте до 6 лет.

### **Другие препараты и препарат Облепиховое масло**

Сообщите лечащему врачу или фармацевту о том, что вы принимаете, недавно принимали или можете начать принимать какие-либо другие препараты, в том числе отпускаемые без рецепта.

Не выявлены взаимодействия с другими лекарственными препаратами.

### **Беременность и грудное вскармливание**

Если вы беременны или кормите грудью, думаете, что забеременили, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или фармацевтом.

Облепиховое масло суппозитории допускается применять во время беременности или в период грудного вскармливания, после консультации с врачом.

Данные о влиянии препарата на fertильность отсутствуют.

### **Управление транспортными средствами и работа с механизмами**

Облепиховое масло не оказывает влияние на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами.

### **3. Применение препарата Облепиховое масло**

Всегда применяйте препарат в полном соответствии с листком-вкладышем или с рекомендациями лечащего врача или фармацевта. При появлении сомнений, посоветуйтесь с лечащим врачом или фармацевтом.

Препарат предназначен для ректального применения. После опорожнения кишечника суппозиторий вводят глубоко в задний проход.

Взрослые и дети старше 14 лет: по 1 суппозиторию 2 раза в день. Продолжительность курса лечения составляет 10-15 дней.

Дети 6-14 лет: по 1 суппозиторию 1-2 раза в день. Курс лечения 10-14 суток.

При необходимости, по согласованию с врачом, через 4-6 недель курс лечения повторяют.

*Применение у пациентов с нарушением функции почек:* данные о применении препарата у пациентов с нарушением функции почек отсутствуют.

*Применение у пациентов с нарушением функции печени:* данные о применении препарата у пациентов с нарушением функции печени отсутствуют.

*Применение у пациентов пожилого возраста:* данные о применении препарата у пациентов пожилого возраста отсутствуют.

### *Инструкция по ректальному введению суппозиториев*

При применении ректальных суппозиториев нередко возникает спазм в животе и позыв к дефекации, поэтому перед процедурой опорожните кишечник естественным путем или очищайте при помощи клизмы.

Тщательно вымойте руки с мылом. Заранее приготовьте влажные салфетки или носовой платок, смоченный в воде.

Лягте на бок, прижав колени к животу. Для проведения процедуры эта поза наиболее удобна, так как позволяет свести к минимуму неприятные ощущения.

Извлеките суппозиторий из упаковки. Суппозиторий берут большим и средним пальцами правой руки в середине самой широкой части, указательный палец упирается в тупой конец суппозитория. Суппозиторий направляют свободным концом к заднему проходу и

проталкивают указательным пальцем в анальный канал до полного погружения на глубину 2-3 см. Проводите процедуру осторожно, не оказывая лишнего давления. Несмотря на то, что суппозиторий имеет обтекаемую форму, при неосторожном использовании можно травмировать слизистую оболочку.

Не вставайте с постели около 20 минут.

Протрите руки заранее приготовленной влажной салфеткой или носовым платком.

Если в течение 10 минут после введения суппозитория произошел позыв к дефекации, опорожните кишечник и введите новый суппозиторий. Если между введением суппозитория и дефекацией прошло больше 10 минут, дополнительная доза препарата не требуется.

#### **Если вы применили препарат Облепиховое масло больше, чем следовало**

Случаи передозировки не описаны.

Если вы применили более высокие дозы, чем вам назначено, обратитесь к лечащему врачу.

#### **Если вы забыли применить препарат Облепиховое масло**

Если пропустили время применения препарата, примените его, как только вспомнили об этом.

Не применяйте двойную дозу, чтобы компенсировать пропущенную дозу.

#### **Если вы прекратили применение препарата Облепиховое масло**

Проконсультируйтесь с лечащим врачом или фармацевтом, если вы хотите прекратить лечение.

При наличии вопросов по применению препарата, обратитесь к лечащему врачу или фармацевту.

#### **4. Возможные нежелательные реакции**

Подобно всем лекарственным препаратам, данный препарат может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

- Редко (могут возникать не более чем у 1 человека из 1000): аллергические реакции;
- ощущение жжения в области заднего прохода.

#### **Сообщение о нежелательных реакциях**

Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе и на не перечисленные в данном листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях напрямую в информационную базу данных по нежелательным реакциям (см. ниже). Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

Республика Беларусь

220037, г. Минск, Товарищеский пер., 2а

УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении»

Телефон отдела фармаконадзора: +375 (17) 242 00 29; факс: +375 (17) 242 00 29.


Эл. почта: [rcpl@rceth.by](mailto:rcpl@rceth.by), [rceth@rceth.by](mailto:rceth@rceth.by)

<http://www.rceth.by>

#### **5. Хранение препарата Облепиховое масло**

Храните препарат в недоступном и невидном для детей месте.

Хранить контурную ячейковую упаковку во внешней упаковке для защиты от света, при температуре ниже 25 °C.



Не применяйте препарат после истечения срока годности (срока хранения), указанного на упаковке после «Годен до.». Датой истечения срока годности является последний день данного месяца.

Не выбрасывайте препараты в канализацию/водопровод. Уточните у фармацевта, как следует утилизировать (уничтожать) препарат, который больше не потребуется. Эти меры позволяют защитить окружающую среду.

## **6. Содержимое упаковки и прочие сведения**

### **Препарат Облепиховое масло содержит**

- Действующим веществом является облепиховое масло (с содержанием суммы каротиноидов не менее 240 мг % в пересчете на β-каротин). Каждый суппозиторий содержит 500 мг облепихового масла.
- Прочим ингредиентом является: твердый жир.

### **Внешний вид препарата Облепиховое масло и содержимое упаковки**

Суппозитории ректальные.

Суппозитории цилиндроконической формы, от светло-желтого до темно-оранжевого цвета, с матовой и/или глянцевой поверхностью. На срезе допускается наличие воздушного и пористого стержня и воронкообразного углубления.

Препарат упакован по 5 суппозиториев в контурную ячейковую упаковку из ПВХ/ПЭ пленки, по 2 контурные ячейковые упаковки вместе с листком-вкладышем в картонную пачку.

### **Условия отпуска**

Без рецепта врача.

### **Держатель регистрационного удостоверения и производитель**

ООО «ФАРМАПРИМ»

ул. Кринилор, 5, с. Порумбень, р-он Криулень,  
Республика Молдова, MD-4829

телефон (+373 22) 28-18-45

факс (+373 22) 28-18-46

e-mail: safety@farmaprim.md

За любой информацией о препарате, а также в случаях возникновения претензий, следует обращаться к локальному представителю держателя регистрационного удостоверения по адресу:

Республика Беларусь,

г. Минск, ул. Мележа, дом 5, корпус 2, офис 1105,

тел.: + 375 173 85 26 09

тел. моб: + 375 296641080

e-mail: pavlovich.farmaprim@gmail.com

### **Листок-вкладыш пересмотрен**

### **Прочие источники информации**

Подробные сведения о препарате содержатся на веб-сайте <https://www.rceth.by>

