

**СОЛИДАГОРЕН  
(SOLIDAGOREN®)**  
**Капли для внутреннего применения**

9027 - 2021

СОГЛАСОВАНО  
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
Приказ Министерства здравоохранения  
от 08.02.2023 № 1604

Листок-вкладыш. Информация для пациента.

**Прочитайте листок-вкладыш прежде, чем начать принимать лекарство, потому что он содержит важную информацию.**

Всегда принимайте это лекарство точно так, как описано в данном информационном листке, или точно по указанию врача или фармацевта.

Сохраните эту листовку. Возможно, вы захотите прочитать это еще раз.

Спросите своего врача или фармацевта, если вам нужна дополнительная информация или совет.

Если у вас возникнут побочные эффекты, обратитесь к врачу или фармацевту. Это также относится к побочным эффектам, не указанным в этой инструкции по применению. Пожалуйста, прочтите раздел Побочные реакции и сообщите о подозреваемых побочных реакциях.

Если через 5 дней не станет лучше или Вы почувствуете себя хуже, обратитесь к своему врачу.

**Этот листок-вкладыш содержит сведения:**

1. Что такое Солидагорен и для чего он используется?
2. На что следует обратить внимание перед приемом Солидагорен?
3. Как следует принимать Солидагорен?
4. Какие побочные эффекты возможны?
5. Как следует хранить Солидагорен?
6. Содержимое упаковки и прочая информация.

**1. Что такое Солидагорен и для чего он используется?**

Солидагорен-это традиционное растительное лекарственное средство.

**Применение**

Для лечения воспалительных заболеваний мочевыводящих путей (в комплексной терапии).

Применение лекарственного средства основано на опыте его длительного использования

**2.На что следует обратить внимание перед приемом Солидагорен?**

Лекарственное средство нельзя принимать, если у вас повышенная чувствительность к действующему веществу или другим компонентам, а также при аллергии на растения семейства Asteraceae (астровые).

В случае скопления жидкости в тканях (отека), вызванного сердечной или почечной недостаточностью. Это предупреждение особенно важно для пожилых людей.

В случае наличия крови в моче, высокой температуры тела или симптомов, сохраняющихся более 5 дней, рекомендуется консультация врача.

**Дети**

Из-за отсутствия достаточных исследований этот препарат не рекомендуется детям младше 18 лет.

**Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

Пожалуйста, сообщите своему врачу или фармацевту, если вы принимаете другие лекарственные средства, включая безрецептурные. Лекарственные взаимодействия не изучались.

Из-за наличия алкоголя в этом лекарственном средстве возможно влияние на действие других лекарственных препаратов.

До настоящего времени случаи взаимодействия с другими лекарственными средствами не известны.



9027 - 2021

### **Беременность и период лактации**

До настоящего времени не публиковалось сообщений о риске для беременных и кормящих грудью пациенток, связанных с общим применением лекарственных препаратов на основе травы золотарника, травы лапчатки гусиной и травы хвоща. Результаты клинических исследований в настоящее время отсутствуют. Поэтому не рекомендуется применять это лекарственное средство во время беременности и кормления грудью. В связи с этим женщинам детородного возраста в период приема препарата следует соблюдать меры контрацепции.

Пожалуйста, посоветуйтесь со своим врачом или фармацевтом, прежде чем начать принимать лекарственный препарат.

### **Влияние на управление автомобилем и работу с механизмами**

При применении в соответствии с инструкцией не следует ожидать отрицательного влияния на способность управлять автомобилем или работать с другими механизмами.

### **Важная информация о других компонентах препарата Солидагорен.**

#### **Меры предосторожности**

Не следует применять препарат для диуретической терапии отеков, вызванных сердечной недостаточностью или почечной недостаточностью. Это особенно важно учитывать при применении у людей пожилого возраста.

При наличии крови в моче, высокой температуры тела или при сохранении симптоматики более 5 дней, рекомендовано обратиться к врачу.

Препарат содержит 45% об/об спирта. При соблюдении рекомендуемой дозы в организм попадают 0,6 г алкоголя с каждым приемом 30 капель. В связи с этим возможен риск для здоровья пациентов с заболеваниями печени, алкогольной зависимостью, эпилепсией, органическими поражениями мозга; беременных и кормящих женщин, детей. Препарат может уменьшать или усиливать действие других лекарственных средств.

Одновременное применение препарата с синтетическими мочегонными средствами не рекомендуется.

### **3. Как следует принимать Солидагорен?**

Солидагорен не применяется у детей и подростков до 18 лет.

20 - 30 капель Солидагорена 3 раза в день. 30 капель соответствует 1,4 мл.

Солидагорен следует принимать с достаточным количеством жидкости, предпочтительно с водой. Длительность применения определяется врачом индивидуально на срок от 2 до 4 недель.

### **Если вы приняли больше Солидагорена, чем должны были**

Если вы случайно приняли двойную или тройную дозу препарата (т.е. 40-90 капель), как правило, это не приводит к нежелательным последствиям. В этом случае продолжайте прием лекарства в соответствии с рекомендациями. Если произошла значительная передозировка препарата, возможно усиление побочных эффектов (см. Раздел 4 Побочные эффекты). В этом случае проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом.

### **Если вы забыли принять Солидагорен**

Не принимайте двойную дозу, если вы забыли принять предыдущую. В этом случае продолжайте прием лекарства в соответствии с рекомендациями.

Если у вас есть дополнительные вопросы о применении лекарственного средства, проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом.

**4.Какие побочные эффекты возможны? 9027 - 2021**

Очень редко: реакции гиперчувствительности и аллергические реакции.

Частота неизвестна: легкие расстройства со стороны желудочно-кишечного тракта.

В случае появления первых признаков аллергической реакции (например, сыпь) прием препарата следует прекратить. В случае появления побочных эффектов, не указанных в инструкции, следует обратиться к врачу.

**Сообщения о подозреваемых нежелательных реакциях**

В случае развития у Вас нежелательной реакции сообщите об этом своему доктору.

Сообщения о нежелательных реакциях могут быть направлены:

- производителю: Др. Густав Кляйн ГмбХ & Ко. КГ Штайненфельд 3, 77736 Целль ам Хармерсбах, Германия, по телефону +49(0) 7835 63550, по факсу +49(0) 7835 634685, по электронной почте info@klein-naturarznei.de.

- в УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении»: по адресу 220037 г. Минск, Товарищеский пер. 2а, по электронной почте rcpl@rceth.by, по телефону 242-00-29 или на сайте www.rceth.by.

Претензии по качеству лекарственного средства следует сообщать: Др. Густав Кляйн ГмбХ & Ко. КГ Штайненфельд 3, 77736 Целль ам Хармерсбах, Германия, по телефону +49(0) 7835 63550, по факсу +49(0) 7835 634685, по электронной почте info@klein-naturarznei.de.

**5.Как следует хранить Солидагорен?**

Хранить в недоступном для детей месте.

Не следует использовать лекарственные средства после истечения срока годности, указанного на коробке и флаконе. Срок годности 3 года.

**Условия хранения**

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25°C.

**Информация о сроке годности после вскрытия**

Срок годности после вскрытия - 3 месяца.

**6. Содержимое упаковки и прочая информация.****Основные физико-химические свойства**

Прозрачная жидкость коричневого цвета.

**Состав лекарственного средства**

**действующее вещество:** 1 мл (= 0,95 г) капель для внутреннего применения содержит 0,79 мл Солекван-экстракта (жидкого экстракта (1:1,5 - 2,1) из смеси трав золотарника канадского (*Solidaginis herba*), лапчатки гусиной (*Anserinae herba*), хвоща полевого (*Equiseti Herba*) (4,2 : 1,4 : 1), экстрагент: этанол 50 % (об/об);

**вспомогательные вещества:** этанол 96 % (об/об), вода очищенная.

**Форма выпуска**

Капли для внутреннего применения.

В связи с наличием алкоголя в препарате, он может влиять на действие других препаратов.

**Упаковка и содержимое**

Капли для внутреннего применения.

По 20 мл и 50 мл капель во флаконе из коричневого стекла с капельницей и с пластмассовой завинчивающейся крышкой.

По 1 флакону вместе с листком-вкладышем упаковывают в картонную коробку.

**Категория отпуска**  
Отпускается без рецепта.



**Держатель регистрационного удостоверения и производитель**  
**Держатель регистрационного удостоверения:**

Альпен Фарма ГмбХ  
Штайненфельд 3, 77736, Целль ам Хармерсбах, Германия /  
Alpen Pharma GmbH  
Steinenfeld 3, 77736 Zell am Harmersbach, Germany

НД РБ

9027 - 2021

**Производитель:**

Др. Густав Кляйн ГмбХ & Ко. КГ  
Штайненфельд 3, 77736 Целль ам Хармерсбах, Германия /  
Dr. Gustav Klein GmbH & Co. KG  
Steinenfeld 3, 77736 Zell am Harmersbach, Germany

**Представитель держателя регистрационного удостоверения**

Представительство АО «Alpen Pharma AG» в Республике Беларусь  
220053, г. Минск, ул. Пархоменко дом 3, офис 1Б  
Тел/факс: (+375 17) 348 06 42

9027 - 2021

**СОЛИДАГОРЕН  
(SOLIDAGOREN®)**  
**Капли для внутреннего применения**

СОГЛАСОВАНО  
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
Приказ Министерства здравоохранения  
Республики Беларусь  
от «01» Июля 2023 № 1604

Листок-вкладыш. Информация для пациента.

**Прочтите листок-вкладыш прежде, чем начать принимать лекарство, потому что он содержит важную информацию.**

Всегда принимайте это лекарство точно так, как описано в данном информационном листке, или точно по указанию врача или фармацевта.

Сохраните эту листовку. Возможно, вы захотите прочитать это еще раз.

Спросите своего врача или фармацевта, если вам нужна дополнительная информация или совет.

Если у вас возникнут побочные эффекты, обратитесь к врачу или фармацевту. Это также относится к побочным эффектам, не указанным в этой инструкции по применению. Пожалуйста, прочтите раздел Побочные реакции и сообщите о подозреваемых побочных реакциях.

Если через 5 дней не станет лучше или Вы почувствуете себя хуже, обратитесь к своему врачу.

**Этот листок-вкладыш содержит сведения:**

1. Что такое Солидагорен и для чего он используется?
2. На что следует обратить внимание перед приемом Солидагорен?
3. Как следует принимать Солидагорен?
4. Какие побочные эффекты возможны?
5. Как следует хранить Солидагорен?
6. Содержимое упаковки и прочая информация.

**1. Что такое Солидагорен и для чего он используется?**

Солидагорен-это традиционное растительное лекарственное средство.

**Применение**

Для лечения воспалительных заболеваний мочевыводящих путей (в комплексной терапии).

Применение лекарственного средства основано на опыте его длительного использования

**2.На что следует обратить внимание перед приемом Солидагорен?**

Лекарственное средство нельзя принимать, если у вас повышенная чувствительность к действующему веществу или другим компонентам, а также при аллергии на растения семейства Asteraceae (астровые).

В случае скопления жидкости в тканях (отека), вызванного сердечной или почечной недостаточностью. Это предупреждение особенно важно для пожилых людей.

В случае наличия крови в моче, высокой температуры тела или симптомов, сохраняющихся более 5 дней, рекомендуется консультация врача.

**Дети**

Из-за отсутствия достаточных исследований этот препарат не рекомендуется детям младше 18 лет.

**Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

Пожалуйста, сообщите своему врачу или фармацевту, если вы принимаете другие лекарственные средства, включая безрецептурные. Лекарственные взаимодействия не изучались.

Из-за наличия алкоголя в этом лекарственном средстве возможно **влияние на действие** других лекарственных препаратов.

До настоящего времени случаи взаимодействия с другими лекарственными средствами не известны.

9027 - 2021

### **Беременность и период лактации**

До настоящего времени не публиковалось сообщений о риске для беременных и кормящих грудью пациенток, связанных с общим применением лекарственных препаратов на основе травы золотарника, травы лапчатки гусиной и травы хвоща. Результаты клинических исследований в настоящее время отсутствуют. Поэтому не рекомендуется применять это лекарственное средство во время беременности и кормления грудью. В связи с этим женщинам детородного возраста в период приема препарата следует соблюдать меры контрацепции.

Пожалуйста, посоветуйтесь со своим врачом или фармацевтом, прежде чем начать принимать лекарственный препарат.

### **Влияние на управление автомобилем и работу с механизмами**

При применении в соответствии с инструкцией не следует ожидать отрицательного влияния на способность управлять автомобилем или работать с другими механизмами.

### **Важная информация о других компонентах препарата Солидагорен.**

#### **Меры предосторожности**

Не следует применять препарат для диуретической терапии отеков, вызванных сердечной недостаточностью или почечной недостаточностью. Это особенно важно учитывать при применении у людей пожилого возраста.

При наличии крови в моче, высокой температуры тела или при сохранении симптоматики более 5 дней, рекомендовано обратиться к врачу.

Препарат содержит 45% об/об спирта. При соблюдении рекомендуемой дозы в организм попадают 0,6 г алкоголя с каждым приемом 30 капель. В связи с этим возможен риск для здоровья пациентов с заболеваниями печени, алкогольной зависимостью, эпилепсией, органическими поражениями мозга; беременных и кормящих женщин, детей. Препарат может уменьшать или усиливать действие других лекарственных средств.

Одновременное применение препарата с синтетическими мочегонными средствами не рекомендуется.

### **3. Как следует принимать Солидагорен?**

Солидагорен не применяется у детей и подростков до 18 лет.

20 - 30 капель Солидагорена 3 раза в день. 30 капель соответствует 1,4 мл.

Солидагорен следует принимать с достаточным количеством жидкости, предпочтительно с водой. Длительность применения определяется врачом индивидуально на срок от 2 до 4 недель.

### **Если вы приняли больше Солидагорена, чем должны были**

Если вы случайно приняли двойную или тройную дозу препарата (т.е. 40-90 капель), как правило, это не приводит к нежелательным последствиям. В этом случае продолжайте прием лекарства в соответствии с рекомендациями. Если произошла значительная передозировка препарата, возможно усиление побочных эффектов (см. Раздел 4 Побочные эффекты). В этом случае проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом.

### **Если вы забыли принять Солидагорен**

Не принимайте двойную дозу, если вы забыли принять предыдущую. В этом случае продолжайте прием лекарства в соответствии с рекомендациями.

Если у вас есть дополнительные вопросы о применении лекарственного средства, проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом.

9027 - 2021

СОГЛАСОВАНО  
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
Приказ Министерства здравоохранения  
Республики Беларусь

**4.Какие побочные эффекты возможны?**

*Очень редко:* реакции гиперчувствительности и аллергические реакции.

*Частота неизвестна:* легкие расстройства со стороны желудочно-кишечного тракта.

В случае появления первых признаков аллергической реакции (например, сыпь) прием препарата следует прекратить. В случае появления побочных эффектов, не указанных в инструкции, следует обратиться к врачу.

*Сообщения о подозреваемых нежелательных реакциях*

В случае развития у Вас нежелательной реакции сообщите об этом своему доктору.

Сообщения о нежелательных реакциях могут быть направлены:

- производителю: Др. Густав Кляйн ГмбХ & Ко. КГ Штайнерфельд 3, 77736 Целль ам Хармерсбах, Германия, по телефону +49(0) 7835 63550, по факсу +49(0) 7835 634685, по электронной почте info@klein-naturarznei.de.

- в УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении»: по адресу 220037 г. Минск, Товарищеский пер. 2а, по электронной почте rcpl@rceth.by, по телефону 242-00-29 или на сайте www.rceth.by.

Претензии по качеству лекарственного средства следует сообщать: Др. Густав Кляйн ГмбХ & Ко. КГ Штайнерфельд 3, 77736 Целль ам Хармерсбах, Германия, по телефону +49(0) 7835 63550, по факсу +49(0) 7835 634685, по электронной почте info@klein-naturarznei.de.

**5.Как следует хранить Солидагорен?**

Хранить в недоступном для детей месте.

Не следует использовать лекарственные средства после истечения срока годности, указанного на коробке и флаконе. Срок годности 3 года.

**Условия хранения**

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25°C.

**Информация о сроке годности после вскрытия**

Срок годности после вскрытия - 3 месяца.

**6. Содержимое упаковки и прочая информация.****Основные физико-химические свойства**

Прозрачная жидкость коричневого цвета.

**Состав лекарственного средства**

*действующее вещество:* 1 мл (= 0,95 г) капель для внутреннего применения содержит 0,79 мл Солекван-экстракта (жидкого экстракта (1:1,5 - 2,1) из смеси трав золотарника канадского (Solidaginis herba), лапчатки гусиной (Anserinae herba), хвоща полевого (Equiseti Herba) (4,2 : 1,4 : 1), экстрагент: этанол 50 % (об/об);

*вспомогательные вещества:* этанол 96 % (об/об), вода очищенная.

**Форма выпуска**

Капли для внутреннего применения.

В связи с наличием алкоголя в препарате, он может влиять на действие других препаратов.

**Упаковка и содержимое**

Капли для внутреннего применения.

По 100 мл капель во флаконе из коричневого стекла с капельницей и с пластмассовой завинчивающейся крышкой.

По 1 флакону вместе с листком-вкладышем упаковывают в картонную коробку.

НД РБ

**Категория отпуска**

Отпускается по рецепту.

9027 - 2021

СОГЛАСОВАНО  
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
Приказ Министерства здравоохранения  
Республики Беларусь

**Держатель регистрационного удостоверения и производитель**

**Держатель регистрационного удостоверения:**

Альпен Фарма ГмбХ

Штайненфельд 3, 77736, Целль ам Хармерсбах, Германия /

Alpen Pharma GmbH

Steinenfeld 3, 77736 Zell am Harmersbach, Germany

**Производитель:**

Др. Густав Кляйн ГмбХ & Ко. КГ

Штайненфельд 3, 77736 Целль ам Хармерсбах, Германия /

Dr. Gustav Klein GmbH & Co. KG

Steinenfeld 3, 77736 Zell am Harmersbach, Germany

**Представитель держателя регистрационного удостоверения**

Представительство АО «Alpen Pharma AG» в Республике Беларусь

220053, г. Минск, ул. Пархоменко дом 3, офис 1Б

Тел/факс: (+375 17) 348 06 42