

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

VIZO-1

НАЗВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ:

Раствор медицинский для офтальмологии: VIZO-1, капли глазные 10 мл.

СОСТАВ:

Действующие вещества:

натрия гиалуронат – 2,0 мг/мл,

цитиколина натриевая соль – 20,0 мг/мл;

вспомогательные вещества:

натрия хлорид, бензалкония хлорид, натрия дигидрофосфат додекагидрат, натрия фосфат моногидрат, вода для инъекций.

ОПИСАНИЕ:

Прозрачный бесцветный раствор.

VIZO-1 – офтальмологический нейрпротектор.

Натрия гиалуронат, входящий в состав VIZO-1, улучшает мукоимитические и мукоадгезивные свойства раствора, обеспечивая равномерное, устойчивое увлажнение и защиту слизистой оболочки глаза, сохраняя стабильность слезной пленки. Кроме того, создает благоприятную среду для процессов реэпителизации и восстановления глазной поверхности в случаях повреждения роговицы и конъюнктивы, способствует удержанию действующих веществ на поверхности глаза.

Цитиколин в составе VIZO-1 оказывает благоприятную структурную поддержку в восстановлении целостности клеточных мембран, поврежденных вследствие дегенеративных глазных патологий (например, глаукомы).

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

Для местного применения в офтальмологии

Увлажняющие и защитные свойства VIZO-1 обеспечивают облегчение в случае раздражения, жжения, покраснения и ощущения инородного тела, вызванного экологическими факторами, такими как ветер, солнце, сухой воздух, соленая вода, дым, яркий свет, кондиционер и отопление, а также длительным использованием видеоприборов и контактных линз, при хирургии глаза.

VIZO-1, благодаря структурному действию цитиколина на ганглиозные клетки сетчатки, показан в качестве коадьюванта к антигипертензивной терапии у пациентов с глаукомой.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ:

По 1 капле 2–3 раза в сутки или по назначению врача.

НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ РЕАКЦИИ:

После закапывания глазных капель возможна временная нечеткость зрения. Рекомендуется подождать несколько секунд, прежде чем начинать любую деятельность, требующую четкости зрения. В случае любой нежелательной реакции следует прекратить использование VIZO-1 и проконсультироваться с врачом.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

Повышенная чувствительность к компонентам VIZO-1.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ:

Не выявлены.

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ:

Если симптомы не исчезают в течение нескольких дней или возникают какие-либо нежелательные реакции, следует обратиться к врачу.

Не использовать в случае повреждения флакона.

Раствор является стерильным до открытия флакона.

Чтобы предотвратить загрязнение раствора, необходимо плотно закрывать флакон после использования и не прикасаться кончиком дозатора к глазу или другим предметам.

VIZO-1 предназначен только для наружного использования в офтальмологии.

Если VIZO-1 используется с целью лечения, следует обратиться к врачу.

После закапывания необходимо подождать 10–15 мин перед использованием других местных офтальмологических средств.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

- Не использовать в случае индивидуальной гиперчувствительности к некоторым компонентам VIZO-1.

- Не смешивать с другими увлажняющими каплями.

ПЕРЕДОЗИРОВКА:

До настоящего времени сведений о передозировке не имеется.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Хранить в защищенном от света месте, при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте!

СРОК ГОДНОСТИ:

2 года.

После вскрытия флакона препарат использовать в течение 1 месяца.

Не применять по истечении срока годности.

УСЛОВИЯ ОТПУСКА ИЗ АПТЕК:

Без рецепта.

**ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:**

ООО «Aseptica»

Республика Узбекистан

г. Ташкент,

Алмазарский район,

ул. Чангалзор-Мавзук, 3

www.aseptica.uz



**ОРГАНИЗАЦИЯ, УПОЛНОМОЧЕННАЯ
ПРИНИМАТЬ ПРЕТЕНЗИИ
НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ
БЕЛАРУСЬ:**

ООО «ПромоСолюшн»

Республика Беларусь

г. Минск, ул. Могилевская, 39А, офис 210

Тел.: +375 29 158 83 05

e-mail: info@promosolution.by