


НД РБ

2837Б-2025



Листок-вкладыш – информация для пациента

ВЗОР, 0,5 мг/мл, капли глазные

(тетрагидрозолина гидрохлорид)

Перед приемом препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для вас сведения.

- Всегда принимайте препарат в точности с листком-вкладышем или рекомендациями лечащего врача или работника аптеки.
- Сохраните листок-вкладыш. Возможно, вам потребуется прочитать его еще раз.
- Если вам нужны дополнительные сведения или рекомендации, обратитесь к работнику аптеки.
- Если у вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.
- Если состояние не улучшается или оно ухудшается, вам следует обратиться к врачу.

‘СОДЕРЖАНИЕ ЛИСТКА-ВКЛАДЫША

1. Что из себя представляет препарат ВЗОР, и для чего его принимают.
2. О чем следует знать перед приемом препарата ВЗОР.
3. Прием препарата ВЗОР.
4. Возможные нежелательные реакции.
5. Хранение препарата ВЗОР.
6. Содержимое упаковки и прочие сведения.

**1. Что из себя представляет препарат ВЗОР,
и для чего его принимают**

Препарат ВЗОР представляет собой глазные капли, действующим веществом которых является тетрагидрозолина гидрохлорид (тетризолин). Препарат ВЗОР принимается для устранения отека и покраснения глаз при неинфекционном катаральном конъюнктивите, обусловленных воздействием химических и физических факторов, таких как дым, ветер, пыль, хлорированная вода, свет, косметические средства, контактные линзы. Препарат ВЗОР показан к приему у взрослых и детей в возрасте от 2 лет. Детям младше 6 лет назначается под контролем врача.

2. О чем следует знать перед приёмом препарата ВЗОР

Не принимайте данный препарат:

- если у вас аллергия на тетрагидрозолина гидрохлорид или любые другие компоненты препарата (перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша);
- если у вас закрытоугольная глаукома (заболевание, сопровождающееся повышением внутриглазного давления);
- если вы носите мягкие линзы (линзы необходимо снять перед закапыванием и установить не ранее, чем через 15 минут);
- у детей младше 2 лет.

Если вы не уверены, относится ли к вам что-либо из вышеперечисленного, сообщите об этом лечащему врачу перед приёмом препарата.

Особые указания и меры предосторожности

Перед приёмом препарата ВЗОР проконсультируйтесь с лечащим врачом, если:

- у вас есть тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, такие как ишемическая болезнь сердца, повышенное артериальное давление, аритмия (нарушение ритма сердца), аневризма (выпячивание стенки сосуда), гиперплазия (разрастание тканей) предстательной железы, порфирия (генетическое заболевание, связанное с нарушением синтеза гема), сухой ринит (сухой насморк), сухой кератоконъюнктивит (сухость конъюнктивы и роговицы глаза), глаукома (повышенное внутриглазное давление);
- у вас гиперфункция щитовидной железы;
- у вас феохромоцитома (опухоль надпочечников);
- у вас сахарный диабет;
- вы принимаете препараты, способные повысить артериальное давление.

Если в течение 72 часов состояние не улучшается или раздражение и краснота сохраняются или нарастают, следует прекратить принимать препарат и обратиться к врачу. При появлении интенсивных болей в глазах, головной боли, изменении или потере зрения, внезапном появлении «плавающих» пятен перед глазами, сильного острого или одностороннего покраснения глаз, боли при воздействии света или двоения в глазах немедленно обратитесь к врачу.

Не принимайте препарат ВЗОР, если раздражение или краснота связаны с серьезными заболеваниями органа зрения: инфекция, инородное тело или химическая травма роговицы.

Чрезмерное или продолжительное использование препарата может привести к повышенному покраснению глаз, усилить гиперемию конъюнктивы и слизистой оболочки носа (медикаментозный ринит) или привести к ее повторному появлению.

Не используйте препарат, если раствор поменял цвет или стал мутным. Прием препарата может вызывать временное расширение зрачка.

Дети

Препарат ВЗОР противопоказан детям младше 2 лет. Следует избегать длительного приема препарата и превышения рекомендуемой дозы, в особенности у детей. Принимать препарат детям следует с осторожностью и только под контролем врача.

Пациенты пожилого возраста

Препарат ВЗОР следует принимать с осторожностью.

Другие препараты и препарат ВЗОР

Сообщите лечащему врачу или работнику аптеки о том, что вы принимаете, недавно принимали или можете начать принимать любые другие препараты. Это относится и к любым препаратам, отпускаемым без рецепта врача.

Проконсультируйтесь с лечащим врачом, если вы принимаете:

- мапротилин (антидепрессант);
- трициклические антидепрессанты (например, амитриптилин, имипрамин);
- производные фенотиазина (препараты, которые применяют при лечении психических расстройств);
- ингибиторы моноаминоксидазы (МАО) (например, изокарбоксазид, транилципромин);
- препараты, повышающие артериальное давление;
- другие офтальмологические препараты.

Прием препарата ВЗОР одновременно с ингибиторами МАО и трициклическими антидепрессантами может привести к повышению артериального давления и к усилению сосудосуживающего действия.

Беременность, грудное вскармливание и фертильность

Если вы беременны или кормите грудью, думаете, что забеременели, или планируете беременность перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Данные о проникновении препарата через плаценту и в грудное молоко отсутствуют. Учитывая возможность развития системных нежелательных реакций, принимать препарат во время беременности и в период грудного вскармливания можно только в том случае,

если, по мнению врача, ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

Препарат ВЗОР может вызывать расширение зрачка и затуманенность зрения, что может повлиять на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами.

Важная информация о вспомогательных веществах

В состав препарата ВЗОР входит вещество бензалкония хлорид, которое может вызвать раздражение глаз. Избегайте контакта с мягкими контактными линзами. Перед приёмом снимите контактные линзы и не ранее, чем через 15 минут наденьте их обратно. Может изменять цвет мягких контактных линз.

3. Приём препарата ВЗОР

Всегда принимайте препарат в полном соответствии с листком-вкладышем или с рекомендациями лечащего врача или работника аптеки. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Рекомендуемая доза

По 1 или 2 капли в пораженный глаз 2-3 раза в сутки.

Приём у детей и подростков:

У детей старше 2 лет препарат применяют в тех же дозах, что и у взрослых.

Детям в возрасте до 6 лет препарат назначается под контролем врача.

Детям в возрасте до 12 лет препарат следует применять под присмотром взрослых.

Приём у пациентов пожилого возраста:

Коррекция дозы не требуется.

Длительность приёма

Препарат ВЗОР следует принимать только при легком раздражении глаз.

Не принимайте препарат ВЗОР более 4 дней без консультации врача.

Если ваше состояние не улучшилось или раздражение и краснота нарастают, прекратите приём препарата и обратитесь к врачу.

Следует избегать длительного приёма препарата и превышения рекомендуемой дозы, в особенности у детей.

Если вам кажется, что эффект препарата слишком сильный или слишком слабый, проконсультируйтесь с врачом.

Способ применения

Препарат ВЗОР предназначен только для закапывания в глаза.

При приёме препарата рекомендуется слегка прижать пальцем внутренний угол глаза для закрытия носослезного канала и не открывать глаз в течение 2 минут после приёма препарата.

Перед приёмом внимательно прочитайте этот раздел и последовательно выполните операции, представленные ниже в тексте и на рисунках 1-6.

1. Достаньте из упаковки флакон.

2. Если флакон укупорен колпачком алюминиевым: расположите ножницы под углом 45 градусов к крышке, подцепив её нижний край, движением, направленным вверх, снимите алюминиевый колпачок вместе с резиновой крышкой (рис. А 1-2).

3. Если флакон укупорен колпачком с пластиковой накладкой или колпачком комбинированным: с усилием потяните за пластиковую накладку со стороны надрезов, поднимая ее вертикально, затем резко потяните вниз вдоль флакона для нарушения целостности колпачка. Снимите алюминиевый колпачок и резиновую пробку (рис. Б 1-2).

4. Достаньте капельницу из упаковки и плотно наденьте ее на флакон (рис. 3).

5. Переверните флакон строго вертикально для удаления воздушного пузырька и подождите несколько секунд. В случае большого пузырька верните флакон в исходное

положение, а затем медленно повторите действие, аккуратно постукав по дну флакона (рис. 4).

6. Закапайте капли, нажимая указательным и большим пальцем на пипетку (рис. 5).

Не прикасайтесь пипеткой к глазу или другим поверхностям – это может привести к инфицированию раствора.

7. Перевернув флакон, закройте пипетку специальной пробкой (рис. 6).

А



Б




Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

Рис. 4

Рис. 5

Рис. 6

При закапывании препарата в глаза риск передозировки минимален. В случае значительного превышения рекомендуемой дозы или проглатывания препарата могут наблюдаться следующие симптомы передозировки: расширение зрачка, тошнота, синюшный оттенок кожи (цианоз), лихорадка, судороги, учащенное сердцебиение, нерегулярный сердечный ритм, остановка сердца; повышение артериального давления, отек легких, нарушения дыхания, нарушения функции центральной нервной системы, кома.

Сообщалось о единичных случаях снижения артериального давления, замедления сердцебиения, сонливости, снижения температуры тела.

Риск появления симптомов передозировки высок у новорожденных и маленьких детей, особенно при проглатывании.

При местном приёме результатом передозировки препарата ВЗОР могут быть чувство жжения и увеличение кровенаполнения сосудов глаза (гиперемия). В случае передозировки рекомендуется промыть глаз физиологическим раствором.

Если вы приняли препарата ВЗОР больше, чем следовало

В случае передозировки препарата ВЗОР немедленно обратитесь к врачу.

Если вы забыли принять препарат ВЗОР

Если вы забыли закапать препарат ВЗОР, сделайте это в следующий раз в обычное время. Не закапывайте двойную дозу, чтобы компенсировать пропущенную.

Если вы прекратили прием препарата ВЗОР

При наличии вопросов по применению препарата обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.

4. Возможные нежелательные реакции

Подобно всем лекарственным препаратам, препарат ВЗОР может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

Могут возникать следующие нежелательные реакции:

Часто (могут возникать не более чем у 1 человека из 10):

- раздражение слизистой оболочки глаз (боль, покалывание, жжение);
- нарушение зрения.

Частота неизвестна (исходя из имеющихся данных частоту возникновения определить невозможно):

- повышенное слезотечение;
- расширение зрачков;
- реакции в месте введения (включая жжение в глазах и области вокруг глаз, покраснение, раздражение, отек, боль, зуд).

Возможно развитие аллергических реакций.

Продолжительное или частое использование препарата ВЗОР вызывает привыкание и может явиться причиной увеличения кровенаполнения сосудов глаза (гиперемии).

После прекращения терапии кровеносные сосуды могут повторно расширяться (вазодилатация).

Дети

Предполагается, что частота, вид и тяжесть нежелательных реакций у детей аналогичны нежелательным реакциям, наблюдавшимся у взрослых.

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях в информационную базу данных по нежелательным реакциям (действиям) на лекарственные препараты, включая сообщения о неэффективности лекарственных препаратов, через www.rceth.by. Сообщая о нежелательных реакциях, вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

5. Хранение препарата ВЗОР

Хранить в недоступном и невидном для детей месте.

Хранить флакон в пачке для защиты от света при температуре не выше 25 °C.

Не принимайте препарат после истечения срока годности (срока хранения), указанного на картонной пачке.

Датой истечения срока годности является последний день месяца.

Вскрытый флакон хранить в оригинальной упаковке при температуре от 15 °C до 25 °C в течение 4 недель.

Не выбрасывайте препараты в канализацию. Уточните у работника аптеки, как избавиться от препаратов, которые больше не потребуются. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

6. Содержимое упаковки и прочие сведения

Препарат ВЗОР содержит

Действующим веществом является тетрагидрозолина гидрохлорид.

1 мл лекарственного препарата содержит *действующее вещество* тетрагидрозолина гидрохлорид – 0,5 мг.


Прочими (вспомогательными) веществами являются борная кислота, натрия тетраборат, натрия хлорид, бензалкония хлорид, динатрия эдетат, вода для инъекций.

Внешний вид препарата ВЗОР и содержимое упаковки

ВЗОР, капли глазные 0,5 мг/мл, – прозрачный бесцветный раствор.

НД РБ

28375-2025



По 10 мл во флаконы из бесцветного стекла, укупоренные пробками резиновыми. Флаконы обкатывают колпачками алюминиевыми или алюминиевыми/пластиковыми. На флакон наклеивают этикетку самоклеящуюся. Флакон в комплекте с соответствующей крышкой-капельницей и листком-вкладышем помещают в пачку из картона.

Условия отпуска: без рецепта.

Держатель регистрационного удостоверения и производитель

РУП «Белмедпрепараты»,

Республика Беларусь, 220007, г. Минск, ул. Фабрициуса, 30,

тел./факс: (+375 17) 220 37 16

e-mail: medic@belmedpreparaty.com



Листок-вкладыш пересмотрен: