

**ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ**  
(информация для пациента)

СОГЛАСОВАНО  
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
Приказ Министерства здравоохранения  
Республики Беларусь  
31.12.2019 № 1565

**Липы цветки, измельченное сырье** ~~35 г в пакете~~  
**Tiliae flos**

**Общая характеристика:**

кусочки цветков, цветоножек, прицветных листьев, цветочных бутонов и незрелых плодов, проходящие сквозь сито (5600). Цвет лепестков беловато-желтый, чашелистиков — зеленовато- или желтовато-серый, прицветных листьев — светло-желтый или зеленовато-желтый. Запах слабый, ароматный.

Липы цветки содержат биологически активные соединения: флавоноиды (гликозиды кверцетина и кемпферола, тилирозид и др.); полисахариды, моносахариды и слизи; эфирные масла; феноловые кислоты; танины и другие вещества.

**Форма выпуска.** Измельченное сырье.

**Фармакотерапевтическая группа.** Прочие средства, применяемые при простудных заболеваниях.

**Фармакологические свойства.** Настой липы цветков оказывает потогонное, спазмолитическое, легкое седативное действие. Лекарственное средство растительного происхождения.

**Показания к применению.** В качестве симптоматического средства в комплексной терапии острых респираторных заболеваний.

Применение по указанным назначениям основывается только на опыте продолжительного применения.

**Способ применения и дозы.** 3 г (1,5 столовые ложки) сырья помещают в эмалированную или другую подходящую посуду, заливают водой комнатной температуры 200 мл (1 стакан), закрывают крышкой, нагревают в кипящей воде (водяной бане) 15 мин. Охлаждают при комнатной температуре 45 мин, процеживают. Оставшееся сырье отжимают. Объем полученного настоя доводят кипяченой водой до 200 мл.

Принимают внутрь в теплом виде 2-4 раза в день: взрослые и дети старше 12 лет по 1/2 стакана, дети 4 – 12 лет по 1/3 стакана.

Длительность курса лечения определяется врачом с учетом особенностей заболевания, достигнутого эффекта и переносимости лекарственного средства.

Перед употреблением настой рекомендуется взбалтывать.

**Побочное действие.** Возможны аллергические реакции. В случае возникновения побочных реакций, в том числе не указанных в данной инструкции, следует прекратить применение лекарственного средства и обратиться к врачу.

**Передозировка.** Информация о случаях передозировки отсутствует. В случае передозировки необходимо обратиться к врачу. Лечение симптоматическое.

**Противопоказания.** Повышенная индивидуальная чувствительность к веществам, содержащимся в лекарственном средстве.

**Применение во время беременности и кормления грудью.** Безопасность применения во время беременности и лактации не установлена. В связи с отсутствием достаточных данных принимать во время беременности и лактации не рекомендуется.

**Применение у детей.** Применение у детей до 4 лет не рекомендуется из-за отсутствия достаточных данных. Перед применением лекарственного средства у детей старше 4 лет рекомендовано проконсультироваться с врачом.

**Влияние на способность управления автомобилем и работу с движущимися механизмами.** Исследования по оценке влияния приема лекарственного средства на способность управлять автомобилем и работать с механизмами не проводились.

**Меры предосторожности.** Рекомендовано начинать прием лекарственного средства при первых признаках острого респираторного заболевания.

Если во время приема настоя симптомы сохраняются или происходит ухудшение состояния (повышается температура, развиваются нарушения дыхания, появляется кашель с гнойной мокротой и др.), необходимо прекратить прием лекарственного средства и обратиться к врачу.

**Взаимодействие с другими лекарственными средствами.** Не изучалось. В случае одновременного приема других лекарственных средств необходимо проконсультироваться с врачом.

**Условия и сроки хранения.** Хранить в защищенном от влаги и света, недоступном для детей месте, при температуре 15°C–25°C. Приготовленный настой при температуре от 8°C до 15°C – не более 2 суток.

**Срок годности.** 3 года.

**Условия отпуска.** Отпускают без рецепта.

**Упаковка.** По 35 г в пачке картонной с внутренним пакетом бумажным. В пачку картонную вкладывают листок-вкладыш с информацией для пациента.

**Производитель.** ООО «НПК Биотест».

**Адрес.** Республика Беларусь, 230014, г. Гродно, ул. Гожская, 2.

Тел. 8 (0152) 68-45-79.

Сайт: [www.biotest.by](http://www.biotest.by)

