

НДРБ  
ТЕРАФЛЕКС® ХОНДРОКРЕМ ФОРТЕ  
8913 - 2020 Листок-вкладыш  
(для пациентов)



*Внимательно прочитайте эту инструкцию перед тем, как начать прием/использование этого лекарства. Для достижения оптимальных результатов лекарственное средство следует использовать, строго выполняя все рекомендации, изложенные в инструкции. Сохраните инструкцию, она может потребоваться вновь.*

*Если у Вас возникли вопросы, если Ваше состояние ухудшилось или улучшение не наступило после проведенного лечения, обратитесь к врачу.*

*Это лекарственное средство прописано только Вам. Не передавайте его другим лицам. Это может нанести им вред, даже если симптомы их заболевания совпадают с Вашими.*

### **Наименование**

Терафлекс® Хондрокрем Форте, крем для наружного применения (10 мг+50 мг)/г.

### **Описание**

Крем от светло-желтого с зеленоватым оттенком до желтого с зеленоватым оттенком цвета с запахом диметилсульфоксида.

### **Фармакотерапевтическая группа**

Прочие средства для наружного применения при болях в суставах и мышцах. Код АТС: M02AX10.

### **Состав**

1 г крема содержит

действующие вещества: хондроитина сульфат натрия 50 мг, мелоксикам 10 мг;

вспомогательные вещества: диметилсульфоксид, пропиленгликоль, макрогола цетостеарат, цетостеариловый спирт (цетиловый спирт не более 60%, стеариловый спирт не менее 40%), парафин жидкий, вазелин, имидомочевина, натрия дисульфит, вода очищенная.

### **Фармакологические свойства**

Терафлекс Хондрокрем Форте крем обладает комбинированным действием: оказывает обезболивающее действие, способствует увеличению объема движения суставов (в области нанесения крема), обладает противовоспалительным действием, уменьшает припухлость суставов. Благодаря оптимальному сочетанию компонентов крема отмечается взаимное усиление их обезболивающего и противовоспалительного эффектов.


Хондроитина сульфат натрия – высокомолекулярный мукополисахарид, который является естественным компонентом хрящевой ткани. Хондроитина сульфат натрия ингибирует ферменты, вызывающие поражение хрящевой ткани, тормозит процессы дегенерации (разрушения) хрящевой ткани, стимулирует синтез гликозаминогликанов, тем самым уменьшает боль в суставах и улучшает их подвижность.

Мелоксикам – нестероидное противовоспалительное средство, обладает противовоспалительным, анальгетическим действием. Мелоксикам избирательно ингибирует циклооксигеназу 2, нарушает метаболизм арахидоновой кислоты, уменьшает в очаге воспаления количество простагландинов (медиаторов боли и воспаления). Мелоксикам является хондронейтральным препаратом, не оказывает негативного влияния на хрящевую ткань, не влияет на синтез протеогликана хондроцитами суставного хряща.

Фармакокинетика компонентов препарата не изучалась.

### **Показания к применению**

В составе комплексной терапии остеоартроза коленного сустава.



### **Способ применения и дозы**

Наружно. Слегка втирают полоску крема длиной от 1 до 5 см, кратность применения 2-3 раза в сутки. Необходимое количество препарата зависит от размера болезненной зоны. После нанесения крема руки необходимо тщательно вымыть. Длительность лечения зависит от показаний и отмечаемого эффекта.

8913 - 2020

### **Побочное действие**

Со стороны кожи и подкожных тканей возможны: гиперемия, папулезно-везикулезные высыпания, шелушение, фотосенсибилизация, аллергические реакции (зуд и жжение кожи, многоформная эритема, крапивница).

### **Сообщение о нежелательных реакциях**

*Если у вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях в информационную базу данных по нежелательным реакциям (действиям) на лекарственные препараты, включая сообщения о неэффективности лекарственных препаратов. Сообщая о нежелательных реакциях, вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.*

### **Противопоказания**

Гиперчувствительность к компонентам препарата (а также к другим нестероидным противовоспалительным средствам); полное или неполное сочетание бронхиальной астмы, рецидивирующего полипоза носа и околоносовых пазух и непереносимости ацетилсалициловой кислоты или других НПВС (в т.ч. в анамнезе); нарушение целостности кожных покровов в местах предполагаемого нанесения, детский возраст до 12 лет, период беременности и лактации.

### **Передозировка**

Крайне низкая системная абсорбция действующих веществ при наружном применении делает передозировку практически невозможной.

### **Меры предосторожности**

Крем следует наносить только на неповрежденную кожу, избегая попадания на открытые раны. Не следует допускать попадания в глаза и слизистые оболочки.

Следует проконсультироваться с врачом перед совместным применением Терафлекс Хондрокрем Форте крема с другими нестероидными противовоспалительными препаратами, а также при необходимости использования препарата более 2-х недель.

Следует соблюдать осторожность при нарушении функции почек и печени, хронической сердечной недостаточности, при выраженной патологии желудочно-кишечного тракта (кровотечения желудка и 12-перстной кишки, язвенная болезнь в фазе обострения или тяжелые нарушения свертываемости крови), пожилой возраст.

В период лечения возможно развитие реакций фоточувствительности. Для уменьшения риска развития фотосенсибилизации пациентам следует избегать УФ-облучения и посещения солярия.

Входящие в состав вспомогательных веществ диметилсульфоксид и пропиленгликоль могут раздражать кожу; цетостеариловый спирт может вызывать местные кожные реакции (например, контактный дерматит).


### **Беременность и лактация**

Применение препарата противопоказано в период беременности и лактации.

### **Влияние на способность к вождению автомобиля и управлению механизмами**

Не влияет.

05.05.2020



**Взаимодействие с другими лекарственными средствами**  
Случаи взаимодействия или несовместимости с другими лекарственными средствами не описаны.

**Условия хранения**

При температуре не выше 25 °С, в недоступном для детей месте.

8913 - 2020

**Срок годности**

2 года. Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.

**Форма выпуска**

Туба алюминиевая 30 г, 50 г или 100 г вместе с листком-вкладышем помещены в картонную коробку.

**Условия отпуска**

Без рецепта.

**Название фирмы-заявителя/производителя, адрес:**

Байер Консьюмер Кэр АГ,  
Петер Мериан-Штрассе 84, 4052 Базель, Швейцария

АО «Нижфарм»,  
ул. Салганская, 7, Нижний Новгород, 603950, Россия