

ДОЛГИТ ® Крем, 50 мг/г

1126 - 2019

**Международное непатентованное название (МНН) Ибупрофен (Ibuprofen)**

**Общая характеристика:**

Однородный мягкий крем без комочеков, белого или белого с желтоватым оттенком цвета, с легким специфическим лавандово-цитрусовым запахом.


**Лекарственная форма:** крем для наружного применения

**Код классификации лекарственного средства:** Нестероидные противовоспалительные

препараты (НПВП). Код АТС: М02АА12

**Состав:** 1г крема содержит 50 мг Ибупрофена (активное вещество)

Вспомогательные вещества: триглицериды средней цепи, вода очищенная, глицерина моностеарат, пропиленгликоль, полиоксиэтилен-100-стеарат, полиоксиэтилен-30-стеарат, ксантановая камедь (Е 145), натрия метилпарабен (Е 219), лавандовое масло, неролиевое масло



**Внимательно прочтите весь листок-вкладыш до начала применения препарата, так как он содержит важную для Вас информацию.**

Всегда используйте данный препарат точно по инструкции или согласно рекомендациям врача или фармацевта.

- Сохраните данный листок-вкладыш. Возможно, Вам нужно будет его перечитать.
- Проконсультируйтесь с Вашим фармацевтом, если Вам нужна дополнительная информация или рекомендации.
- Если у Вас наблюдаются побочные действия, проконсультируйтесь с Вашим врачом или фармацевтом, в том числе, если данные побочные действия не указаны в данном листке-вкладыше. Смотрите раздел 4.
- Вам следует проконсультироваться с врачом, если Вам не становится лучше, или Вы чувствуете ухудшение после 3 дней применения.

**Содержание данного листка-вкладыша:**

- Что такое Долгит® Крем, 50 мг/г и для чего он используется
- Что Вам нужно знать перед применением Долгит® Крем, 50 мг/г
- Как применять Долгит® Крем, 50 мг/г
- Возможные побочные действия
- Как хранить Долгит® Крем, 50 мг/г
- Содержимое упаковки и прочая информация

**1. Что такое Долгит® Крем, 50 мг/г и для чего он используется**


Долгит® Крем, 50 мг/г является болеутоляющим и противовоспалительным препаратом для местного применения.

**Показания:** Для местного или поддерживающего лечения:

- мышечной боли ревматического происхождения,
- дегенеративных заболеваний суставов с болевым синдромом (артроз),
- воспалительных ревматоидных заболеваний суставов и позвоночника,
- отеков и воспаления мягких тканей, прилегающих к поврежденным суставам (бурсита, тендинита, тендовагинита, поражения связок и суставных капсул),
- скованность движений плечевого сустава, болевого синдрома в области крестца, миалгия, люмбаго, спортивных травмах, ушибах, вывихах и растяжениях.

Долгит ® крем применяется у взрослых и детей возрастом от 14 лет и старше.

2. Что Вам нужно знать перед применением Долгит® Крема



### Не применяйте Долгит® Крем, 50 мг/г

- если у Вас аллергия на ибупрофен, консервант метил-4-гидроксибензойную кислоту, пропиленгликоль, иные болеутоляющие или противоревматические средства, или прочие ингредиенты данного препарата (перечислены в разделе 6).
- на открытых ранах, воспаленных участках или при инфекционном поражении кожи, а также при экземе или на слизистые оболочки;
- в последнем триместре беременности.

### Особые указания и меры предосторожности

Проконсультируйтесь с Вашим врачом, фармацевтом или медсестрой до начала применения Долгит® Крема, 50 мг/г

#### Дети и подростки

Долгит® Крема, 50 мг/г не рекомендуется применять у детей и подростков возрастом младше 14 лет, так как для данной возрастной группы нет достаточных данных.

Пациенты с астмой, поллинозом, отеком и гиперплазией слизистой оболочки носа или хроническим обструктивным заболеванием легких (особенно в сочетании с поллинозоподобными симптомами) и пациенты с гиперчувствительностью к болеутоляющим и противоревматическим веществам любого типа подвержены большему риску развития приступов астмы (интолерантность к анальгетикам/анальгетическая астма), отеком кожи и слизистых оболочек (так называемый отек Квинке) или крапивницы по сравнению с прочими пациентами.

У таких пациентов Долгит ® Крем, 50 мг/г следует применять с осторожностью и под медицинским наблюдением. То же самое относится к пациентам с гиперчувствительностью (аллергией) к прочим веществам, у которых проявляются кожные реакции, зуд или крапивница.

Убедитесь, что дети не дотрагиваются до участков кожи, на которые было нанесено лекарственное средство.

В случае если симптомы продолжаются более 3 дней, обратитесь к врачу.

### Прочие лекарственные средства и Долгит ® Крем, 50 мг/г

Сообщите Вашему врачу или фармацевту, если Вы применяете, недавно применяли или можете применять другие лекарственные средства.

При применении согласно инструкции взаимодействия Долгит ® Крема, 50 мг/г с другими лекарственными средствами зарегистрировано не было.

### Беременность, кормление грудью и детородная способность

Если Вы беременны, кормите грудью или думаете, что можете быть беременны, или Вы планируете беременность, проконсультируйтесь с Вашим врачом или фармацевтом, чтобы получить рекомендации до начала применения препарата.

Беременность

Свяжитесь с Вашим врачом, если Вы забеременели во время применения Долгит® Крема. Не используйте ибупрофен в первом и втором триместрах беременности без предварительной консультации с врачом. Долгит® Крем, 50 мг/г нельзя применять на поздних сроках беременности по причине повышенного риска для матери и ребенка.

Кормление грудью

Лишь небольшое количество активного вещества ибупрофена и продуктов его распада проникает в грудное молоко. Так как до настоящего момента негативного воздействия на грудных младенцев выявлено не было, необходимости прерывания грудного вскармливания в случае краткосрочного лечения нет. Тем не менее, не следует превышать суточную дозировку 3-4 применения, при каждом из которых используются полоски крема длиной 4-10 см, также следует рассматривать ранее прекращение грудного вскармливания в случае продолжительного лечения.

Кормящим грудью женщинам не следует применять данный препарат в области груди во избежание всасывания ребенком.

**Воздействие на способность управлять автомобилем и работу с механизмами**

Необходимости в особых мерах предосторожности нет.

**Долгит® Крем, 50 мг/г содержит пропиленгликоль.**

Пропиленгликоль может вызвать раздражение кожи.

**3. Как применять Долгит® Крем, 50 мг/г.**

Всегда используйте данный препарат согласно листку-вкладышу или согласно рекомендациям врача, фармацевта или медсестры. Проконсультируйтесь с врачом, фармацевтом или медсестрой, если Вы не уверены, как применять препарат.

Рекомендованная доза:

Применяйте Долгит® Крем, 50 мг/г 3-4 раза в день. В зависимости от площади пораженной поверхности, Вам необходимо использовать полоску крема длиной 4-10 см, что соответствует 2-5 г крема (100-250 мг ибупрофена). Максимальная суточная доза - 20 г крема, что соответствует 1000 мг ибупрофена.

Метод применения

Только для наружного применения! Не применять внутрь!

Долгит® Крем, 50 мг/г наносят на кожу и втирают легкими движениями. В случаях сильных гематом или вывихов в начале лечения может быть полезно наложение герметичной повязки. Проникновение активного вещества через кожу может быть усилено с помощью ионофореза (специальная форма электротерапии). Долгит® крем, 50 мг/г следует применять под катодом (отрицательное поле). Текущая сила тока должна быть 0,1-0,5 мА на 5 см<sup>2</sup> поверхности электрода, длительность лечения - около 10 минут.

Продолжительность лечения

Продолжительность лечения определяется Вашим врачом. Обычно применения в течение 2-3- недель достаточно. Терапевтический эффект при применении в течение периода выше указанного не доказан.

НЦ РБ

1126 - 2019

## **СОГЛАСОВАНО**

## **МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ**

## РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

## Приказ Министерства здравоохранения

**слишком сильное и чрезмерно  
республиканское** Беларусь слишком

Digitized by srujanika@gmail.com

Если Вам кажется, что действие Долгит® крема, 50 мг/г, слабое, сообщите об этом Вашему врачу или фармацевту.

**Если Вы применяете Долгит ® Крем, 50 мг/г в течение более длительного периода, чем следует**

При превышении рекомендованной дозировки при местном применении следует удалить крем и промыть кожу водой. Свяжитесь с Вашим врачом в случае чрезмерного применения или случайного приема внутрь.

Специфического антитела к препарату нет.

Если у Вас есть какие-либо вопросы по использованию данного препарата, спросите Вашего врача или фармацевта.

#### 4. Возможные побочные действия

Как и у всех лекарственных средств, данный препарат может иметь побочные действия, которые однако проявляются редко.

Для описания побочных действий по их частоте принимается за основу следующая классификация:

Очень часто:	более чем у одного из 10 пациентов
Часто:	от 1 до 10 из 100 пациентов
Нечасто:	от 1 до 10 из 1000 пациентов
Редко:	от 1 до 10 из 10000 пациентов
Очень редко:	менее чем у 1 из 10000 пациентов
Неизвестно:	Частота проявления не может быть вычислена на основании имеющихся данных

#### **Побочные действия, которые могут проявиться:**

Частые побочные действия: кожные реакции, такие как эритема, зуд, чувство жжения, экзантема, также с образованием пустул или зудящих волдырей.

Нечастые побочные действия: возможны реакции гиперчувствительности, такие как местные аллергические реакции (контактный дерматит).  
Важно:

В очень редких случаях возможны бронхоспастические реакции у пациентов, имеющих к ним предрасположенность.

В случае, если Долгит ® крем, 50 мг/г применяется на обширном участке кожи в течение длительного периода, нельзя исключать побочные реакции, воздействующие на определенную систему органов или на весь организм, которые, возможно, могут проявиться после систематического применения ибупрофенсодержащих лекарственных средств.

Метил-4-гидроксибензоат натрия может вызывать реакции гиперчувствительности, а также аллергические реакции замедленного типа.

#### **Сообщение о побочных эффектах**

**Сообщение о побочных эффектах**  
Если у Вас проявились какие-либо побочные действия, проконсультируйтесь с Вашим врачом, фармацевтом или медсестрой, также в случае проявления побочных действий, не указанных в данном листке-вкладыше. Вы можете также сообщить о побочных действиях ответственному за фармаконадзор в Республике Беларусь: ИООО «НАТУСАНА», 220140 Минск, ул. Лещинского 8/4-1, тел.: (017) 399-69-65

1126 - 20<sub>5</sub>19

СОГЛАСОВАНО

МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Приказ Министерства здравоохранения

и высшее здравоохранение Республики Беларусь

5. Как хранить Долгит® Крем, 50 мг/г

Хранить в недоступном для детей месте, при температуре не выше 25°C.

Срок годности 3 года, после первого вскрытия тубы -6 месяцев.

Не применять по окончании срока годности.

6. Упаковка

Алюминиевые тубы по 20 г, 50 г, 100 г крема в картонной пачке с вложенным листком-вкладышем.

Условия отпуска: Без рецепта

Производитель/ Владелец регистрационного удостоверения  
ДОЛОРИГИТ ГмбХ & Ко.кг  
Отто-фон-Гюрике-Штрассе 1  
D-53757 Санкт-Августин  
E-mail: info@dolorgiet.de

Представительство в Республике Беларусь

ИООО «НАТУСАНА» 220140 Минск, ул. Лещинского, 8/4-1,  
Тел./факс (017) 399-69-65