


## ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА

**НАЗВАНИЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА**

ЦИПОКСИЛ

**ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА****Международное непатентованное название**

Циклопирокс/ Ciclopirox

**Описание**

Легко испаряющаяся, прозрачная, бесцветная или бледно-желтого цвета жидкость с характерным запахом этилацетата.

**ФОРМА ВЫПУСКА**

Лак для ногтей.

**СОСТАВ ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА**

1 грамм лака для ногтей содержит:

*активное вещество:* циклопирокс 80 мг;

*вспомогательные вещества:* этилацетат, изопропиловый спирт, метоксиэтен (сополимер метилвинилового эфира и монобутилового эфира малеиновой кислоты).

**ОСНОВНАЯ КЛИНИКО-ФАРМАКОЛОГИЧЕСКАЯ ГРУППА**

Прочие противогрибковые препараты для местного применения. Код ATX: D01AE14

**ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ**

Первичное лечение онихомикоза от легкой до умеренной степени тяжести без вовлечения матрикса, вызванного дерматофитами и/или другими грибами, чувствительными к циклопироксу.

**СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗИРОВКА**

ЦИПОКСИЛ назначается взрослым пациентам. Данные применения у детей отсутствуют.

Для наружного применения.

Перед началом лечения рекомендуется удалить отросшие части пораженных ногтей, используя кусачки для ногтей, пилочку для ногтей или ножницы.

В первый месяц ЦИПОКСИЛ применяется каждые два дня. Во второй месяц частоту применению можно сократить, по крайней мере, до двух раз в неделю; с третьего месяца, возможно применение один раз в неделю.

Лекарственный лак должен полностью покрывать ногтевую пластину. После использования плотно закройте флакон.

На протяжении всего периода лечения, пленкообразующий слой на поверхности ногтя необходимо удалять раз в неделю, используя косметическое средство для удаления лака с

9322 - 2019

СОГЛАСОВАНО  
министерством здравоохранения  
Российской Федерации  
приказом министра здравоохранения  
 Российской Федерации № 144  
от 14.02.2019 г.

ногтей, так как в дальнейшем он может мешать проникновению активных веществ. В это же время рекомендуется удалять отросшие части пораженных ногтей.

Лечение продолжают до полного микологического и клинического выздоровления и появления роста здорового ногтя.

Контрольный анализ на присутствие грибков необходимо проводить через 4 недели после окончания лечения, чтобы избежать недостоверного результата вследствие возможного остаточного эффекта препарата.

*При местном лечении не требуется корректировка доз для особых групп пациентов.*

Если отсутствует эффект от лечения препаратом ЦИПОКСИЛ и/или имеется обширное поражение одного или нескольких пальцев на ногах и руках, то дополнительно применяют пероральные препараты.

Лечение обычно длится от 3 (онихомикоз на ногтях рук) до 6 месяцев (онихомикоз на ногтях ног). Тем не менее, продолжительность лечения не должна превышать 6 месяцев.

## **ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ**

Длительное применение препарата может привести к явлениям гиперчувствительности. В таких случаях необходимо прекратить лечение и обратиться к врачу. В очень редких случаях сообщалось о покраснении и шелушении кожи около больного ногтя после контакта с препаратом ЦИПОКСИЛ.

## **ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ**

Повышенная чувствительность к активному веществу или вспомогательным веществам.

Из-за отсутствия клинического опыта лечение препаратом ЦИПОКСИЛ противопоказано детям.

## **ПЕРЕДОЗИРОВКА.**

Симптомы передозировки препарата ЦИПОКСИЛ неизвестны.

## **МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.**

ЦИПОКСИЛ следует применять исключительно на ногтях. Избегать контакта с глазами и слизистыми оболочками.

В случае сенсибилизации, необходимо прекратить терапию препаратом и провести соответствующее лечение.

Как и во всех случаях местного лечения онихомикоза, в случае поражения нескольких ногтей (> 5 ногтей), в случае если более двух третей ногтевой пластины поражено, а также в случаях предрасполагающих факторов, таких как диабет и иммунные нарушения, следует дополнительно рассматривать системную терапию.

Для больных инсулинов зависимых сахарным диабетом и диабетической невропатией необходимо оценить риск при удалении инфицированного, шатающегося ногтя медицинским работником или самим пациентом во время чистки.

## **Период беременности и кормления грудью**

Не рекомендуется применение препарата ЦИПОКСИЛ во время беременности и лактации вследствие отсутствия клинического опыта в таких случаях.

9322 - 2010

СОГЛАСОВАНО

Министерством здравоохранения  
Республики Беларусь

Приказ Министерства здравоохранения

## **Влияние на способность к управлению автотранспортом и работе с механизмами.**

Поскольку препарат не влияет на состояние бодрствования и способность к концентрации, ЦИПОКСИЛ не влияет на способность к управлению автотранспортом и работе с механизмами.

## **ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ И ДРУГИЕ ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ.**

Данные о взаимодействии с другими лекарственными средствами отсутствуют.

См. раздел «Несовместимость».

## **Несовместимость**

В ходе клинических испытаний фармакологическая несовместимость не выявлена.

## **УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И СРОК ГОДНОСТИ**

### **Срок годности**

3 года. После первого вскрытия - 6 месяцев.

Не следует использовать препарат после истечения срока годности, указанного на упаковке.

### **Условия хранения**

Хранить при температуре не выше 25°C в защищённом от света месте.

Хранить в недоступном для детей месте.

### **Особые указания по использованию**

После каждого применения препарата ЦИПОКСИЛ флакон должен быть плотно закрыт для предотвращения испарения. Для предотвращения прилипания крышки к флакону не следует касаться лаком резьбы горлышка флакона.

## **УСЛОВИЯ ОТПУСКА**

Без рецепта врача.

## **УПАКОВКА**

По 3 г препарата во флаконе из прозрачного стекла с завинчивающейся крышкой, снабженной кисточкой. Флакон упаковывается в картонную коробку вместе с листком-вкладышем лекарственного средства.

## **ВЛАДЕЛЕЦ РЕГИСТРАЦИИ**

ЗАО «ИНТЕЛИ ГЕНЕРИКС НОРД»

ул. Шейминишкю 3, 09312 Вильнюс, Литовская Республика

## **ПРОИЗВОДИТЕЛЬ**

Лаборатории Серра Памьеc, АО, шоссе Кастельвель, 24

43206 Peus (Таррагона), Испания