


ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ

ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА ФУРАЦИЛИН АВЕКСИМА



Торговое название: ФУРАЦИЛИН АВЕКСИМА.

Международное непатентованное название: нитрофурал.

Лекарственная форма: таблетки шипучие для приготовления раствора для местного и наружного применения

Состав:

Состав на одну таблетку:

действующее вещество: нитрофурал (фурацилин) – 20мг;

вспомогательные вещества: винная кислота – 375 мг, натрия гидрокарбонат – 299 мг, натрия карбонат – 325 мг, натрия хлорид - 100 мг, макрогол 20000 – 65 мг, повидон К25 – 16 мг.

Описание

Круглые, плоскоцилиндрической формы таблетки, от светло-желтого до желтого цвета с вкраплениями, с фаской на обеих сторонах. Допускается шероховатость поверхности таблетки.

Фармакотерапевтическая группа: антисептики и дезинфицирующие лекарственные средства. Производные нитрофурана.

Показания к применению

В составе комплексной терапии:

Наружно: гнойные раны, пролежни, ожоги II-III степени, мелкие повреждения кожи (в т.ч. ссадины, царапины, трещины, порезы).

Местно: острый тонзиллит (ангина), стоматит, гингивит, блефарит, конъюнктивит, остеомиелит, эмпиема придаточных пазух носа и плевры; инфекции мочевыводящих путей - промывание полостей.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к нитрофуралу, производным нитрофурана и/или другим компонентам лекарственного средства, кровотечение, аллергодерматозы, выраженные нарушения функции почек.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Применение при беременности и в период грудного вскармливания возможно, если предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода или ребенка.

9636 - 2021

Способ применения и дозы

Местно: в виде 0,02% свежеприготовленного водного раствора: непосредственно перед применением одну таблетку (20 мг фурацилина) растворяют в 100 мл дистиллированной воды комнатной температуры или в теплой воде.

Наружно: в виде водного 0,02% раствора - орошают раны, накладывают влажные повязки.

Блефарит, конъюнктивит – инстиляция водного 0,02% раствора в конъюнктивальный мешок.

Остеомиелит после операции - промывание полости, с последующим наложением влажной повязки.

Эмпиема придаточных пазух носа (в том числе при гайморите) - промывание полости, эмпиема плевры - после удаления гноя проводят промывание плевральной полости и вводят 20-100 мл водного 0,02% раствора.

Для промывания мочеиспускательного канала и мочевого пузыря применяют водный раствор 0,02% с экспозицией 20 мин.

При тонзиллите, стоматите, гингивите –полоскание рта и горла по 100 мл водного 0,02% раствора 2-3 раза в день.

Продолжительность лечения – по показаниям в зависимости от характера и локализации пораженного участка. Если симптомы сохраняются, рекомендуется обратиться к врачу.


Побочное действие

Возможны аллергические реакции: кожный зуд, дерматит.

Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

О случаях передозировки не сообщалось.

**Меры предосторожности**

В связи с тем, что нет достаточных данных о безопасности применения, лекарственное средство не рекомендуется использовать у детей и подростков в возрасте до 18 лет. При применении лекарственного средства возможны реакции кросс-сенсibilизации. Чтобы избежать указанных реакций рекомендуется использовать лекарственное средство не более 5 дней.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Не изучалось.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Лекарственное средство не влияет на способность управлять транспортом или заниматься другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

9636 - 2021

Форма выпуска

Таблетки шипучие 20 мг.

По 2 таблетки в контурную безъячейковую упаковку (стрип) из материала упаковочного комбинированного на бумажной основе.

По 5 контурных безъячейковых упаковок (стрипов) с инструкцией по медицинскому применению помещают в пачку из картона.

Условия хранения

Хранить в защищенном от влаги и света месте, при температуре не выше 25°C.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

2 года.

По истечении срока годности лекарственное средство не применять.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта.

**Наименование держателя (владельца) регистрационного удостоверения/
Организация, принимающая претензии потребителей**

ОАО «Авексима»

125284, Россия, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 31А, стр. 1.

Тел.: +7 (495) 258-45-28.

Производитель

ОАО «Ирбитский химфармзавод»

623856, Россия, Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Кирова, 172.

Тел/факс: (34355) 3-60-90

Адрес производства:

Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Карла Маркса, 124-а.

СОГЛАСОВАНО МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ Приказ Министерства здравоохранения Республики Беларусь
--