

Перед употреблением лекарственного средства обязательно прочитайте листок-вкладыш!

ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ
(информация для пациента)
МЯТЫ ПЕРЕЧНОЙ ЛИСТЬЯ
MENTHAE PIPERITAE FOLIA



Регистрационный номер _____

Форма выпуска Измельченное сырье.

Общая характеристика

Кусочки листьев различной формы, размером до 10 мм и более с примесью цветков и бутонов. Край листа пильчатый с неравными острыми зубцами, поверхность голая, лишь снизу по жилкам под лупой (10 х) заметны редкие прижатые волоски и по всей пластинке листа – блестящие золотисто-желтые или более темные эфирномасличные железки. Цвет листьев от светло-зеленого до коричневато-зеленого с возможным присутствием буровато-коричневых и белых (стебель) вкраплений. Запах сильный, ароматный.

Фармакотерапевтическая группа

Прочие средства для устранения тошноты.

Фармакологические свойства

Лекарственное средство оказывает спазмолитическое, желчегонное и слабое седативное действие, снижает тонус пищеводного сфинктера.

Показания к применению

Внутрь: симптоматическое лечение функциональных расстройств пищеварительного тракта (диспепсия, тошнота, метеоризм).

Противопоказания

Повышенная индивидуальная чувствительность к веществам, содержащимся в лекарственном средстве, а также к ментолу. Выраженная артериальная гипотензия, холелитиаз, желудочно-пищеводный рефлюкс, беременность, период лактации, детский возраст до 4 лет.

Способ применения и дозы

5 г (1,5 ст. ложки) листьев помещают в эмалированную посуду, заливают 200 мл (1 стакан) водой комнатной температуры, закрывают крышкой и настаивают на водяной бане при частом помешивании в течение 15 мин, охлаждают при комнатной температуре не менее 45 мин, процеживают, отжимают оставшееся сырье. Объем полученного настоя доводят кипяченой водой до 200 мл.

Принимают внутрь в теплом виде: взрослые – по 1/3-1/2 стакана, дети, в зависимости от возраста, по рекомендации врача, – от 1 ст. ложки до 1/4 стакана настоя 2-3 раза в день за 15 мин до еды.

Перед употреблением настоя рекомендуется взбалтывать.

Продолжительность лечения определяется врачом с учетом особенностей заболевания, достигнутого эффекта и переносимости лекарственного средства.

Побочное действие

Возможны аллергические реакции. Вследствие гастроэзофагеального рефлюкса может усиливаться изжога. У пациентов с холелитиазом лекарственное средство может вызвать желчную колику. В случае возникновения побочных реакций, в том числе не указанных в данной инструкции, следует прекратить прием лекарственного средства и обратиться к врачу.

Меры предосторожности

Пациентам с заболеваниями печени, желчнокаменной болезнью и другими заболеваниями желчевыводящих путей перед приемом лекарственного средства необходимо обратиться к врачу. Если во время приема лекарственного средства симптомы сохраняются или происходит ухудшение состояния необходимо обратиться к врачу.

Применение в период беременности и лактации. Безопасность применения во время беременности и лактации не установлена. В связи с отсутствием достаточных данных применять во время беременности и лактации не рекомендуется.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с другими механизмами. Исследования по оценке влияния на способность управлять автомобилем и работать с механизмами не проводились. В связи с возможным седативным эффектом во время лечения не рекомендовано управлять автомобилем и работать с механизмами.

Применение у детей. Прием препаратов мяты перечной детям до 4 лет не рекомендован в связи с отсутствием адекватных данных.

Передозировка

При передозировке возможно развитие бронхоспазма, нарушения дыхания, появление боли в области сердца, усиление седативного эффекта. В случае возникновения симптомов передозировки необходимо прекратить прием лекарственного средства и обратиться к врачу. Лечение симптоматическое.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Информация отсутствует.

Срок годности 2 года.

Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения

Хранить в защищенном от света и влаги месте при температуре (15-25) °С. Приготовленный настой – в прохладном месте не более 2 суток при температуре (8-15) °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Условия отпуска

Без рецепта врача.

Упаковка

По 50 г в пакете бумажном в пачке картонной. Листок-вкладыш (информация для пациента), вкладывается в пачку.

Производитель: ООО "Падис'С"

Республика Беларусь, 220040, г. Минск, ул. Некрасова, 35/2, тел/факс (017) 331-99-12, www.padiss.by.