

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ



ИНСТРУКЦИЯ
(информация для пациентов)
по медицинскому применению лекарственного средства
БОЯРЫШНИКА НАСТОЙКА

Торговое название: Боярышника настойка.

Международное непатентованное название: нет.

Форма выпуска: настойка.

Описание: прозрачная жидкость от коричневато-желтого до красно-коричневого цвета с ароматным запахом. В процессе хранения возможно появление осадка.

Состав на один флакон: спиртовое извлечение боярышника плодов 1:10.

Содержание этанола – не менее 65,0 %.

Фармакотерапевтическая группа: Прочие средства для лечения заболеваний сердца.

Код АТС: C01EB04.

Фармакологическое действие

Биологически активные вещества, содержащиеся в плодах боярышника, оказывают умеренное кардиотоническое, гипотензивное, спазмолитическое, седативное действие, урежают частоту сердечных сокращений, способствуют улучшению коронарного кровообращения.

Показания к применению

В комплексной терапии функциональных нарушений сердечно-сосудистой деятельности, астено-невротических состояний.


Способ применения и дозы

Внутрь, за 30 минут до еды. Режим дозирования устанавливается индивидуально в зависимости от состояния и возраста больного. Обычная доза для взрослых – по 20-30 капель настойки, разведенных в $\frac{1}{4}$ стакана воды, 3 раза в день до достижения стабильного эффекта. Детям с 12 лет из расчета одна капля на год жизни. Не рекомендуется применять препарат в течение длительного времени из-за содержания этанола. Продолжительность приема у детей должна быть минимальной. Во время лечения необходимо избегать приема других этанолсодержащих средств.

Побочное действие

Головокружение, тремор, аллергические реакции: редко – крапивница, зуд. При длительном применении – брадикардия, при применении в больших дозах – снижение артериального давления, сонливость.

В случае возникновения вышеуперечисленных побочных реакций или побочных реакций, не указанных в данной инструкции по медицинскому применению лекарственного средства, необходимо обратиться к врачу.



Противопоказания

Гиперчувствительность ко всем компонентам препарата, беременность и период лактации (в период лечения приостанавливают вскармливание).

С осторожностью: заболевания печени, алкоголизм, черепно-мозговая травма, заболевания головного мозга.

Передозировка

Симптомы: снижение артериального давления, головокружение, сонливость, брадикардия.

Лечение: отмена препарата, симптоматическая терапия.

Меры предосторожности

Перед приемом лекарственного средства необходима консультация врача для точной диагностики заболевания. Во время лечения необходим контроль артериального давления и ЭКГ-мониторирование.

Если во время лечения симптомы сохраняются или происходит ухудшение состояния, развиваются отеки нижних конечностей, необходимо обратиться к врачу. Необходима немедленная медицинская помощь при возникновении боли в области сердца с иррадиацией в руку, верхнюю часть живота, шею или в случае развития дыхательной недостаточности (например, одышка).

Лекарственное средство содержит не менее 65% этилового спирта, т.е. до 554 – 831 мг на разовую дозу 20-30 капель соответственно.

Применение во время беременности и в период лактации. Противопоказано.

Влияние на способность к управлению транспортом и потенциально опасными механизмами. Препарат содержит спирт! В период лечения необходимо воздержаться от вождения автотранспорта и занятия другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Необходимо избегать одновременного применения других лекарственных средств, содержащих этиловый спирт.

Взаимодействия, связанные с наличием в составе этилового спирта:

- лекарственные средства, вызывающие дисульфирамоподобную реакцию (ощущение жара, покраснение кожных покровов, рвота, тахикардия), при совместном приеме с алкоголем: дисульфирам, цефамандол, цефоперазон, латамоксифен, хлорамфеникол, хлорпропамид, глибенкламид, глипизид, толбутамид и другие гипогликемические препараты, гризофульвин, метронидазол, орнидазол, тинидазол, кетоконазол, прокарбазин;

- лекарственные средства, угнетающие функции центральной нервной системы.

При совместном назначении с сердечными гликозидами происходит усиление кардиотонического эффекта; с бета-адреноблокаторами – гипотензивного эффекта. Не рекомендуется одновременное применение с антиаритмиками III класса, а также с цизапридом. Прием с солями алкалоидов не рекомендуется в связи с возможностью образования комплексов.

Условия хранения

В защищенном от света месте при температуре не выше 25 °C.

Беречь от огня.

Хранить в недоступном для детей месте.

В процессе хранения возможно появление осадка.

Срок годности

2 года.


Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Упаковка

По 30 мл или 50 мл во флаконах в упаковке № 1, во флаконах по 30 мл или 50 мл.

Отпуск из аптек

Без рецепта.



Производитель:

РУП "Белмедпрепараты",
Республика Беларусь, 220007, г. Минск,
ул. Фабрициуса, 30, т./ф.: (+375 17) 220 37 16,
e-mail: medic@belmedpreparaty.com