



**ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ
лекарственного средства
ШАЛФЕЙ**

информация для пациентов

Название лекарственного средства:

Торговое название: Шалфей.

Международное непатентованное название: нет.

Описание: Таблетки цилиндрические, двояковыпуклые, от светло-серого до светло-коричневого цвета, с вкраплениями от светло-коричневого до темно-коричневого цвета со специфическим запахом.

Состав на одну таблетку:

активное вещество: шалфея листьев экстракт сухой 12,50 мг;

вспомогательные вещества: шалфея испанского масло, сорбитол, лимонная кислота безводная, сахаринат натрия, магния стеарат, ароматическая добавка «Мед» (медовый эфир, масло герани, этилбутират, этилмальтотол (E637), мальтодекстрин, мальтотол, декстроза (E1200), сипернат (E551)).

Лекарственная форма: таблетки для рассасывания.

Фармакотерапевтическая группа: Прочие средства для местного лечения заболеваний полости рта.

Фармакологические свойства:

Оказывает противовоспалительное действие. Обладает вяжущими свойствами.

Показания к применению:

В комплексной терапии воспалительных заболеваний верхних дыхательных путей:

- ларингит;
- тонзиллит;
- фарингит.

В комплексной терапии воспалительных заболеваний полости рта (гингивит).

Способ применения и дозировка:

Местно. Держать во рту до полного рассасывания, не разжевывая.

По 1 таблетке с интервалом в 2 часа. Максимально 6 таблеток в день.

Длительность терапии определяется врачом с учетом особенностей заболевания, достигнутого эффекта и переносимости лекарственного средства.

Побочные действия:

Возможны аллергические реакции.

В случае возникновения побочных реакций, в том числе не указанных в данной инструкции, следует прекратить применение лекарственного средства и обратиться к врачу!

Противопоказания:

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Применение при беременности и в период кормления грудью:

Безопасность применения при беременности и лактации не установлена. В связи с отсутствием данных применять во время беременности и в период кормления грудью противопоказано.

Передозировка:

Передозировка при приеме внутрь более 15 г листьев шалфея (около 26 таблеток настоящего лекарственного средства) может проявляться ощущением жара, развитием тахикардии, головокружения и эпилептических судорог. В случае появления симптомов передозировки необходимо

димо прекратить применение лекарственного средства и обратиться к врачу. Лечение симптоматическое.

В случае передозировки следует прекратить прием и обратиться к врачу!

Меры предосторожности:

Не следует превышать рекомендуемые дозы лекарственного средства. Не рекомендуется применять лекарственное средство более одной недели. Лекарственное средство не рекомендуется применять пациентам с врожденной непереносимостью фруктозы. Может оказывать легкое слабительное действие.

Если во время применения лекарственного средства симптомы сохраняются или происходит ухудшение состояния, необходимо прекратить прием лекарственного средства и обратиться к врачу.

Применение в детском возрасте:

В связи с отсутствием достаточных данных применять у детей до 18 лет не рекомендуется.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с другими механизмами:

Применение лекарственного средства может повлиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с другими механизмами. При возникновении головокружения и других нарушений со стороны нервной системы пациентам не рекомендовано управлять автомобилем или работать с техникой.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Прием препаратов шалфея может повлиять на эффекты лекарственных средств, действующих через ГАМК-рецепторы (например, барбитураты, бензодиазепины). Одновременное применение с данными лекарственными средствами не рекомендовано. Препараты шалфея могут взаимодействовать с гипогликемическими и противосудорожными средствами, усиливать седативное действие других лекарственных средств и алкоголя. Лекарственное средство может влиять на всасывание железа и других минералов.

Условия хранения:

В защищенном от света и влаги месте при температуре не выше 25 °C.

Хранить в недоступном для детей месте!

Срок годности:

3 года. Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска:

Без рецепта врача.

Упаковка:

По 10 таблеток в контурной ячейковой упаковке из пленки (ПВХ) и фольги алюминиевой.

По 1, 2 или 3 контурные ячейковые упаковки в картонной пачке с инструкцией по применению.

Производитель:

ООО «Рубикон», РБ, 210002, г. Витебск, ул. М. Горького, 62Б,

тел/факс: +375 (212) 34-06-29, www.rubikon.by, e-mail: secretar@rubikon.by



СОГЛАСОВАНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Приказ Министерства здравоохранения
Республики Беларусь