


**ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ**  
(информация для пациента)



**Одуванчика лекарственного корни,  
измельченное сырье 100 г в пачке  
Taraxaci officinalis radix**

**Общая характеристика:**

кусочки корней различной формы, проходящие сквозь сито (5600). Цвет серовато-белый с темно-бурыми и желтыми вкраплениями.

Одуванчика лекарственного корни содержат горькие гликозиды (тараксацин), инулин, сесквитерпеноиды, тритерпеноиды – производные α-амирина (таракастерин, тараксерол, γ-таракастерин, тараксол), кислоты органические и фенолкарбоновые, флавоноиды, стероиды, жирное масло и другие биологически активные вещества.

**Форма выпуска.** Измельченное сырье.

**Фармакотерапевтическая группа.** Прочие средства, применяемые при желудочно-кишечных заболеваниях и нарушениях метаболизма.

**Фармакологические свойства.** Отвар одуванчика лекарственного корней обладает желчегонным и диуретическим действием, повышает аппетит, усиливает секрецию желудочного сока.

**Показания к применению.** Внутрь: в составе комплексной терапии для симптоматического лечения нетяжелых функциональных расстройств желудочно-кишечного тракта (метеоризм, диспепсия, снижение аппетита).

В качестве диуретического средства в комплексной терапии заболеваний мочевыводящих путей легкой степени тяжести.

Применение по указанным назначениям основывается только на опыте продолжительного применения.

**Способ применения и дозы.** 10 г (1 столовая ложка) сырья помещают в эмалированную или другую подходящую посуду, заливают водой комнатной температуры 200 мл (1 стакан), закрывают крышкой, нагревают в кипящей воде (водяной бане) 30 мин. Охлаждают при комнатной температуре 10 мин, процеживают. Оставшееся сырье отжимают. Объем полученного отвара доводят кипяченой водой до 200 мл.

Внутрь взрослые и дети старше 12 лет принимают в теплом виде по 1/4 стакана 3-4 раза в день за 15 мин до еды.

Перед употреблением отвар рекомендуется взбалтывать.

Длительность курса лечения определяется врачом с учетом особенностей заболевания, достигнутого эффекта и переносимости лекарственного средства.

**Применение у детей.** Применение у детей до 12 лет не рекомендуется в связи с отсутствием достаточных данных.

**Применение в период беременности и лактации.** Безопасность применения во время беременности и периода лактации не установлена. В связи с отсутствием достаточных данных прием во время беременности и кормления грудью не推薦ован.

**Противопоказания.** Повышенная чувствительность к одуванчику, а также к растениям семейства астровых (сложноцветных).

Нарушение проходимости желчевыводящих путей, язвенная болезнь желудка в стадии обострения.

**Влияние на способность управления автомобилем и работу с движущимися механизмами.** Исследования не проводились.

**Побочное действие.** Возможны аллергические реакции, боли в эпигастрии и повышение кислотности желудочного сока. В случае возникновения нежелательных реакций, в том числе не указанных в данной инструкции по применению, необходимо прекратить прием отвара и обратиться к врачу.

**Меры предосторожности.** Перед приемом лекарственного средства необходима консультация врача. В связи с риском развития гиперкалиемии не следует принимать лекарственное средство пациентам с почечной и/или сердечной недостаточностью, а также пациентам с сахарным диабетом. В случае приема в качестве диуретического средства необходим достаточный прием жидкости. Если во время приема лекарственного средства симптомы сохраняются или происходит ухудшение состояния (повышается температура, развиваются расстройства, мочеиспускания, появляются боли спастического характера, кровь в моче и др.), необходимо прекратить прием лекарственного средства и обратиться к врачу.


**Передозировка.** Информация о случаях передозировки отсутствует.

**Взаимодействие с другими лекарственными средствами.** Информация о взаимодействиях отсутствует. В случае одновременного приема других лекарственных средств необходимо проконсультироваться с врачом.

**Условия и сроки хранения.** Хранить в защищенном от влаги и света, недоступном для детей месте при температуре 15°C–25°C. Приготовленный отвар при температуре от 8°C до 15°C – не более 2 суток.

**Срок годности.** 4 года.

**Условия отпуска.** Отпускают без рецепта.



**Упаковка.** По 100 г в пачке картонной с внутренним пакетом бумажным. В каждую пачку картонную вкладывают листок-вкладыш с информацией для пациента.

**Производитель.** ООО «НПК Биотест».

**Адрес.** Республика Беларусь, 230014, г. Гродно, ул. Гожская, 2.  
Тел. 8 (0152) 68-45-79.  
Сайт: [www.biostest.by](http://www.biostest.by)

