



## ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ

### УНОПРОСТ

Внимательно прочтайте весь листок-вкладыш перед тем, как начать прием/использование этого лекарственного средства, так как он содержит важную для Вас информацию.

Для достижения оптимальных результатов лекарственное средство следует использовать, строго выполняя все рекомендации, изложенные в листке-вкладыше.

Сохраните этот листок-вкладыш. Возможно, Вам понадобится прочесть его снова.

Если у вас возникли вопросы, обратитесь к врачу.

Обратитесь к врачу, если Ваше состояние ухудшилось или улучшение не наступило после проведенного лечения.

Это лекарственное средство прописано только Вам. Не передавайте его другим лицам. Это может нанести им вред, даже если симптомы их заболевания совпадают с Вашиими.

**Торговое название:** Унопрост

**МНН:** -

**Химическое название:** -

**Лекарственная форма:** капсулы.

**Состав:** одна капсула содержит сабаля мелкопильчатого липидостеролового экстракта – 320 мг.

**Состав оболочки желатиновой капсулы:** желатин, глицерин, натрия бензоат Е-211, вода очищенная, титана диоксид, красители оксид железа красный Е-172, оксид железа черный Е-172, красный очаровательный Е-129, кармуазин Е-122.

**Описание.** Капсулы мягкие желатиновые овальной формы со швом, упругие, с непрозрачной двухцветной оболочкой, окрашенной в черный/красный цвета.

**Фармакотерапевтическая группа:** Прочие средства, используемые для лечения доброкачественной гиперплазии предстательной железы.  
Код ATX G04CX02.

### Показания к применению

Затрудненное мочеиспускание при доброкачественном увеличении предстательной железы (нарушения мочеиспускания при доброкачественной гиперплазии предстательной железы 1-2 стадии).

### Способ применения и дозы

Применяют по 1 капсуле 1 раз в день в одно и то же время. Мягкую капсулу глотают целиком во время еды и запивают достаточным количеством жидкости. Продолжительность курса лечения составляет не менее 3 месяцев. Длительность лечения и необходимость в проведении повторных курсов определяется врачом индивидуально с учетом особенностей заболевания, достигнутого эффекта и переносимости лекарственного средства.

Если Вы забыли принять УНОПРОСТ, не принимайте пропущенную дозу. Нельзя удваивать дозировку лекарственного средства для компенсации пропущенной!

### ***Меры предосторожности***

Перед началом лечения лекарственным средством Унопрост, а также регулярно в процессе этого лечения пациенту необходимо проведение обследования на предмет ранней диагностики карциномы простаты.

При одновременном приеме других лекарственных средств (см. «Взаимодействие с другими лекарственными средствами») следует соблюдать осторожность.

При заболеваниях, сопровождающихся усилением склонности к кровотечениям, а также перед хирургическими или стоматологическими вмешательствами следует соблюдать осторожность, поскольку Унопрост **может способствовать** склонность к кровотечениям.

В случае пациентов, страдающих **повышением артериального давления**, следует соблюдать осторожность, так как при **проведении клинических испытаний** у единичных пациентов описано повышение артериального давления. Необходимо регулярно контролировать артериальное давление.

Прием лекарственного средства натощак может вызвать тошноту.

Прием лекарственного средства уменьшает симптомы (нарушения мочеиспускания) при доброкачественной гиперплазии предстательной железы, но не оказывает влияния на размер предстательной железы. Поэтому пациенты должны регулярно обращаться к врачу для контроля состояния предстательной железы.

Если во время лечения симптомы сохраняются или происходит ухудшение состояния (появляется кровь в моче, боли при мочеиспускании, острая задержка мочи), необходимо прекратить прием лекарственного средства и обратиться к врачу.

### ***Взаимодействие с другими лекарственными средствами***

Взаимодействие с другими лекарственными средствами на настоящий момент изучено недостаточно.

При одновременном приеме лекарственного средства с препаратами, подавляющими свертываемость крови (например: фенпрокумон, варфарин, клопидогрел, ацетилсалициловая кислота и другие нестероидные противоревматические средства), их действие может усиливаться.

При одновременном приеме лекарственного средства Унопрост с антиандrogenными препаратами их действие может усиливаться. При приеме андрогенов в терапевтических дозах действие последних может ослабляться.

### ***Применение во время беременности и лактации***

Лекарственное средство предназначено для мужчин. Лекарственное средство противопоказано женщинам во время беременности и лактации.

### ***Применение у детей***

Лекарственное средство не предназначено для приема детям и подросткам до 18 лет.

### ***Побочное действие***

Для оценки побочных действий за основу приняты следующие частоты развития: очень часто: ( $>1/10$ ); часто: (от  $\geq 1/100$  до  $<1/10$ ); иногда: (от  $\geq 1/1\ 000$  до  $<1/100$ ); редко: (от  $\geq 1/10\ 000$  до  $<1/1\ 000$ ); очень редко: ( $<1/10\ 000$ ); частота неизвестна (на основе имеющихся сведений частота оценке не поддается).

**Нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта**

*Иногда: тошнота, рвота, боли в желудке или области живота, а также диарея.*

**Нарушения со стороны сосудов**

*Иногда: повышение артериального давления*

*Частота неизвестна: при одновременном приеме других лекарственных средств могут возникать кровотечения (см. раздел «Меры предосторожности»).*

**Нарушения со стороны иммунной системы**

*Частота неизвестна: аллергические реакции или реакции повышенной чувствительности.*

При появлении побочных эффектов сообщите об этом лечащему врачу. Это касается всех возможных побочных эффектов, в том числе не описанных в данном листке-вкладыше.

***Передозировка***

О случаях передозировки не сообщалось.

***Противопоказания***

Индивидуальная непереносимость одного из компонентов лекарственного средства.

***Влияние на возможность вождения автомобиля, работу с техникой***

Не влияет.

***Форма выпуска***

Мягкие желатиновые капсулы, по 10 капсул в контурной ячейковой упаковке из бесцветной прозрачной пленки поливинилхлоридной и фолиевой пленки, печатной лакированной, по 3 или 6 контурных ячейковых упаковок вместе с листком-вкладышем укладываются в пачку из картона.

**СОГЛАСОВАНО**

МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Приказ Министерства здравоохранения

Республики Беларусь

***Условия хранения***

Хранят в защищенном от влаги и света месте при температуре от 15 °C до 25 °C.

Хранят в недоступном для детей месте.

***Срок годности***

2 года. Не использовать после истечения срока годности, указанного на упаковке.

***Условия отпуска***

Отпуск производится без рецепта врача.

Название и адрес производителя:

УП «Минскинтеркапс», Республика Беларусь,  
220075, г. Минск, а/я 112, ул. Инженерная, д. 26  
тел./факс (+ 37517) 276-01-59

e-mail: info@mic.by. www.mic.by