


Листок-вкладыш
(информация для пациента)

ГОРЦА ПТИЧЬЕГО ТРАВА
Polygoni avicularis herba

МНН. Отсутствует.



Регистрационный номер _____

Горца птичьего трава содержит флавоноиды (кверцетин, кемпферол, аникулярин, кверцитрин, гиперозид и др.), фенолкарбоновые кислоты, дубильные вещества, каротиноиды, соединения кремниевой кислоты и другие биологически активные вещества.

Состав. Горца птичьего трава, измельченное сырье.

Форма выпуска. Измельченное сырье 50 г и 100 г в пачке.

Фармакологические свойства. Настой горца птичьего травы обладает диуретическим действием.

Показания к применению. Внутрь: в качестве диуретического средства в комплексной терапии заболеваний мочевыводящих путей легкой степени тяжести.

Применение по указанным назначениям основывается только на опыте продолжительного применения.

Способ применения и дозировка. 10 г (2 столовые ложки) сырья помещают в эмалированную посуду, заливают 200 мл (1 стакан) кипящей воды комнатной температуры, закрывают крышкой и нагревают в кипящей воде (водяной бане) 15 мин. Охлаждают при комнатной температуре 45 мин, процеживают. Оставшееся сырье отжимают. Объем полученного настоя доводят кипящей водой до 200 мл.

Принимают внутрь в теплом виде по 1/3 стакана настоя 2 раза в день за 20-40 мин до еды.

Перед употреблением настой рекомендуется взбалтывать.

Длительность курса лечения определяется врачом с учетом особенностей заболевания, достигнутого эффекта и переносимости лекарственного средства.

Противопоказания. Гиперчувствительность. Беременность, период лактации, детский возраст до 12 лет, острые воспалительные процессы почек и мочевого пузыря, наличие в мочевых путях конкрементов более 6 мм, тромбофлебит, заболевания, при которых необходимо ограничение приема жидкости (например, тяжелые заболевания сердца или почек).

Побочное действие. Аллергические реакции. Почечная колика. Повышение свертываемости крови. В случае возникновения побочных реакций, в том числе не указанных в данной инструкции, следует прекратить применение лекарственного средства и обратиться к врачу.

Передозировка. Информация о случаях передозировки отсутствует. В случае передозировки необходимо обратиться к врачу. Лечение симптоматическое.

Меры предосторожности. Перед приемом лекарственного средства необходима консультация врача.

С осторожностью следует назначать пациентам с перенесенным ранее тромбофлебитом.

Рекомендуется принимать настой через соломинку, чтобы предотвратить попадание его на зубы и повреждение эмали.

Во время лечения рекомендуется соответствующее потребление жидкости.

Если во время приема лекарственного средства симптомы сохраняются или происходит ухудшение состояния (повышается температура, появляются расстройства мочеиспускания, боли спастического характера, кровь в моче и др.), необходимо прекратить прием лекарственного средства и обратиться к врачу.

СОГЛАСОВАНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
В связи с изменениями, внесеными в Постановление
Приказ Министерства здравоохранения Республики Беларусь
о порядке применения лекарственных средств в период беременности и лактации

Применение во время беременности и кормления грудью. В связи с изменениями, внесенными в Постановление Приказ Министерства здравоохранения Республики Беларусь о порядке применения лекарственных средств в период беременности и лактации не рекомендовано.

Применение у детей. Применение у детей в возрасте до 12 лет не рекомендуется из-за отсутствия достаточных данных.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами. Не следует принимать одновременно с антикоагулянтными средствами. В случае одновременного приема других лекарственных средств необходимо проконсультироваться с врачом.

Влияние на возможность вождения автомобиля и работу с техникой. Информация отсутствует.

Условия хранения. Хранить в защищенном от влаги и света месте при температуре от 15 °C до 25 °C. Хранить в недоступном для детей месте. Приготовленный настой – при температуре от 8 °C до 15 °C не более 2 суток. Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Срок годности. 3 года. Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска. Без рецепта врача.

Упаковка. По 50 г или 100 г в пачке картонной с внутренним бумажным пакетом. Предусмотрено вложение листка-вкладыша в пачку.

Производитель. ООО «Калина».

Адрес. Республика Беларусь
211019, Витебская область,
Оршанский район,
д. Пищалово

Телефон. (0216) 54-81-68