

Перед употреблением лекарственного средства обязательно прочитайте листок-вкладыш!

## ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ

(информация для пациента)

БЕССМЕРТНИКА ПЕСЧАНОГО ЦВЕТКА  
HELICHRYSI ARENARI FLORES

<b>СОГЛАСОВАНО</b>	
Министерства здравоохранения Республики Беларусь	
Приказ	
от	22.07.2019 г. № 884
КЛС №	6 от 26.06.2019 г.

Регистрационный номер: \_\_\_\_\_

Форма выпуска

Цельное сырье.

### Общая характеристика

Бессмертника песчаного цветки содержат флавоноидные гликозиды, флавоноиды, дубильные вещества, каротиноиды, полисахариды, следы эфирного масла и другие биологически активные вещества.

### Описание лекарственной формы

Цветочные корзинки, одиночные или по несколько вместе на коротких шерстисто-войлочных цветоносах длиной до 1 см, диаметром около 7 мм. Цвет обертки зеленовато-желтый, цветков – зеленовато-желтый или оранжевый. Запах слабый, ароматный.

### Фармакотерапевтическая группа

Прочие средства, применяемые для лечения заболеваний желчевыводящих путей.

### Фармакологические свойства

Лекарственное средство оказывает желчегонное действие, обладает диуретическими свойствами, стимулирует секреторную функцию желудка и поджелудочной железы.

### Показания к применению

В комплексной терапии хронического некалькулезного холецистита и дискинезии желчевыводящих путей.

Применение по указанным назначениям основывается только на опыте продолжительного применения.

### Противопоказания

Повышенная чувствительность к бессмертнику, а также к растениям семейства астровых (сложноцветных), таким как ромашка, арника, амброзия, тысячелистник, пижма, полынь, астра, хризантема. Желчнокаменная болезнь, обтурационная желтуха, острые воспалительные заболевания печени, желчного пузыря и поджелудочной железы, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, гастрит в стадии обострения. Беременность, период лактации, детский возраст до 18 лет.

### Способ применения и дозы

**Цельное сырье.** Около 5 г (4 столовых ложки цельного сырья или 3,5 столовых ложки измельченного сырья) сырья помещают в эмалированную посуду, заливают 200 мл (1 стакан) кипяченой воды комнатной температуры, закрывают крышкой и нагревают на кипящей водяной бане при частом помешивании 30 минут, охлаждают при комнатной температуре 10 минут, процеживают, оставшееся сырье отжимают. Объем полученного отвара доводят кипяченой водой до 200 мл.

Принимают внутрь по 2 столовой ложке 2-3 раза в день за 15-30 минут до еды.

Перед употреблением отвар рекомендуется взбалтывать.

Кратность приема и длительность курса лечения определяется врачом с учетом особенностей заболевания, достигнутого эффекта и переносимости лекарственного средства.

*Особенности применения у пациентов с нарушениями функции почек:* информация отсутствует.

*Особенности применения у пациентов с нарушениями функции печени:* см. разделы «Противопоказания» и «Меры предосторожности».

### Побочное действие

Возможны аллергические реакции. При длительном применении лекарственного средства возможно развитие холестаза.

В случае возникновения нежелательных реакций, в том числе не указанных в данной инструкции, следует прекратить применение лекарственного средства и обратиться к врачу.

## Меры предосторожности

Перед приемом лекарственного средства необходима консультация врача.

Из-за возможной стимуляции секреции желчи лекарственное средство не следует применять в случае обструкции желчевыводящих путей, желчнокаменной болезни, холангита, острых воспалительных заболеваний печени, желчного пузыря и поджелудочной железы.

Если во время приема лекарственного средства симптомы сохраняются или происходит ухудшение состояния, необходимо обратиться к врачу.

### *Применение в период беременности и лактации*

Безопасность применения во время беременности и кормления грудью не установлена. В связи с отсутствием достаточных данных применять во время беременности и кормления грудью не рекомендуется.

*Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с другими механизмами*

Исследования по оценке влияния применения лекарственного средства на способность управлять автомобилем и работу с механизмами не проводились.

### *Применение у детей*

Применение у детей до 18 лет не рекомендовано в связи с отсутствием достаточных данных.

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Приказ Министерства здравоохранения  
Республики Беларусь

## Передозировка

Длительное применение может привести к развитию застоя желчи. В случае проявления симптомов передозировки необходимо прекратить прием лекарственного средства и обратиться к врачу. Лечение симптоматическое.

## Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Данные о взаимодействиях с другими лекарственными средствами ограничены.

В случае одновременного приема других лекарственных средств необходимо проконсультироваться с врачом.

## Срок годности

4 года. Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

## Условия и сроки хранения

Хранить в защищенном от света и влаги месте в оригинальной упаковке при температуре (15-25)<sup>0</sup>С.

Приготовленный отвар хранить в прохладном месте не более 2-х суток.

Хранить в недоступном для детей месте.

## Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

## Упаковка

*Цельное сырье.* По 30 г в пакете бумажном в пачке картонной.

**Производитель:** ООО "Падис'С"

Республика Беларусь, 220040 г. Минск, ул. Некрасова, 35/2, тел/факс (017) 331-99-12, [www.padiss.by](http://www.padiss.by)