


МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ



ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ

(информация для пациентов)

по медицинскому применению лекарственного средства

Меновазин

Перед применением данного лекарственного средства полностью прочитайте этот листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.

Всегда применяйте данное лекарственное средство в точности с данным листком-вкладышем или рекомендациями лечащего врача, или провизора (фармацевта), или медицинской сестры.

Сохраните этот листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.

Если у Вас возникли дополнительные вопросы, обращайтесь к лечащему врачу или провизору (фармацевту), или медицинской сестре.

Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу или провизору (фармацевту), или медицинской сестре. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе не перечисленные в разделе «Побочное действие» листка-вкладыша.

Торговое название: Меновазин.


Форма выпуска: раствор для наружного применения.

Описание: бесцветная прозрачная жидкость с запахом ментола.

Состав: один флакон (40 мл) содержит действующих веществ: левоментола – 1,0 г, прокаина гидрохлорида – 0,4 г, бензокаина – 0,4 г; вспомогательные вещества: спирт этиловый 70 %.

Фармакотерапевтическая группа: средства для устранения зуда, включая антигистаминные и анестезирующие средства. Анестезирующие средства для местного применения.

Код АТХ – D04AB.



Показания к применению

- Невралгия, миалгия, артралгия (для облегчения болевого синдрома);
- зудящие дерматозы (как противозудное средство).

Противопоказания

- Гиперчувствительность к действующим или вспомогательным веществам, входящим в состав лекарственного средства;
- аллергические реакции в анамнезе на местные анестетики, такие как прокаин, бутакан или любые другие «-каиновые» анестетики;
- подозрение на метгемоглобинемию.

Лекарственное средство нельзя наносить на большие участки кожи с проявлениями экземы, солнечных ожогов, инфекции или повреждения.

Способ применения и дозы

Наружно. Наносят на кожу над пораженной областью и на пораженные участки кожи, растирают 2-3 раза в день. Продолжительность лечения не должна превышать 7 дней. При сохранении болевого синдрома и/или кожного зуда более 7 дней, необходимо обратиться к врачу и пересмотреть терапию.

Особые группы пациентов

Дети


Опыт применения у детей отсутствует. Не рекомендуется использовать Меновазин у детей и подростков в возрасте до 18 лет.

Побочное действие

Возможны раздражения кожи, сыпь.

Нежелательные реакции, связанные с бензокаином, приведены ниже и указаны в соответствии с классами системы органов и частотой, категории которой определяются по следующей классификации: очень часто ($\geq 1/10$); час-

то (от $\geq 1/100$ до $< 1/10$); нечасто (от $\geq 1/1000$ до $< 1/100$); редко (от $\geq 1/10000$ до $< 1/1000$); очень редко ($< 1/10000$); частота неизвестна (на основании имеющихся данных установить частоту невозможно).



Нарушения со стороны крови и лимфатической системы: неизвестно – метгемоглобинемия.

Нарушения со стороны иммунной системы: неизвестно – реакции гиперчувствительности, аллергический дерматит.

Сообщение о предполагаемых побочных реакциях

Если у Вас появились какие-либо симптомы, описанные или не описанные в данном листке-вкладыше, обязательно сообщите об этом Вашему лечащему врачу!

Меры предосторожности

Не наносить на поврежденную кожу и кожу с проявлениями аллергии. Не наносить на кожу лица. Не следует допускать попадание раствора в глаза, поскольку ментол, который содержится в лекарственном средстве, может вызвать сильное раздражение.

Местные анестетики не должны применяться у пациентов с полной блокадой сердца.

Применение в период беременности и кормления грудью

Данные о влиянии лекарственного средства на организм при беременности и лактации отсутствуют. Не следует применять Меновазин во время беременности и в период кормления грудью.

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управление механизмами


Лекарственное средство не оказывает влияние на способность управлять транспортными средствами и заниматься потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенного концентрированного внимания и быстроты психомоторных реакций.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Компоненты лекарственного средства снижают антибактериальное действие сульфаниламидных препаратов. Усиливают эффекты лекарственных средств с местноанестезирующим действием. При одновременном применении с другими лекарственными средствами для местного применения могут создаваться новые соединения с непредвиденным эффектом.

Сульфаниламиды

Бензокаин метаболизируется до парааминобензойной кислоты и может антагонизировать эффекты сульфонамидов.



Ингибиторы холинэстеразы

Ингибиторы холинэстеразы ингибируют метаболизм бензокаина.

Передозировка

При продолжительном применении возможны головокружение, общая слабость, снижение артериального давления. Терапия симптоматическая.

Упаковка

По 40 мл во флаконы из стекла.

Каждый флакон вместе с листком-вкладышем помещают в пачку из картона (упаковка №1).

Условия хранения

При температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

2 года. Лекарственное средство не использовать после окончания срока годности.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта.

Информация о производителе

Открытое акционерное общество «Борисовский завод медицинских препаратов», Республика Беларусь, Минская обл., г. Борисов, ул. Чапаева, 64, тел/факс +375(177)735612, 731156.