

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ



ЛИСТОК – В К Л А Д Ы Ш по медицинскому применению лекарственного средства **Аралии настойка** для внутреннего применения

Название лекарственного средства Аралии настойка.

Форма выпуска Настойка для внутреннего применения.

Общая характеристика Прозрачная жидкость светло-коричневого цвета. В процессе хранения допускается выпадение осадка.

Состав лекарственного средства

Спиртовое извлечение из аралии маньчжурской корней измельченных 1:5.

Содержит не менее 65 % этанола.

Фармакотерапевтическая группа Общетонизирующие средства.

Фармакологические свойства

Лекарственные средства из корней аралии оказывают стимулирующее влияние на центральную нервную систему, оказывают общетонизирующее и гипогликемическое действие. Улучшает аппетит, ослабляет чувство усталости.

Показания к применению

Физическое и психическое переутомление, астенические состояния, в комплексной терапии эректильной дисфункции неврастенического генеза.

Способ применения и дозировка

Принимают внутрь. Взрослым и детям старше 12 лет рекомендуется принимать по 30-40 капель настойки, разведенных в ¼ стакана воды, 2 раза в день (утром и днем). Курс лечения 15-30 дней.

Длительность курса лечения определяется врачом с учетом особенностей заболевания, переносимости лекарственного средства и достигнутого эффекта.

Не рекомендуется принимать настойку в течение длительного времени из-за содержания этанола.

Продолжительность приема у детей должна быть минимальной. Во время лечения необходимо избегать приема других этанолсодержащих средств.

Побочное действие

Аллергические реакции (зуд, крапивница), нарушения сна, тахикардия, повышение артериального давления, головная боль, гипогликемия.

В случае возникновения побочных реакций, в том числе не указанных в данной инструкции, необходимо прекратить прием лекарственного средства и обратиться к врачу.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Возможно взаимодействие с лекарственными средствами, которые метаболизируются ферментами цитохрома P450 (изоферменты CYP1A1, CYP1A2 и CYP1B1).

Лекарственные средства, содержащие аралию, могут понижать уровень сахара в крови. Возможны взаимодействия с противодиабетическими средствами.

Необходимо избегать одновременного применения других лекарственных средств, содержащих этиловый спирт.

Взаимодействия, связанные с наличием в составе этилового спирта:


-лекарственные средства, вызывающие дисульфирамоподобную реакцию (ощущение жара, покраснение кожных покровов, рвота, тахикардия) при совместном приеме с алкоголем:

дисульфирам, цефамандол, цефоперазон, латамоксеф, хлорамфеникол, хлопропамид, глибенкламид, глипизид, толбутамид и другие гипогликемические препараты, гризефульвин, метронидазол, орнидазол, тинидазол, кетоконазол, прокарбазин.

-лекарственные средства, угнетающие функции центральной нервной системы (барбитураты, транквилизаторы, противосудорожные препараты и т.п.).

Противопоказания

- гиперчувствительность;
- повышенная нервная возбудимость;
- бессонница;
- артериальная гипертензия;
- эпилепсия;
- гиперкинезы;
- детский возраст до 12 лет;
- острые инфекционные заболевания;
- беременность;
- период лактации.



Применение при беременности и лактации

Безопасность применения при беременности и лактации не установлена. В связи с отсутствием достаточных данных и содержанием этилового спирта применять во время беременности и лактации противопоказано.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами.

Лекарственное средство содержит этиловый спирт! В период лечения следует воздержаться от управления транспортными средствами и выполнения другой работы, которая требует повышенного внимания, быстрых психических и двигательных реакций.

Передозировка

Симптомы. Передозировка сопровождается усилением побочных эффектов лекарственного средства.

Лечение. В случае появления симптомов передозировки необходимо прекратить прием лекарственного средства и обратиться к врачу. При острой передозировке необходимо провести индукцию рвоты, промывание желудка. Симптоматическая терапия.

Меры предосторожности

С осторожностью следует принимать данное лекарственное средство людям, страдающим алкоголизмом, имеющим заболевания печени в анамнезе, черепно-мозговые травмы и другие заболевания головного мозга, сопровождающиеся снижением судорожного порога.

Не рекомендуется принимать в вечерние часы (во избежание нарушения ночного сна).

Если во время приема лекарственного средства симптомы заболевания сохраняются или происходит ухудшение состояния, необходимо обратиться к врачу.

Лекарственное средство содержит не менее 65 % этанола, то есть 0,616-0,921 г на разовую дозу 30 и 40 капель, что эквивалентно 15,6 мл и 20,8 мл пива или 6,5 мл и 8,7 мл вина на дозу.

Применение у детей. В связи с отсутствием данных по безопасности и эффективности применение у детей до 12 лет противопоказано.

Условия и срок хранения

Хранить в защищенном от света месте при температуре от 15 °С до 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте. Беречь от огня.

Срок годности – 3 года. Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска

Без рецепта.

Упаковка

30 мл во флаконах с листком-вкладышем в упаковке № 1.

50 мл во флаконах с листком-вкладышем в упаковке № 1.

Производитель

СОАО «Ферейн»,

Республика Беларусь, 220014, г. Минск, пер. С. Ковалевской, 52 а,

тел. + 375 17 213-16-37, +375 17 213-12-58; тел./факс + 375 17 222-92-18