

Листок-вкладыш – информация для потребителя

ТАУФОН, раствор (капли глазные) 40 мг/мл Действующее вещество: таурин

Перед применением препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.

- Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.
- Если у Вас возникли дополнительные вопросы, обратитесь к лечащему врачу.
- Препарат назначен именно Вам. Не передавайте его другим людям. Он может навредить им, даже если симптомы их заболевания совпадают с Вашими.
- Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.

Содержание листка-вкладыша

1. Что собой представляет препарат ТАУФОН и для чего его применяют.
2. О чем следует знать перед применением препарата ТАУФОН.
3. Применение препарата ТАУФОН.
4. Возможные нежелательные реакции.
5. Хранение препарата ТАУФОН.
6. Содержимое упаковки и прочие сведения.

1. Что собой представляет препарат ТАУФОН, и для чего его применяют

Препарат ТАУФОН стимулирует процессы восстановления при заболеваниях дистрофического характера и заболеваниях, которые сопровождаются резким нарушением метаболизма глазных тканей.

Глазные капли ТАУФОН применяют:

- для лечения дистрофических поражений роговицы и сетчатки глаза, включая патологическое изменение пигментного эпителия;
- для лечения катаракты (возрастная, диабетическая, травматическая, лучевая);
- как средство, стимулирующее восстановительные процессы при травмах роговицы;
- как дополнительное средство для лечения открытоугольной глаукомы (повышение внутриглазного давления).

2. О чем следует знать перед применением препарата ТАУФОН

Не применяйте данный препарат, если:

- у Вас повышенная чувствительность к действующему веществу или к какому-либо компоненту препарата (см. раздел б);

С осторожностью: при беременности, в период лактации, у детей до 18 лет.

Особые указания и меры предосторожности

Перед применением препарата ТАУФОН проконсультируйтесь с лечащим врачом, если:

- Вам необходимо одновременно использовать другие офтальмологические

лекарственные препараты (глазные капли и другие). Интервал между применением Тауфона и других препаратов должен составлять не менее 10-15 минут. Глазные мази следует применять последними.

Любые контактные линзы следует снимать перед закапыванием препарата и надевать не ранее, чем через 15 мин после него.

Дети

Следует применять с осторожностью у детей до 18 лет (в связи с отсутствием данных по эффективности и безопасности препарата).

Важная информация о некоторых составляющих лекарственного препарата

Метилпарагидроксибензоат, входящий в состав препарата, может вызывать аллергические реакции, в том числе отсроченные. В таких случаях следует прекратить применение препарата.

Другие препараты и препарат ТАУФОН

Сообщите лечащему врачу, если Вы принимаете, недавно принимали или собираетесь принимать любые другие препараты. Это относится к любым растительным препаратам или препаратам, которые Вы купили без назначения врача.

При совместном применении с глазными каплями β -адреноблокаторов (тимолола малеата или бутиламиногидроксипропоксифеноксиметил метилоксадиазола) усиливает снижение внутриглазного давления.

Беременность, грудное вскармливание и фертильность

Если Вы беременны или кормите грудью, думаете, что можете быть беременны, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Эффективность и безопасность применения глазных капель Тауфон в период беременности и кормления грудью не установлены. Назначение препарата в период беременности и грудного вскармливания возможно только в случае, если предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода или ребенка.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

Применение препарата не оказывает влияния на управление автотранспортом и занятия потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

3. Применение препарата ТАУФОН

Всегда применяйте этот препарат в полном соответствии с рекомендациями врача. При появлении сомнений, проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Препарат применяется местно в виде инстилляций.

Для лечения катаракты ТАУФОН закапывают по 1-2 капли 2-4 раза в день в течение 3 месяцев. Курс повторяют с месячным интервалом.

При травмах и дистрофических поражениях применяют в тех же дозах в течение 1 месяца.

Рекомендации по использованию флаконов в комплекте с крышкой-капельницей


Перед применением внимательно прочитайте этот раздел и последовательно выполните операции, представленные ниже в тексте и на рисунках 1-6.

1. Достать из упаковки флакон.
2. Если флакон укупорен колпачком алюминиевым: расположить ножницы под углом 45 градусов к крышке, подцепив её нижний край, движением, направленным вверх, снять алюминиевый колпачок вместе с резиновой крышкой (рис. А 1-2).
3. Если флакон укупорен колпачком алюминиевым с пластиковой накладкой: с усилием потянуть за пластиковую накладку со стороны надрезов, поднимая ее

вертикально, затем резко потянуть вниз вдоль флакона для нарушения целостности колпачка. Снять алюминиевый колпачок и резиновую пробку (рис. Б 1-2).

4. Достать капельницу из упаковки и плотно надеть ее на флакон (рис. 3).
5. Перевернуть флакон строго вертикально для удаления воздушного пузырька и подождать несколько секунд. В случае большого пузырька вернуть флакон в исходное положение, а затем медленно повторить действие, аккуратно постукая по дну флакона (рис. 4).
6. Закапать капли, нажимая указательным и большим пальцем на пипетку (рис. 5). Нельзя прикасаться пипеткой к глазу или другим поверхностям – это может привести к инфицированию раствора.
7. Перевернув флакон, закрыть пипетку специальной пробкой (рис. 6).

А



Б




Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

Рис. 4

Рис. 5

Рис. 6

Мойте руки перед использованием глазных капель. Не прикасайтесь капельницей к глазам или рукам.

После закапывания глазных капель рекомендуется закрыть глаза ватным тампоном. Не открывая глаз, прижмите внутренний угол глаза на 1-2 минуты.

Если Вы применили препарата ТАУФОН больше, чем следовало

Если Вы считаете, что закапали слишком большую дозу препарата, промойте глаза водой или физиологическим раствором и при необходимости обратитесь к врачу.

Если Вы забыли применить препарат ТАУФОН

Если Вы забыли закапать глазные капли, сделайте это при первой возможности. Не закапывайте двойную дозу, чтобы компенсировать пропущенную. Если Вы пропустили несколько доз, сообщите об этом врачу.

4. Возможные нежелательные реакции

Подобно всем лекарственным препаратам ТАУФОН может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

При применении препарата могут возникнуть аллергические реакции (в т.ч. замедленного типа), вызванные индивидуальной гиперчувствительностью к компонентам препарата.

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у Вас появились нежелательные реакции, сообщите об этом своему лечащему врачу. Это также относится к любым нежелательным реакциям, которые не указаны в данном листке-вкладыше.

Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях в информационную базу данных по нежелательным реакциям (действиям) на лекарственные препараты, включая сообщения о неэффективности лекарственных препаратов (УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении», www.rceth.by). Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

5. Хранение препарата ТАУФОН

Хранить в защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С.

Хранить в оригинальной упаковке.

Хранить в недоступном и невидимом для детей месте.

Вскрытый флакон хранить в защищенном от света месте при температуре от 15 °С до 25 °С в течение 4 недель.

Срок годности – 3 года.

Не использовать по истечении срока годности.

Не выливайте остатки препарата в канализацию. Уточните у работника аптеки, как избавиться от препаратов, которые больше не потребуются. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

6. Содержимое упаковки и прочие сведения

Состав на один флакон: действующее вещество – таурина (тауфона) – 200 мг или 400 мг.

Вспомогательные вещества: метилпарагидроксибензоат, вода для инъекций.

Внешний вид препарата ТАУФОН и содержимое упаковки

ТАУФОН, раствор (капли глазные) 40 мг/мл, – прозрачный бесцветный или слегка желтоватого цвета раствор.

По 5 мл во флаконы или по 10 мл во флаконы, укупоренные пробками резиновыми и обкатанные колпачками. Флакон вместе с крышечкой-капельницей и листком-вкладышем помещают в пачку.

Условия отпуска: без рецепта.

Держатель регистрационного удостоверения и производитель

РУП «Белмедпрепараты»,

Республика Беларусь, 220007, г. Минск, ул. Фабрициуса, 30,

тел./факс: (+375 17) 220 37 16

e-mail: medic@belmedpreparaty.com



Листок-вкладыш пересмотрен: