

**ИНСТРУКЦИЯ**  
(информация для пациентов)  
по применению лекарственного средства  
**ФИТОХОЛ ФОРТЕ**

**Торговое название:** Фитохол форте

**Международное непатентованное название:** -

**Описание:**

Твердые желатиновые капсулы № 0 цилиндрической формы с полусферическими концами темно-зеленого цвета. Содержимое капсул – порошок от светло-коричневого до коричневого цвета. Допускается наличие частиц в виде уплотненной порошкообразной массы.

**Состав:** 1 капсула содержит:

*Активное вещество:* артишока листьев экстракт сухой (соотношение лекарственного растительного сырья/ нативный экстракт: 15-30/1) – 300,0 мг.

*Вспомогательные вещества:* мальтодекстрин, кросповидон, магния стеарат, кремния диоксид коллоидный безводный, целлюлоза микрокристаллическая 101.

*Состав оболочки желатиновой капсулы:*

Желатин, вода очищенная, хинолиновый желтый Е-104, титана диоксид Е-171, патентованный голубой V Е-131, бриллиантовый черный РN Е-151, азорубин Е-122.

**Форма выпуска:** капсулы

**Фармакотерапевтическая группа:** прочие средства, применяемые при заболеваниях желчевыводящих путей.

**Код АТХ:** А05АХ

**Фармакологические свойства**

Фармакологический эффект препарата обусловлен комплексом входящих в состав листьев артишока полевого биологически активных веществ. Препарат обладает желчегонным действием и увеличивает диурез.

**Показания к применению**

Применяется для облегчения функциональных нарушений пищеварения и улучшения выделительной функции почек.

**Способ применения и дозы**


Продолжительность курса лечения составляет 2-3 недели. При необходимости возможно проведение повторных курсов по согласованию с врачом.

Внутрь взрослым по 1 капсуле 1–2 раза в день до еды или при возникновении функциональных нарушений, запивая 0,5-1 стаканом воды.

**Побочное действие**

Сообщалось о легкой диарее со спазмами в животе, таких жалобах как тошнота и изжога. Возможны аллергические реакции.

В случае возникновения нежелательных реакций, в том числе не указанных в данной инструкции, необходимо прекратить прием лекарственного средства и обратиться к врачу.



#### **Противопоказания**

- повышенная чувствительность к компонентам препарата;
- повышенная чувствительность к растениям семейства Сложноцветных;
- желчнокаменная болезнь;
- непроходимость желчных путей;
- острые заболевания печени, почек, желче- и мочевыводящих путей;
- тяжелая гепатоцеллюлярная недостаточность;
- детский возраст.

#### **Передозировка**

Информация о случаях передозировки отсутствует.

Возможно усиление побочных эффектов.

Лечение: отмена препарата, симптоматическая терапия.

#### **Меры предосторожности**

Не следует назначать данное лекарственное средство при непроходимости желчевыводящих путей и тяжелой гепатоцеллюлярной недостаточности.

В случае развития диареи или болей в животе прием лекарственного средства должен быть прекращен.

Препарат содержит в составе вспомогательных компонентов красители азорубин (E-122) и бриллиантовый черный PN (E-151), которые могут вызывать аллергические реакции.

#### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами**

Информация о взаимодействиях отсутствует.

#### **Применение во время беременности и лактации**

Соответствующие исследования тератогенности у животных не проводились.

Строго контролируемых исследований безопасности применения экстракта артишока у беременных женщин не проводилось.

При назначении в рекомендуемых дозах клинические данные о фетотоксических или эмбриотоксических эффектах не обнаружены. Тем не менее, данных о случаях приема лекарственного средства во время беременности недостаточно для исключения возможного риска.

По соображениям безопасности экстракт артишока не рекомендуется применять при беременности, если это не является строго необходимым, решение о возможности приема и режиме дозирования препарата принимается врачом после тщательной оценки соотношения польза/риск.

#### **Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами**

Информация отсутствует.

#### **Условия хранения**


В защищенном от влаги месте при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

#### **Срок годности**

2 года.

Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.



### Упаковка

По 10 капсул в контурной ячейковой упаковке из ПВХ/ПВДХ пленки и фольги алюминиевой. По 3 или по 6 контурных упаковок вместе с инструкцией по медицинскому применению помещают в пачку из картона.

### Отпуск из аптек

Без рецепта врача.

### Производитель

Иностранное производственное унитарное предприятие «Мед-интерпласт», 222603, Минская область, г. Несвиж, ул. Ленинская, 115, ком. 204, Республика Беларусь.