

ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ**Глауwent 40 мг таблетки, покрытые оболочкой****Glaudent® 40 mg coated tablets**


глауцина гидробромид (glaucine hydrobromide)

Международное непатентованное название (МНН): glaucine**Прочтите внимательно весь листок-вкладыш, так как он содержит важную для Вас информацию**

- Сохраните данный листок-вкладыш. У Вас может появиться необходимость прочитать его снова.
- Если у Вас появятся любые дополнительные вопросы, спросите Вашего врача или фармацевта.
- Данный лекарственный препарат назначен лично Вам. Не рекомендуем применять его другим лицам. Препарат может навредить им независимо от того, что у них такие же симптомы, как и у Вас.
- При появлении перечисленных побочных реакций или реакции, не упомянутой в листке-вкладыше, необходимо обратиться к врачу.

В этом листке-вкладыше:

1. Что представляет собой Глауwent и для чего используется
2. Перед тем, как применять Глауwent
3. Как применять Глауwent
4. Возможные побочные действия
5. Условия хранения
6. Дополнительная информация

**1. ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ГЛАУWENT И ДЛЯ ЧЕГО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ**

Глауwent - противокашлевое лекарственное средство центрального действия. Оно содержит алкалоид глауцин, выделенный из растения *Glaucium flavum*, который подавляет центр кашля. Глауwent применяют при сухом кашле различного происхождения: инфекционно-воспалительные заболевания верхних дыхательных путей; острый и хронический бронхит, инфекционные заболевания (грипп).

2. ПЕРЕД ТЕМ, КАК ПРИМЕНЯТЬ ГЛАУWENT**Не применяйте Глауwent**

- если у Вас аллергия (гиперчувствительность) к активному веществу - глауцину гидробромиду или к любому из вспомогательных веществ;
- если у Вас пониженное кровяное давление;
- если у Вас острый инфаркт миокарда;
- у детей.

Соблюдайте особую осторожность при применении Глауwent

- Лекарственное средство следует применять с осторожностью у больных с лабильным кровяным давлением из-за угрозы коллапса.

- Глауwent не следует применять при продуктивном кашле с выделением мокроты, так как существует возможность закупорки бронхов в результате задержки бронхиальных секретов.

Применение других лекарственных средств

Проинформируйте Вашего врача или фармацевта, если Вы применяете или недавно принимали другие лекарственные средства, включительно и отпускаемые без рецепта.

Глауwent таблетки можно применять в комбинации с антибиотиками, химиотерапевтическими средствами и др.

Глауwent таблетки не следует применять одновременно с лекарственными препаратами, угнетающими кашлевой акт, как центрального (кодеин, кодтерпин), так и периферического механизма действия (эксангит, либексин). Не оправдана комбинация с препаратами, вызывающими снижение бронхиальной секреции (например, производные атропина).

Глауwent можно применять одновременно с бронходилататорами, сердечно-сосудистыми препаратами (диуретики, ингибиторы АПФ). Активное вещество эффективно комбинируется с эфедрином, лимонной кислотой, маслом базилика в комбинированных препаратах в форме сиропов, предлагаемых для облегчения кашля.

Беременность и грудное вскармливание

Обратитесь за советом к Вашему врачу или фармацевту перед использованием любого лекарственного средства.

Глауwent таблетки следует применять с осторожностью беременным женщинам и кормящим матерям, оценивая соотношение польза/риск.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

Глауwent следует применять осторожно при вождении транспортных средств и при работе с механизмами из-за возможного появления головокружения, головной боли, сонливости, слабости и быстрой утомляемости.

Важная информация о некоторых ингредиентах Глауwent

В состав лекарственного средства входит пшеничный крахмал, который приемлем для лиц с целиакией. Пациентам, с аллергией на пшеницу (отличающейся от целиакии), не следует применять это лекарственное средство.

В состав лекарственного средства включена сахароза. Если врач уведомлял, что у Вас непереносимость некоторых сахаров, перед тем, как применять это лекарственное средство, проконсультируйтесь у Вашего врача.

В состав лекарственного средства входит краситель E110, который может вызвать аллергические реакции.

3. КАК ПРИМЕНЯТЬ ГЛАУWENT

СОГЛАСОВАНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Приказ Министерства здравоохранения
Республики Беларусь

Принимают Глауwent таблетки, соблюдая в точности назначения лечащего врача. Если Вы в чем-то не уверены, спросите Вашего врача или фармацевта.

Таблетки применяют внутрь, рекомендуется после еды.

Взрослые

Разовая доза для взрослых составляет 40 мг (1 таблетка), 2-3 раза в сутки. При более тяжелых случаях однократный прием может составлять 80 мг (2 таблетки). Максимальная суточная доза не должна превышать 200 мг (5 таблеток).

Пациенты с нарушениями функции печени и почек и пациенты пожилого возраста

Для пациентов с заболеваниями почек и печени и пациентов пожилого возраста необходимо уменьшить дозу препарата или увеличить интервал между приемами.

Продолжительность лечения – не более 5-ти дней.

Если Вы приняли дозу Глауwent, превышающую необходимую

При применении препарата в более высоких дозах могут наблюдаться следующие симптомы: головокружение, головная боль, сонливость, слабость и быстрая утомляемость, тошнота, рвота, понижение артериального давления.

При передозировке применяют как рутинные меры для быстрого выведения лекарственного средства из организма (промывание желудка, применение активированного угля, инфузия водно-солевых растворов), так и средства, влияющие на симптомы передозировки.

Если Вы пропустили принять дозу Глауwent

Если Вы пропустили одну дозу, примите ее скорее, насколько это возможно. Если приблизилось время для принятия следующей дозы, примите ее как обычно.

Не применяйте двойную дозу для компенсации пропущенной. Продолжайте применять лекарственное средство, соблюдая указания в этом листке-вкладыше.

Если у Вас возникают любые дополнительные вопросы, связанные с применением этого лекарственного средства, обратитесь к Вашему врачу или фармацевту.

4. ВОЗМОЖНЫЕ ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Глауwent характеризуется хорошей переносимостью. Подобно всем лекарственным препаратам Глауwent может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

Зарегистрированы следующие нежелательные реакции:

Редко (могут возникать не более чем у 1 человека из 1 000): при применении однократной дозы, превышающей 80 мг, можно наблюдать головокружение, головную боль, сонливость, слабость и быструю утомляемость, тошноту и рвоту, понижение кровяного давления.

Частота неизвестна (исходя из имеющихся данных, частоту возникновения определить невозможно): аллергические реакции, характеризующиеся зудом или кожными высыпаниями.

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях в информационную базу данных по нежелательным реакциям (действиям) на лекарственные препараты, включая сообщения о неэффективности лекарственных препаратов. Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

СОГЛАСОВАНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Приказ Министерства здравоохранения
Республики Беларусь

5. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить при температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.

Лекарственные средства не следует выбрасывать в канализацию или в контейнер для бытовых отходов. Поинтересуйтесь у Вашего фармацевта, как утилизировать неиспользуемые Вами лекарственные средства. Эти меры будут способствовать охране окружающей среды.

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Что содержит Глаувент

1 таблетка, покрытая оболочкой, содержит:

Состав ядра:

- Активное вещество: глауцина гидробромид - 40 мг;
- Вспомогательные вещества: крахмал пшеничный, сахароза, желатин, целлюлоза микрокристаллическая (тип 101), тальк, стеариновая кислота.

Состав оболочки: желатин, акации камедь, титана диоксид (E171), сахароза, тальк, макрогол 6000, глицерол, опалюкс оранжевый (сахароза, титана диоксид (E171), краситель желтый FCF (E110), тальк, железа оксид желтый (E172), повидон (E1201), натрия бензоат (E211), индиго кармин (E132)).

Описание таблеток Глаувент и что содержится в упаковке

Круглые, двояковыпуклые таблетки, покрытые оболочкой, с глянцевой поверхностью оранжевого цвета.

20 таблеток, покрытых оболочкой, в блистере из твердой бесцветной прозрачной ПВХ пленки и алюминиевой фольги. По 1 блистеру в картонной пачке вместе с листком-вкладышем.

Срок годности

3 года. Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Отпуск из аптек

По рецепту.

Производитель/Держатель регистрационного удостоверения

АО СОФАРМА

ул. Илиенское шоссе 16, 1220 София, Болгария.

Организация, представляющая интересы производителя в РБ:

ОДО "Везуна", г. Минск, 220068, ул. Л. Карастояновой, д. 32, пом. 13,

тел.+375 17 290 13 32, +375 17 288 59 31

Дата последнего пересмотра листка-вкладыша: Май 2018.

