


НД РБ

1602Б-2016



Инструкция по медицинскому применению
ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ - информация для пациента

Успокоительные капли, капли для приема внутрь

Перед применением данного лекарственного препарата полностью прочитайте этот листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.

Сохраните этот листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.

Если у Вас возникли дополнительные вопросы, обратитесь к лечащему врачу.

Этот лекарственный препарат назначен именно Вам. Не передавайте его другим. Он может навредить этим людям, даже если симптомы их заболевания совпадают с Вашими.

Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.

В ДАННОМ ЛИСТКЕ-ВКЛАДЫШЕ СОДЕРЖИТСЯ СЛЕДУЮЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1. Что из себя представляет лекарственный препарат Успокоительные капли и для чего его применяют.
2. О чем следует знать перед применением лекарственного препарата Успокоительные капли.
3. Применение лекарственного препарата Успокоительные капли.
4. Возможные нежелательные реакции.
5. Хранение лекарственного препарата Успокоительные капли.
6. Содержимое упаковки и прочие сведения.

1. ЧТО ИЗ СЕБЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ УСПОКОИТЕЛЬНЫЕ КАПЛИ И ДЛЯ ЧЕГО ЕГО ПРИМЕНЯЮТ

Лекарственный препарат содержит настойку валерианы, настойку боярышника, настойку пустырника. Относится к группе снотворные и седативные средства.

Применяется в комплексной терапии функциональных нарушений центральной нервной системы (нарушения сна и неврастения). В комплексной терапии функциональных нарушений сердечно-сосудистой деятельности.

Применение по указанным назначениям основывается только на опыте продолжительного применения.

2. О ЧЕМ СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА УСПОКОИТЕЛЬНЫЕ КАПЛИ

2.1 Противопоказания

Перед применением лекарственного препарата проконсультируйтесь с врачом. Не принимайте Успокоительные капли, если у Вас повышенная чувствительность к компонентам лекарственного препарата; артериальная гипотензия, брадикардия; язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, эрозивный гастрит в фазе обострения.

2.2. Особые указания и меры предосторожности

Всегда принимайте лекарственный препарат в соответствии с листком-вкладышем или с рекомендациями врача.


Перед приёмом лекарственного препарата необходима консультация врача. Во время лечения необходим контроль артериального давления и электрокардиограммы (ЭКГ).

Если во время лечения симптомы сохраняются или происходит ухудшение состояния, развиваются отёки нижних конечностей, необходимо обратиться к врачу. Необходима немедленная медицинская помощь при возникновении боли в области сердца с иррадиацией в руку, верхнюю часть живота, шею, или в случае развития дыхательной недостаточности (например, одышка).

Из-за постепенного развития эффекта лекарственный препарат не рекомендуется применять в случаях экстренной необходимости уменьшения симптомов психического возбуждения и нарушения сна.

2.3. Дети

НД РБ
16025-20



Лекарственный препарат противопоказан детям и подросткам до 18 лет.

2.4. Взаимодействия с другими лекарственными препаратами

Сообщите лечащему врачу или работнику аптеки о том, что Вы принимаете, недавно принимали или можете начать принимать какие-либо другие препараты.

Не рекомендуется одновременное применение с антиаритмиками III класса, с цизапридом. Лекарственный препарат может усилить действие седативных, снотворных, обезболивающих средств и других лекарственных средств, угнетающих центральную нервную систему. Комбинация лекарственного препарата с синтетическими седативными средствами требует медицинского наблюдения.

В связи с тем, что лекарственный препарат содержит этиловый спирт, рекомендуется избегать одновременного приема такими препаратами, как дисульфирам, цефамандол, цефоперазон, латамоксеф (антибактериальные средства - цефалоспорины), хлорамфеникол, хлорпропамид, глибенкламид, глипизид, толбутамид (антидиабетические средства, производные сульфонилмочевины), гризеофульвин (противогрибковое средство), производные нитро-5-имидазола (метронидазол, орнидазол, тинидазол), кетоконазол, прокарбазин (цитостатическое средство)).

Необходимо избегать одновременного применения других лекарственных препаратов, содержащих этиловый спирт.

2.5. Применение беременными и кормящими грудью женщинами, сведения о фертильности

В связи с отсутствием достаточных данных и содержанием этилового спирта применять во время беременности и лактации противопоказано.

2.6. Влияние на способность управлять транспортными средствами или работать с механизмами

В период лечения необходимо воздержаться от вождения автотранспорта и занятия другими потенциально опасными видами деятельности, тре-

бующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

2.7. Особые указания, касающиеся вспомогательных веществ

Содержит этиловый спирт. Необходимо избегать одновременного применения других лекарственных препаратов, содержащих этиловый спирт.

2.8. Передозировка

Симптомы: хроническая передозировка вызывает чувство угнетённости, головную боль, сонливость, дискомфорт со стороны желудочно-кишечного тракта, тошноту, снижение работоспособности, снижение артериального давления, нарушение сердечной деятельности. Острая передозировка может вызвать алкогольную интоксикацию, появление острых болей в животе, чувства стеснения в груди, головокружения, тремора рук и расширения зрачков.

Лечение:

В случае появления симптомов передозировки необходимо прекратить приём лекарственного средства и обратиться к врачу. При острой передозировке необходимо вызвать рвоту и немедленно обратиться к врачу.

3. ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА УСПОКОИТЕЛЬНЫЕ КАПЛИ

Внутрь. Взрослым по 20-30 капель 2-3 раза в сутки до еды, в небольшом количестве ($\frac{1}{4}$ стакана) кипячёной воды комнатной температуры.

Длительность курса лечения определяется врачом с учётом особенностей заболевания, достигнутого эффекта и переносимости лекарственного средства.

Перед употреблением взбалтывать.

Если Вы пропустили прием лекарственного препарата, примите его как только вспомните и продолжайте лечение в прежнем режиме. Если Вы вспомнили об этом только тогда, когда нужно принимать следующую дозу ни в коем случае не принимайте двойную дозу. Если Вы случайно приняли двойную дозу, следите за своим самочувствием, при необходимости обратитесь к врачу.

4. ВОЗМОЖНЫЕ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ РЕАКЦИИ

Возможно развитие аллергических реакций (кожная сыпь, зуд, покраснения, отек кожи); возникновение головной боли, общей слабости, головокружения, снижения работоспособности, сонливости, раздражительности, тревожности, желудочно-кишечных расстройств (изжога, тошнота, отрыжка, боли в животе), снижение артериального давления. Большие дозы лекарственного средства могут привести к снижению или нарушению частоты сердечных сокращений, а также к запору.

В случае возникновения нежелательных реакций, в том числе не указанных в листке-вкладыше, необходимо обратиться к врачу!

5. ХРАНЕНИЕ ПРЕПАРАТА УСПОКОИТЕЛЬНЫЕ КАПЛИ

Храните препарат в недоступном для ребенка месте, так чтобы ребенок не мог его увидеть.

5.1. Дата истечения срока годности

Не применяйте препарат после истечения срока годности, указанного на пачке.

Датой истечения срока годности является последний день указанного месяца.

Срок годности препарата – 3 года.

5.2. Условия хранения

В защищенном от света месте, при температуре не выше 25 °С.

6. СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ И ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ


6.1. Препарат Успокоительные капли содержит

Действующими веществами являются валерианы настойка, изготовленная из корневищ с корнями измельченными валерианы, экстрагент – этиловый спирт 70 % (1:5) – 17,0 мл; боярышника настойка, изготовленная из плодов боярышника, экстрагент – этиловый спирт 70 % (1:10) – 16,5 мл; пустырника настойка, изготовленная из травы пустырника, экстрагент – этиловый спирт 70 % (1:5) – 16,5 мл.

Содержит не менее 64 % этилового спирта.

6.2. Содержимое упаковки

НД РБ
1602Б-2016



50 мл во флаконах из темного стекла, укупоренных пробками капельницами и крышками навинчиваемыми. Каждый флакон вместе с листком-вкладышем по медицинскому применению помещают в пачку из картона.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта

Держатель регистрационного удостоверения и производитель

Открытое акционерное общество «Борисовский завод медицинских препаратов», Республика Беларусь, Минская обл., г. Борисов, 222518, ул. Чапаева, 64.

Тел/факс +375(177)735612, 731156.

Адрес электронной почты: marcet@borimed.com

За любой информацией о препарате следует обращаться к держателю регистрационного удостоверения:

Республика Беларусь, Открытое акционерное общество «Борисовский завод медицинских препаратов», Минская обл., г. Борисов, 222518, ул. Чапаева, 64.

Тел/факс +375(177)735612, 731156.

Данный листок-вкладыш пересмотрен 02.2022