

## ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА


## АФЛУБИН® (AFLUBIN®)

Гомеопатическое лекарственное средство.

Перед применением проконсультируйтесь с врачом, специализирующимся на гомеопатическом методе лечения.

**Торговое название:** Афлубин®

**Лекарственная форма:** капли для приема внутрь.



**Состав:** в 1 мл содержится:

*активные вещества:* Горечавка желтая (Gentiana) D1 0,01 мл, Аконит аптечный (Aconitum) D6 0,1 мл, Бриония двудомная (Bryonia) D6 0,1 мл, Железа фосфат (Ferrum phosphoricum) D12 0,1 мл, Молочная кислота (Acidum sarcolacticum) D12 0,1 мл,

*вспомогательные вещества:* содержит этанола не менее 41,5%.

(1 мл = приблизительно 25 капель)

**Описание:** прозрачная от бесцветного до слегка желтоватого цвета жидкость без специфического запаха.

**Фармакотерапевтическая группа:** прочие лекарственные средства.

**МНН:** отсутствует.

**Код АТХ:** V03AX

#### Фармакологические свойства

Афлубин® представляет собой гомеопатическое лекарственное средство, действие которого обусловлено компонентами, входящими в его состав.

Гомеопатический метод лечения существенно отличается от традиционной медицины.

Определение дозоспецифических эффектов, фармакодинамических или фармакокинетических параметров гомеопатических средств невозможно.

**Область применения:** Гомеопатическое лекарственное средство без утвержденных терапевтических (медицинских) показаний к применению. Применяется в комплексной терапии острых респираторных заболеваний. Применение по указанному назначению основывается только на опыте применения.

В случае выраженных симптомов необходимо назначение соответствующей клинически обоснованной терапии.

**Противопоказания:** повышенная чувствительность к компонентам препарата, дети до 2 лет, период беременности и лактации.

**Способ применения и дозы:** Афлубин® следует принимать за 30 минут до или через 1 час после приема пищи. Гомеопатическое средство может быть принято в неразбавленном виде или разведенным в небольшом количестве воды (1 столовая ложка), при применении у детей гомеопатическое средство необходимо развести водой.

Возраст	Доза (разовая)	Способ применения

1 - 2 день острого респираторного заболевания		
Взрослые и дети старше 12 лет	10 капель	Каждые 30 - 60 минут (максимально 8 раз в день). После уменьшения выраженности симптомов частоту приема необходимо уменьшить до 3 раз в день.
Дети старше 2 лет	5 капель	
Продолжение лечения (3 – 7 день) острого респираторного заболевания		
Взрослые и дети старше 12 лет	10 капель	3 раза в день
Дети старше 2 лет	5 капель	

**Длительность курса лечения**

Продолжительность применения лекарственного средства определяется врачом.

**Применение у детей:** применение гомеопатического средства Афлубин® у детей до 2 лет противопоказано в связи с отсутствием достаточных данных. Применение у детей старше 2 лет возможно только после консультации врача.

Если во время применения препарата симптомы сохраняются или происходит ухудшение состояния, необходимо обратиться к врачу.

**Побочное действие:** Возможно развитие аллергических реакций.

В случае возникновения побочных реакций, в том числе не указанных в данной инструкции, следует прекратить прием лекарственного средства и обратиться к врачу.

**Передозировка:** случаи передозировки до настоящего времени не были зарегистрированы.

Лекарственное средство содержит не менее 41,5% этилового спирта. В случае передозировки необходимо обратиться к врачу. Лечение симптоматическое.

**Взаимодействие с другими лекарственными препаратами:** клинически значимое взаимодействие препарата с другими лекарственными средствами не установлено. В случае одновременного приема других лекарственных средств необходимо проконсультироваться с врачом.

**Беременность и кормление грудью:** данные о применении во время беременности и лактации отсутствуют. В связи с отсутствием достаточных данных и содержанием этилового спирта гомеопатическое средство противопоказано принимать во время беременности и лактации.

**Особые указания:** прием гомеопатического лекарственного средства Афлубин® не заменяет профилактической вакцинации против гриппа.

В разовой дозе препарата Афлубин® (5/10 капель) содержится 80/160 мг этилового спирта, поэтому данное средство не следует принимать лицам, страдающим от алкогольной зависимости, эпилепсии, пациентам с заболеваниями печени, головного мозга, беременным и кормящим грудью женщинам, детям до 2 лет. Содержание этилового спирта следует принимать во внимание при назначении лекарственного средства детям старше 2 лет.

**СОГЛАСОВАНО**  
МИНИСТЕРСТВОм ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
Приказ Министерства здравоохранения  
Республики Беларусь

Если во время применения препарата симптомы сохраняются или происходит ухудшение состояния, необходимо обратиться к врачу.

В начале лечения гомеопатическими лекарственными средствами возможно временное ухудшение симптомов заболевания. В случае ухудшения состояния прием гомеопатического лекарственного средства следует прекратить и обратиться к врачу.

Действие гомеопатического средства может уменьшиться при курении или под влиянием других вредных привычек (например, употребление алкоголя).

В случае продолжительного приема гомеопатического средства необходимо наблюдение врача, специализирующегося на гомеопатическом методе лечения, поскольку возможно возникновение нежелательных симптомов.

*Применение у детей:* применение гомеопатического средства Афлубин® у детей до 2 лет противопоказано в связи с отсутствием достаточных данных. Применение у детей старше 2 лет возможно только после консультации врача.

*Влияние лекарственного средства на вождение автомобиля и работу с механизмами:* лекарственное средство содержит этиловый спирт. Во время приема лекарственного средства не рекомендовано вождение автомобиля и работа с движущимися механизмами.

**Форма выпуска:** капли для приема внутрь по 20 мл и 50 мл во флаконах коричневого стекла с навинчивающейся крышкой из пропилена, с капельницей из полиэтилена. Каждый флакон вместе с инструкцией по применению помещают в картонную пачку.

**Условия хранения:** хранить в защищенном от света, недоступном для детей месте, при температуре не выше 30°C.

**Срок хранения:** 5 лет.

Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

**Условия отпуска из аптек:** без рецепта.

**Производитель:**

«Рихард Биттнер АГ», Райснерштрассе 55-57, А-1030, Вена, Австрия.

