



ВКЛАДЫШ ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА

РЕМЕНС® (REMENS®)

Гомеопатическое лекарственное средство.

Перед применением проконсультируйтесь с врачом, специализирующимся на гомеопатическом методе лечения.

Торговое название препарата: Ременс®

Лекарственная форма: капли для приема внутрь.

Состав: в 1 мл содержится:

активные вещества: Цимицифуга кистевидная (*Cimicifuga racemosa*) D1 0,05 мл, Сангвинария канадская (*Sanguinaria canadensis*) D6 0,1 мл, Пилокарпус (*Jaborandi*) D6 0,1 мл, Секрет железы каракатицы (*Sepia officinalis*) D12 0,1 мл, Яд змеи сурукуку (*Lachesis mutus*) D12 0,1 мл;

вспомогательные вещества: содержит этанола не менее 41,5 %.

(1 мл = приблизительно 25 капель).

Описание лекарственной формы: прозрачная слегка желтоватого цвета жидкость без специфического запаха.

Фармакотерапевтическая группа: Прочие лекарственные средства.

МНН: отсутствует.

Код АТХ: V03AX

Фармакологические свойства

Ременс® представляет собой гомеопатическое лекарственное средство, действие которого обусловлено компонентами, входящими в его состав.

Гомеопатический метод лечения существенно отличается от традиционной медицины. Определение дозоспецифических эффектов, фармакодинамических или фармакокинетических параметров гомеопатических средств невозможно.

Область применения: Гомеопатическое лекарственное средство без утвержденных терапевтических (медицинских) показаний к применению. Применяется в комплексной терапии для уменьшения выраженности симптомов нарушений менструального цикла, дисменореи, предменструального синдрома, климактерического синдрома.

Применение по указанным назначениям основывается только на опыте применения.

В случае выраженных симптомов необходимо назначение соответствующей клинически обоснованной терапии.

Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата, детский возраст до 18 лет, беременность и период лактации.

Способ применения и дозы: Ременс® следует принимать за 30 минут до или через 1 час после приема пищи. Гомеопатическое средство может быть принято в неразбавленном виде или разведенном в небольшом количестве воды (1 столовая ложка).

В начале курса лечения гомеопатическое средство назначают по 10 капель каждые полчаса – час (не более 8 раз в сутки). После уменьшения выраженности симптомов частоту приема необходимо снизить до 3 раз в сутки.

Длительность курса лечения: продолжительность приема лекарственного средства определяется врачом.

Если во время приема гомеопатического средства симптомы сохраняются или происходит ухудшение состояния, необходимо обратиться к врачу.

Применение у детей: Применение гомеопатического лекарственного средства Ременс® у детей до 18 лет противопоказано.

Гомеопатическое средство Ременс® не предназначено для применения у мужчин.

Побочное действие: возможно развитие аллергических реакций, диспепсических расстройств.

Прием препаратов, содержащих цимицифугу, может сопровождаться печеночной токсичностью (включая гепатит, желтуху, нарушения функции печени). Частота не известна. В случае возникновения побочных реакций, в том числе не указанных в данной инструкции следует прекратить применение лекарственного средства и обратиться к врачу.

Передозировка: лекарственное средство содержит не менее 41,5% этилового спирта. В случае передозировки необходимо обратиться к врачу. Лечение симптоматическое.

Особые указания: пациенткам, имеющим в анамнезе заболевания печени, следует с осторожностью назначать гомеопатическое средство Ременс®. Если у пациентки развиваются признаки и симптомы, указывающие на поражение печени (усталость, снижение аппетита, пожелтение кожи и глаз, боли в верхней части живота, тошнота, рвота, потемнение мочи), следует прекратить прием лекарственного средства и немедленно обратиться к врачу.

Гомеопатическое средство Ременс® не следует принимать вместе с эстрогенами, если это не назначено врачом.

Пациенткам, которые прошли или проходят лечение (курс лечения) против рака молочной железы или других гормоно-зависимых опухолей, не следует принимать гомеопатическое средство Ременс®.

При появлении нарушений цикла или повторных менструаций, а также новых и неясных симптомов следует обратиться к врачу, так как это может свидетельствовать о заболевании, требующем медицинского вмешательства.

Если наблюдается ухудшение симптоматики во время приема гомеопатического средства необходимо проконсультироваться с врачом.

В начале лечения гомеопатическими лекарственными средствами возможно временное ухудшение симптомов заболевания. В случае ухудшения состояния прием гомеопатического средства следует прекратить и обратиться к врачу.

Действие гомеопатического средства может уменьшиться при курении или под влиянием других вредных привычек (например, употребление алкоголя).

В случае продолжительного приема гомеопатического средства необходимо наблюдение врача, специализирующегося на гомеопатическом методе лечения, поскольку возможно возникновение нежелательных симптомов.

В разовой дозе гомеопатического средства Ременс® (10 капель) содержится 160 мг этилового спирта, поэтому данное средство не следует принимать лицам, страдающим от алкогольной зависимости, эпилепсии, пациентам с заболеваниями печени, головного мозга, беременным и кормящим грудью женщинам, детям.

Применение у детей: применение гомеопатического лекарственного средства Ременс® у детей до 18 лет противопоказано.

Гомеопатическое средство Ременс® не предназначено для применения у мужчин.

Прием препарата во время беременности и в период лактации: препарат противопоказан женщинам во время беременности и в период лактации.

Женщинам детородного возраста следует применять эффективные методы контрацепции во время приема гомеопатического средства Ременс®.

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами: в случае одновременного приема других лекарственных средств необходимо проконсультироваться с врачом.

Влияние лекарственного средства на вождение автомобиля и работу с механизмами: лекарственное средство содержит этиловый спирт. Во время приема лекарственного средства не рекомендовано вождение автомобиля и работа с движущимися механизмами.

Форма выпуска: капли для приема внутрь по 50 мл во флаконах коричневого стекла с навинчивающейся крышкой из пропилена, с капельницей из полиэтилена. Каждый флакон вместе с инструкцией по применению помещают в картонную пачку.

Условия хранения: хранить в защищенном от света, недоступном для детей месте, при температуре не выше 30°C.

Срок хранения: 5 лет.

Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска из аптек: без рецепта.

Производитель: «Рихард Биттнер АГ», Райснерштрассе 55-57, А-1030, Вена, Австрия.