

ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению
(информация для пациентов)



ДОКТОР МОМ® РАСТИТЕЛЬНЫЕ ПАСТИЛКИ

Торговое название: ДОКТОР МОМ® РАСТИТЕЛЬНЫЕ ПАСТИЛКИ

Международное непатентованное название: отсутствует

Лекарственная форма

Пастилки (со вкусом апельсина, со вкусом лимона, со вкусом малины, со вкусом клубники, со вкусом ананаса, со вкусом фруктов, со вкусом ягод)

Состав (на 1 пастилку)

Действующие вещества:

сухие экстракты (экстрагент – вода), выделенные из:

Солодки голой корней (<i>Glycyrrhiza glabra</i>) (5:1)	15,0 мг
Имбиря лекарственного корневищ (<i>Zingiber officinale</i>) (10:1)	10,0 мг
Эмблики лекарственной плодов (<i>Emblica officinalis</i>) (4:1).....	10,0 мг
Левоментол.....	7,0 мг

Вспомогательные вещества:

- для пастилок со вкусом апельсина: сахароза, декстроза жидкая, глицерол (E422), лимонной кислоты моногидрат (E330), ароматизатор апельсиновый, ароматизатор мятный (мятная эссенция), краситель солнечный закат желтый (E110);
- для пастилок со вкусом лимона: сахароза, декстроза жидкая, глицерол (E422), лимонной кислоты моногидрат (E330), лимона масло, ароматизатор мятный (мятная эссенция), краситель хинолиновый желтый (E104);
- для пастилок со вкусом малины: сахароза, декстроза жидкая, глицерол (E422), ароматизатор малиновый, краситель азорубин (E122);
- для пастилок со вкусом клубники: сахароза, декстроза жидкая, глицерол (E422), лимонной кислоты моногидрат (E330), ароматизатор клубничный, краситель пунцовый (Понсо 4R)(E124);
- для пастилок со вкусом ананаса: сахароза, декстроза жидкая, глицерол (E422), лимонной кислоты моногидрат (E330), ароматизатор мятный (мятная эссенция), ароматизатор ананасовый, краситель BQ Supra (смесь красителей хинолинового желтого (E104) и бриллиантового голубого (E133));
- для пастилок со вкусом фруктов: сахароза, декстроза жидкая, глицерол (E422), лимонной кислоты моногидрат (E330), ароматизатор фруктовый, краситель виноградный (смесь красителей азорубина (E122) и бриллиантового голубого (E133));
- для пастилок со вкусом ягод: сахароза, декстроза жидкая, глицерол (E422), лимонной кислоты моногидрат (E330), ароматизатор ягодный, красители: азорубин (E122) и бриллиантовый голубой (E133).

Описание

- пастилки со вкусом апельсина: круглые двояковыпуклые пастилки оранжевого цвета. Допускается наличие пузырьков воздуха в пастилках и неровности краев;
- пастилки со вкусом лимона: круглые двояковыпуклые пастилки от зеленовато-желтого до желтого цвета. Допускается наличие пузырьков воздуха в пастилках и неровности краев;

4055 - 2017

- пастилки со вкусом малины: круглые двояковыпуклые таблетки от красного до темно-красного цвета. Допускается наличие пузырьков воздуха в таблетках и неровности краев;
- пастилки со вкусом клубники: круглые двояковыпуклые таблетки от красного до вишнево-красного цвета. Допускается наличие пузырьков воздуха в таблетках и неровности краев;
- пастилки со вкусом ананаса: круглые двояковыпуклые таблетки зеленого цвета. Допускается наличие пузырьков воздуха в таблетках и неровности краев;
- пастилки со вкусом фруктов: круглые двояковыпуклые таблетки от красновато-фиолетового до фиолетового цвета. Допускается наличие пузырьков воздуха в таблетках и неровности краев;
- пастилки со вкусом ягод: круглые двояковыпуклые таблетки от розовато-коричневого до коричневого цвета. Допускается наличие пузырьков воздуха в таблетках и неровности краев.

Фармакотерапевтическая группа

Прочие лекарственные средства, применяемые для лечения простудных заболеваний.

Код АТХ [R05X]

Фармакологические свойства

Фармакодинамика

Лекарственное средство обладает отхаркивающим и противовоспалительным действием.

Механизм действия не установлен.

Фармакокинетика

Данные отсутствуют, лекарственное средство содержит различные биологически активные вещества.

Показания к применению

В качестве отхаркивающего средства в комплексной терапии воспалительных заболеваний дыхательных путей, сопровождающихся кашлем.

Применение по указанным назначениям основывается только на опыте продолжительного применения.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, детский возраст (до 18 лет), повышенное артериальное давление, холестаза, цирроз печени, гипокалиемия, хроническая почечная недостаточность.

Применение в период беременности и лактации

Применение во время беременности и лактации не рекомендуется в связи с отсутствием достаточных данных.

Способ применения и дозы

Взрослым медленно рассасывать в полости рта по 1 таблетке каждые 2 часа.

Максимальная суточная доза – 8 таблеток.

Применение лекарственного средства более 3 дней без консультации врача не рекомендуется. Если во время применения лекарственного средства симптомы заболевания сохраняются или происходит ухудшение состояния, необходимо обратиться к врачу.

Продолжительность применения определяется врачом с учетом особенностей заболевания, достигнутого эффекта и переносимости лекарственного средства.

Побочное действие



Возможны аллергические реакции. Возможно развитие расстройств со стороны желудочно-кишечного тракта: дискомфорт в области желудка, отрыжка, диспепсия, тошнота. При длительном приеме – гипокалиемия, артериальная гипертензия, нарушения сердечного ритма.

При использовании более 6 недель – псевдоальдостеронизм, редко-миоглобинурия, миопатия.

Контактная аллергия на ментол может сопровождаться появлением жжения и изъязвлений слизистой полости рта, лихеноидных высыпаний. Аллергические реакции на ментол могут сопровождаться головной болью, брадикардией, мышечным тремором, атаксией, анафилактическим шоком, эритематозной кожной сыпью. Частота не известна.

При возникновении указанных расстройств или появлении не перечисленных в данной инструкции симптомов, необходимо прекратить прием лекарственного средства и обратиться к врачу.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Не рекомендуется одновременный прием с противокашлевыми препаратами в связи с возможностью нарушения отхождения разжиженной мокроты.

Рекомендовано соблюдать осторожность при одновременном приеме препарата и сердечных гликозидов, антиаритмических лекарственных средств (например, хинидин) и лекарственных средств, вызывающих удлинение интервала QT. Одновременный прием с другими лекарственными средствами, вызывающими гипокалиемию (например, диуретики, кортикостероиды, сердечные гликозиды, слабительные средства стимулирующего действия, корень солодки), может усилить электролитный дисбаланс.

Препараты корня солодки могут препятствовать эффекту антигипертензивных средств.

В случае одновременного приема других лекарственных средств необходимо проконсультироваться с врачом.

Передозировка

Информация о случаях передозировки отсутствует.

Длительное применение лекарственного средства может привести к нарушениям водно-электролитного баланса (гипокалиемия) и сердечного ритма, артериальной гипертензии, альбуминурии и гематурии. Основные симптомы острой передозировки: сильные боли в брюшной полости спастического характера и диарея, приводящая к водно-электролитным нарушениям, образование ректальных язв, дыхательные расстройства, нарушения ритма сердца, атаксия, эпилептические судороги, потеря сознания и другие нарушения со стороны центральной нервной системы.

В случае передозировки необходимо обратиться к врачу. Лечение симптоматическое.

Особые указания

Препарат содержит 1623,5 мг сахарозы и 1037 мг декстрозы жидкой (глюкозы) в 1 таблетке, что необходимо учитывать при назначении больным сахарным диабетом, а также при гипокалорийной диете.

В связи с содержанием сахарозы и глюкозы лекарственное средство не рекомендуется пациентам с врожденной непереносимостью фруктозы, глюкозо-галактозной мальабсорбцией, сахарозной-изомальтазной недостаточностью.

Может вызывать повреждение зубов при длительном применении (от 2 недель и более).

В связи с содержанием азокрасителей (солнечный закат желтый (E110), азорубин (E122), краситель пунцовый (E124) может вызывать аллергические реакции.

Прием лекарственного средства не рекомендуется пациентам с желудочно-пищеводным рефлюксом, грыжей пищеводного отверстия диафрагмы, бронхиальной астмой, склонностью к бронхоспазму и ларингоспазму.

СОГЛАСОВАНО
МИНИСТЕРСТВОм ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Приказ Министерства здравоохранения
Республики Беларусь

4055 - 2017

Препараты солодки не рекомендуется принимать пациентам с артериальной гипертензией и сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипокалиемией, заболеваниями почек и печени, так как данные пациенты более предрасположены к неблагоприятным последствиям приема солодки.

Пациентам, принимающим корень солодки, не следует принимать другие средства, содержащие солодку, из-за риска развития серьезных побочных реакций, таких как, задержка жидкости в организме, гипокалиемия, артериальная гипертензия, нарушения сердечного ритма.

Если во время приема лекарственного средства симптомы заболевания сохраняются или происходит ухудшение состояния (развивается нарушение дыхания, повышается температура, появляется кашель с гнойной мокротой и др.), необходимо обратиться к врачу.

Не разгрызать и не проглатывать пастилку целиком.

Хранить в местах, недоступных для детей. В случае проглатывания препарата ребенком необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью.

Если лекарственное средство пришло в негодность или истек срок годности - не выбрасывайте его в сточные воды или на улицу! Поместите лекарственное средство в пакет и положите в мусорный контейнер. Эти меры помогут защитить окружающую среду!

Применение у детей

Применение у детей до 18 лет не рекомендуется в связи с отсутствием достаточных данных.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами

Исследования по оценке влияния приема лекарственного средства на способность управлять автомобилем и работать с механизмами не проводились.

Упаковка


Пастилки (со вкусом апельсина, со вкусом лимона, со вкусом малины, со вкусом клубники, со вкусом ананаса, со вкусом фруктов, со вкусом ягод)

- алюминиевый стрип по 4 пастилки; 5 алюминиевых стрипов в картонную пачку вместе с инструкцией по применению;
- блистер ал/пвх по 8 пастилок; 2 блистера в картонную пачку вместе с инструкцией по применению;
- блистер ал/пвх по 8 пастилок; 3 блистера в картонную пачку вместе с инструкцией по применению;

Условия хранения

В сухом месте при температуре не выше 30 °С.

Хранить в местах, недоступных для детей.



Срок годности

5 лет. Не использовать после истечения срока годности.

Условия отпуска из аптек: без рецепта

Производитель

«Юник Фармасьютикал Лабораториз» (Отделение фирмы «Дж. Б. Кемикалс энд Фармасьютикалс Лтд.»), Ворли, Мумбай - 400 030, Индия /

4055 - 2017

Unique Pharmaceutical Laboratories (A Division of J.B. Chemicals & Pharmaceuticals Ltd),
Worli, Mumbai 400 030, India

Организация, принимающая претензии

ООО «Джонсон & Джонсон», Россия
121614, г. Москва, ул. Крылатская, 17, корп. 2;
тел: (495) 726-55-55

СОГЛАСОВАНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Генерал-директор
Национального центра
по безопасности
лекарственных средств
и медицинских изделий
Республики Беларусь