

ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ

Индометацин Софарма, мазь для наружного применения 10%
Indometacin Sopharma, ointment for cutaneous use 10%

индометацин (indometacin)

Название лекарственного средства:

Индометацин Софарма, мазь для наружного применения 10%
 Indometacin Sopharma, ointment for cutaneous use 10%

СОГЛАСОВАНО
 МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
 РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
 Приказ Министерства здравоохранения
 Республики Беларусь
 от « 03 » 05.2018г. № 439

Международное непатентованное название (МНН): indometacin**Лекарственная форма:** мазь для наружного применения

Прочтите внимательно весь листок-вкладыш, так как он содержит важную для Вас информацию

Это лекарственное средство отпускается без рецепта врача.

Для получения наилучших результатов лечения Вам следует соблюдать инструкции к применению лекарственного средства.

- Сохраните этот листок-вкладыш, так как в дальнейшем Вам, возможно, понадобится перечитать его.
- Если Вам необходима дополнительная информация или возникнут вопросы, обратитесь за консультацией к фармацевту.
- Если через 10 дней ваше состояние не улучшается или ухудшается, Вам следует обратиться за помощью к врачу.
- Если любое побочное действие становится серьезным или у Вас появятся другие побочные действия, неописанные в этом листке-вкладыше, Вам следует обратиться за помощью к врачу.

Что содержится в этом листке-вкладыше

1. Что представляет собой Индометацин Софарма мазь и для чего используется
2. Перед тем, как использовать Индометацин Софарма мазь
3. Как применять Индометацин Софарма мазь
4. Возможные побочные действия
5. Условия хранения Индометацин Софарма мазь
6. Дополнительная информация

**1. ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ИНДОМЕТАЦИН СОФАРМА МАЗЬ
 ДЛЯ НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ И ДЛЯ ЧЕГО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ**

- Дополнительное средство в комплексной терапии острого и хронического ревматоидного артрита, остеоартрита, анкилозирующего спондилита, псориатического полиартрита, подагрического артрита;
- Локализованные формы внесуставного ревматизма опорно-двигательного аппарата: тендinitы, синовиты, тендовагинит, воспаления фасций и суставных связок, бурсит;
- Наружное симптоматическое лечение воспаления, боли и отека при посттравматических поражениях опорно-двигательного аппарата – растяжений, вывихов, ушибов.

2. ПЕРЕД ТЕМ, КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИНДОМЕТАЦИН СОФАРМА МАЗЬ ДЛЯ НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Не применяйте Индометацин Софарма мазь

- если у Вас аллергия (гиперчувствительность) к активному веществу или к какому-либо из вспомогательных ингредиентов лекарственного препарата;
- если у Вас гиперчувствительность к аспирину или другим нестероидным противовоспалительным средствам с клиническим проявлением астматического приступа, крапивницы или аллергического ринита.

Соблюдайте особую осторожность при применении Индометацин Софарма мазь для наружного применения

- если у Вас язва желудка или двенадцатиперстной кишки, сердечно-сосудистая недостаточность, заболевания печени, почек;
- если у Вас были проявления гиперчувствительности к пищевым продуктам и лекарственным препаратам;
- если Вы страдали астмой или у Вас другие аллергические заболевания;
- если у Вас гиперчувствительность к аспирину или другим противоревматическим лекарственным средствам;
- в случае кожных или других признаков гиперчувствительности применение лекарственного препарата следует прекратить;
- если лечение длится более 10 дней, рекомендуется провести лабораторный контроль лейкоцитов и тромбоцитов;
- мазь следует наносить только на здоровую кожу (при отсутствии открытых ран и повреждений);
- не наносить на глаза и слизистые оболочки.

Другие лекарственные средства и Индометацин Софарма мазь для наружного применения

Проинформируйте Вашего врача или фармацевта, если Вы принимаете или недавно принимали другие лекарственные средства, включительно и отпускаемые без рецепта.

Несмотря на то, что взаимодействие с другими лекарственными средствами маловероятно при наружном применении, уведомите Вашего врача, если принимаете аспирин или другие противовоспалительные лекарственные препараты, кортикоиды, лекарственные препараты для понижения кровяного давления.

Беременность и грудное вскармливание

Обратитесь за советом к Вашему врачу или фармацевту перед использованием любого лекарственного средства.

Не рекомендуется использование Индометацин Софарма мазь во время беременности и в период грудного вскармливания.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

Индометацин Софарма мазь является лекарственной формой для наружного применения и не влияет на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами.

Важная информация о некоторых ингредиентах Индометацин Софарма мазь для наружного применения

Индометацин Софарма мазь содержит в качестве ~~вспомогательного вещества~~ диметилсульфоксид, который может оказывать на кожу раздражающее действие. В составе препарата содержится ланолин, который может оказывать раздражающее действие на кожу (контактный дерматит).

3. КАК ПРИМЕНЯТЬ ИНДОМЕТАЦИН СОФАРМА МАЗЬ ДЛЯ НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Мазь применяют наружно, нанося на кожу.

Взрослые и дети, старше 15 лет: мазь наносят на пораженный участок 3-4 раза в день, осторожно втирая в кожу до ее полной резорбции. Количество мази, необходимое для одного нанесения, зависит от площади пораженного участка и составляет около 4-5 см. Мазь применяют с интервалом не менее 6 часов.

Продолжительность лечения: 7-10 дней.

Если за этот период симптомы не исчезают, лечение следует пересмотреть.

Дети до 15 лет: не рекомендуется применение лекарственного средства.

Если Вы в чем-то сомневаетесь, обратитесь к Вашему врачу или фармацевту.

Если Вы применили дозу Индометацин Софарма мазь, превышающую необходимую
Так как препарат применяют наружно, передозировка маловероятна. При инцидентном приеме больших количеств препарата или при попадании в глаза, на слизистые оболочки или открытые раны обратитесь к Вашему лечащему врачу или за помощью в ближайшее лечебное учреждение.

Если Вы пропустили нанесение Индометацин Софарма мазь

Если Вы пропустили нанесение одной дозы и наступило время для следующей - нанесите ее как обычно. Не применяйте двойное количество лекарственного средства при следующем применении.

Если у Вас есть дополнительные вопросы, связанные с применением этого препарата, пожалуйста, обратитесь к Вашему врачу или фармацевту.

4. ВОЗМОЖНЫЕ ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Как и все лекарственные средства Индометацин Софарма мазь может вызывать побочные действия, несмотря на то, что они проявляются не у каждого.

При наружном применении чаще всего сообщается о местных реакциях со стороны кожи после применения препарата – жжение в местах применения, покраснение, зуд, высыпания, шелушение и сухость кожи.

Редко можно наблюдать отек и образование пузырьков на коже в местах применения, аллергические реакции, такие как хрипение, удущье и отечность лица.

При проявлении вышеописанных побочных действий, применение препарата следует прекратить.

При применении на больших поверхностях кожи могут появиться такие побочные действия, как нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта (потеря аппетита, тошнота, рвота, диарея, боль, кровоизлияния и изъязвления).

Если любое из побочных действий становится серьезным или Вы заметите другие, неописанные в этом листке-вкладыше побочные действия, уведомите об этом Вашего врача или фармацевта.

5. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ИНДОМЕТАЦИН СОФАРМА МАЗЬ ДЛЯ НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

В оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °C.
Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

3 года.

Не используйте Индометацин Софарма мазь после истечения срока годности, отмеченного на упаковке.

Срок годности соответствует последнему дню указанного месяца.

Срок годности после вскрытия тубы – 6 месяцев.

Лекарственные средства не следует выбрасывать в канализацию или в контейнер для бытовых отходов. Поинтересуйтесь у Вашего фармацевта, как утилизировать ненужные Вам лекарственные средства. Эти меры будут способствовать охране окружающей среды.

Условия отпуска

Без рецепта.

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Что содержит Индометацин Софарма мазь

1 (один) грамм мази содержит:

Активное вещество: индометацин (indometacin) - 100 мг;

Вспомогательные вещества: ланолин безводный, белый мягкий парафин, диметилсульфоксид, желтый пчелиный воск, кремния диоксид коллоидный безводный, лавандовое масло.

Описание Индометацин Софарма мазь и что содержится в упаковке

Мазь гомогенная желтого цвета со специфическим запахом.

Упаковка

40 г мази дозируют в мембранные алюминиевые тубы с колпачком из полипропилена. Каждую тубу вместе с листком-вкладышем помещают в картонную пачку.

Владелец разрешения к употреблению и производитель

АО СОФАРМА

1220 София, ул. Илиенское шоссе 16, Болгария

Дата последней актуализации листка-вкладыша: март, 2018.