

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ (ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПАЦИЕНТА)

ГелоМиртол® (GeloMyrtol®)

СОГЛАСОВАНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Торговое (патентованное) название препарата: ГелоМиртол®

Приказ Министерства здравоохранения
Республики Беларусь

Международное непатентованное название: отсутствует

№ 1064

Лекарственная форма: Капсула кишечнорастворимая

№ 10 от 06.09.2018

Фармакотерапевтическая группа

Отхаркивающие средства, кроме комбинации с противокашлевыми средствами.

Код АТХ: R05C

Внимательно прочитайте данную инструкцию по применению прежде, чем начнете принимать данный лекарственный препарат, поскольку она содержит важную для вас информацию.

Всегда принимайте данный лекарственный препарат точно так, как описано в данной инструкции по применению, или по указанию своего врача или фармацевта.

- Храните данную инструкцию по применению. Возможно, вам понадобится прочитать ее снова.
- Если вам потребуется больше информации или консультация обратитесь к своему фармацевту.
- Если у вас возникают какие-либо побочные эффекты, обратитесь к своему врачу или фармацевту. Это относится к любым возможным побочным эффектам, не указанным в данной инструкции по применению. См раздел 4.
- Если вы не чувствуете себя лучше, или если вы чувствуете себя хуже через 10 дней, вам необходимо обратиться к врачу.

Содержание инструкции по применению

1. Что такое ГелоМиртол® и для чего он применяется
2. Что вам нужно знать перед началом приема ГелоМиртол®
3. Как принимать ГелоМиртол®
4. Возможные побочные эффекты
5. Как хранить ГелоМиртол®
6. Содержимое упаковки и иная информация



1. Что такое ГелоМиртол® и для чего он применяется

Данный препарат облегчает отхождение мокроты при остром и хроническом бронхите, а также облегчает симптомы синусита. Действующие вещества капсулы ГелоМиртол® способствуют разжижению и уменьшению вязкости мокроты и носоглоточного секрета и улучшают их эвакуацию.

Если вы не чувствуете себя лучше, или если вы чувствуете себя хуже через 10 дней, вам необходимо обратиться к врачу.

2. Что вам нужно знать перед началом приема ГелоМиртол®

Не принимайте ГелоМиртол®

- если у вас есть воспалительное заболевание желудка, кишечника или желчевыводящих путей, или если у вас заболевание печени тяжелой степени,
- если у вас аллергия (гиперчувствительность) на активный ингредиент или любые другие ингредиенты (перечисленные в разделе б).

ГелоМиртол® не следует принимать детям младше 6 лет.

Предостережения и меры предосторожности

Перед началом приема ГелоМиртол® проконсультируйтесь со своим врачом или фармацевтом



- Если ваши симптомы сохраняются или ухудшаются, или у вас развилась одышка или лихорадка, или если у вас появилась мокрота, содержащая кровь или гной, вам следует немедленно обратиться к врачу.
- Если вы страдаете бронхиальной астмой, коклюшем или иными респираторными заболеваниями, сопровождаемыми выраженной гиперчувствительностью дыхательной системы, вам следует принимать капсулы ГелоМиртол® после консультации со своим врачом.

Содержимое капсулы не должно использоваться для ингаляций для лечения детей.

ГелоМиртол® содержит сорбитол. Если ваш врач сказал вам, что у вас непереносимость к некоторым видам сахара, обратитесь к своему врачу прежде, чем принимать ГелоМиртол®.

Другие лекарственные препараты и ГелоМиртол®

Если препарат принимать, как рекомендовано, нет никаких известных взаимодействий с другими лекарственными препаратами.





Беременность, грудное вскармливание и фертильность

Если вы беременны или кормите грудью, или считаете, что вы беременны или планируете иметь ребенка, проконсультируйтесь со своим врачом или фармацевтом прежде, чем принимать данный лекарственный препарат.

Беременность:

Исследования на животных не показали прямого или косвенного вредного влияния на плод в утробе. Исследования на животных, а также многие годы терапевтического опыта с капсулами ГелоМиртол® не показывают прямых или косвенных вредных влияний на плод в утробе. Поэтому капсулы можно применять во время беременности, если это клинически показано. Как и с любым лекарственным препаратом во время беременности, следует проконсультироваться с врачом перед применением капсул ГелоМиртол® в этот период.

Грудное вскармливание:

Благодаря жирорастворимым свойствам активной субстанции, можно предположить, что ее компоненты также присутствуют в малых концентрациях в грудном молоке. До сих пор нет доказательства каких-либо рисков при использовании ГелоМиртол® во время грудного вскармливания.

Как и с любым лекарственным препаратом во время грудного вскармливания, следует проконсультироваться с врачом перед применением капсул в этот период.

Фертильность:

Исследования на животных не показали прямого или косвенного вредного влияния на фертильность.

Вождение машины и использование механизмов

Специальные меры предосторожности не требуются.

3. Как принимать ГелоМиртол®

Всегда принимайте данный лекарственный препарат точно по указанию своего врача или фармацевта. Если вы не уверены, проконсультируйтесь с вашим врачом или фармацевтом.

Если не предписано иное, применяйте следующие рекомендации по дозировке:

Взрослые и дети старше 12 лет с острым воспалением принимают по 2 капсулы 4-5 раз в день. Для лечения хронического воспаления принимается по 2 капсулы 3-4 раза в день.

СОГЛАСОВАНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Приказ Министерства здравоохранения
Республики Беларусь





Для детей рекомендуются следующие дозы:

Возрастные группы	6-10 лет (масса тела 20-29 кг)	10-12 лет (масса тела 30-43 кг)
Острые заболевания	По 1 капсуле 4-5 раз в день	По 1 капсуле 5 раз в день или по 2 капсулы 3 раза в день
Хронические заболевания	По 1 капсуле 3 раза в день или по 2 капсулы 2 раза в день	По 1 капсуле 4 раза в день или по 2 капсулы 2 раза в день

Как и когда следует принимать ГелоМиртол®?

Принимайте капсулы ГелоМиртол® за 30 минут до еды с большим количеством холодной жидкости. Последнюю дозу можно принять перед сном.

Как долго следует продолжать прием ГелоМиртол®?

Продолжительность лечения ГелоМиртол® зависит от симптомов. Для хронических респираторных заболеваний возможно длительное лечение.

Если Вы приняли большее количество ГелоМиртол®, чем нужно:

Проинформируйте своего врача. Он сможет принять решение о необходимости дальнейших действий. Могут возникнуть побочные эффекты, перечисленные ниже.

Если вы забыли принять ГелоМиртол®:

Не принимайте двойную дозу, чтобы восполнить пропущенную дозу. Продолжайте применять ГелоМиртол®, как предписано вашим врачом или как указано в инструкции.

Если у вас возникнут любые дальнейшие вопросы по применению данного препарата, обратитесь к своему врачу или фармацевту.


4. Возможные побочные эффекты

Как и все лекарственные средства, ГелоМиртол® может вызывать побочные эффекты, хотя они развиваются не у всех пациентов.

Используются следующие категории при установлении частоты побочных эффектов:

Очень часто:	чаще, чем у 1 из 10 пациентов, прошедших лечение
Часто:	1- 10 из 100 пациентов, прошедших лечение
Нечасто:	1-10 из 1,000 пациентов, прошедших лечение
Редко:	1-10 из 10,000 пациентов, прошедших лечение
Очень редко:	менее, чем у 1 из 10,000 пациентов, прошедших лечение
Неизвестно:	невозможно оценить частоту из имеющихся данных

СОГЛАСОВАНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Приказ Министерства здравоохранения
Республики Беларусь





НД РБ

59 53 - 2017

Возможные побочные эффекты:

Часто: боли в желудке и животе.

Нечасто: аллергические реакции (такие как одышка, отечность лица, сыпь, крапивница, зуд); гастрит и гастроэнтерит, тошнота, рвота, диарея или другие расстройства пищеварения; изменение вкуса; головные боли или головокружения.

Очень редко: приведение в движение имеющихся почечных и желчных камней.

Неизвестно (частота не установлена): тяжелые анафилактические реакции.

Сообщение о побочных эффектах

Если у вас возникли побочные эффекты, обратитесь к своему врачу или фармацевту. Это относится к любым возможным побочным эффектам, не указанным в данной инструкции по применению.

5. Как хранить ГелоМиртол®

Хранить в оригинальной упаковке для защиты от влаги, при температуре не выше 25°C.

Хранить в недоступном для детей месте.

Не применять данный лекарственный препарат после истечения срока годности, указанного на коробке и блистере после слов «Годен до». Истечения срока годности относится к последнему дню указанного месяца.

Срок годности: 3 года

6. Содержимое упаковки и другая информация

Активный ингредиент: одна капсула содержит 120 мг дистиллята смеси очищенных эфирных масел эвкалипта, сладкого апельсина, мирта и лимона (66:32:1:1).

Другие ингредиенты:

Среднецепочечные триглицериды, желатин, глицерин, сорбитол, 13% раствор кислоты хлористоводородной, гипромеллозы ацетата сукцинат, триэтилцитрат, натрия лаурилсульфат, тальк, декстрин, аммония глицирризинат.

Как выглядит ГелоМиртол® и содержимое упаковки

Мягкие овальные полупрозрачные желатиновые капсулы, бежевого цвета.

В упаковке 20 капсул кишечнорастворимых. По 10 капсул в блистере. 2 блистера и инструкция по применению в складной коробке.

Держатель регистрационного удостоверения и изготовитель

Г. Поль-Боскамп ГмБХ & Ко. КГ
Килер Штрассе 11
25551 Хохенлохштедт
Германия

Условия отпуска из аптек

Без рецепта.

Данная инструкция по применению была в последний раз пересмотрена в октябре 2016 года

