

ЛИСТОК ВКЛАДЫШ: ИНФОРМАЦИЯ К ПОТРЕБИТЕЛЮ

НАЗВАНИЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА

СЕРДЕЧНЫЕ КАПЛИ КАРДОМЕД



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Прозрачный раствор коричневого цвета, горьковато-сладкого вкуса, с запахом валерианы. В процессе хранения возможно выпадение осадка.

СОСТАВ ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА

В 1 мл содержится:

Настойка из корней Валерианы лекарственной (<i>Valeriana officinalis</i>) 1:5 (экстрагент 70 % (об/об) этанол),	0.34 мл
Настойка из ягод Боярышника (<i>Crataegus oxyacantha</i>) 1:10 (экстрагент 70 % (об/об) этанол),	0.33 мл
Настойка из травы Пустырника сердечного (<i>Leonurus cardiaca</i>) 1:5 (экстрагент 70 % (об/об) этанол).	0.33 мл

Лекарственное средство содержит не менее 64 об. % этанола.

В 1 мл раствора содержится примерно 22 капли.

Международное непатентованное название: отсутствует.

ФОРМА ВЫПУСКА

Капли для приема внутрь.

КОД КЛАССИФИКАЦИИ

Фармакотерапевтическая группа по АТС: N05CM

Прочие снотворные и седативные препараты (Other hypnotics and sedatives).

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Лекарственное средство представляет комбинацию настоек корня валерианы, травы пустырника и плодов боярышника.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ


В комплексной терапии функциональных нарушений нервной системы (неврастения и нарушения сна); в комплексной терапии функциональных нарушений сердечной деятельности.

Применение по указанным назначениям основывается только на опыте продолжительного применения.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ

Первые 3-4 дня принимать по 20-30 капель 3-4 раза в день, потом дозу уменьшить до 15-20 капель 2-3 раза в день.

Если во время приема лекарственного средства симптомы сохраняются, необходимо обратиться к врачу. Длительность курса лечения определяется врачом с учетом особенностей заболевания, достигнутого эффекта и переносимости лекарственного средства.



Применение у детей

В связи с отсутствием достаточных данных лекарственное средство не рекомендовано для назначения детям до 18 лет.

Перед употреблением взбалтывать.

Перед приемом капли следует растворить в небольшом количестве воды (50 мл).

Для правильного дозирования препарата рекомендуется держать флакон-капельницу под наклоном 45 градусов.

ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ

Возможно развитие аллергических реакций (кожная сыпь, зуд, гиперемия, отек кожи).

Возможно возникновение головной боли, общей слабости, головокружения, снижения работоспособности, сонливости, раздражительности, тревожности, желудочно-кишечных расстройств (изжога, тошнота, отрыжка, боли в животе), артериальной гипотензии.

Большие дозы могут привести к брадикардии и аритмии, а также снижению моторики кишечника (запор).

В случае возникновения побочных реакций, в том числе не указанных в инструкции по применению, необходимо прекратить прием лекарственного средства и обратиться к врачу.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Повышенная чувствительность к компонентам лекарственного средства; артериальная гипотензия, брадикардия; язвенная болезнь желудка и/или двенадцатиперстной кишки, эрозивный гастрит в фазе обострения; беременность, период лактации; детский возраст до 18 лет.

В связи с содержанием этилового спирта лекарственное средство не следует принимать пациентам с заболеваниями печени, алкоголизмом, эпилепсией, черепно-мозговой травмой и другими заболеваниями головного мозга со снижением судорожного порога.

ПЕРЕДОЗИРОВКА

Симптомы. Хроническая передозировка вызывает чувство угнетенности, головную боль, сонливость, дискомфорт со стороны желудочно-кишечного тракта, тошноту, снижение работоспособности, артериальную гипотензию, нарушение сердечной деятельности (брадикардию). Острая передозировка может вызвать алкогольную интоксикацию, появление болей в животе спастического характера, чувства стеснения в груди, головокружения, трепора рук и расширения зрачков.

Лечение. В случае появления симптомов передозировки необходимо прекратить прием лекарственного средства и обратиться к врачу. При острой передозировке необходимо провести индукцию рвоты, промывание желудка. Симптоматическая терапия.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Лекарственное средство не рекомендовано для назначения детям до 18 лет.

Лекарственный препарат содержит не менее 64 об. % этанола, то есть 459,2 мг на разовую дозу (20 капель), что равно 11,6 мл пива, 4,9 мл вина на дозу. Вреден для лиц с алкоголизмом. В связи с содержанием этилового спирта лекарственное средство не следует принимать беременным и кормящим женщинам, детям до 18 лет, а также пациентам с заболеваниями печени, алкоголизмом, эпилепсией, черепно-мозговой травмой и другими заболеваниями головного мозга со снижением судорожного порога.

Перед приемом лекарственного средства необходима консультация врача. Во время лечения необходим контроль артериального давления и электрокардиограммы.

Если во время лечения симптомы сохраняются или происходит ухудшение состояния,

развиваются отеки нижних конечностей, необходимо обратиться к врачу. Необходима немедленная медицинская помощь при возникновении боли в области сердца с иррадиацией в руку, верхнюю часть живота, шею, или в случае развития дыхательной недостаточности (например, одышка).

Из-за постепенного развития эффекта лекарственное средство не рекомендовано применять в случаях экстренной необходимости уменьшения симптомов психического возбуждения и нарушений сна.

Применение в период беременности и кормления грудью

В связи с отсутствием достаточных данных и содержанием этилового спирта принимать во время беременности и лактации противопоказано.

Влияние на способность управлять автотранспортом и работу с движущимися механизмами

Лекарственное средство содержит этиловый спирт! В период лечения необходимо отказаться от управления транспортными средствами и занятия другими потенциально опасными видами деятельности, требующими быстроты психомоторных реакций.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ

Если Вы принимаете какие-либо лекарственные средства, обязательно сообщите об этом врачу!

Не рекомендуется одновременное применение с антиаритмиками III класса, с цизапридом. Лекарственное средство может усиливать действие седативных, снотворных, анксиолитических, кардиотонических, спазмолитических, анальгезирующих и других лекарственных средств, угнетающих центральную нервную систему.

Комбинация лекарственного средства с синтетическими седативными средствами требует медицинского наблюдения.

Необходимо избегать одновременного применения других лекарственных средств, содержащих этиловый спирт.

Взаимодействия, связанные с наличием в составе этилового спирта:

- лекарственные средства, вызывающие дисульфирамоподобную реакцию (ощущение жара, покраснение кожных покровов, рвота, тахикардия) при совместном приеме с алкоголем: дисульфирам, цефамандол, цефоперазон, латамоксифен, хлорамфеникол, хлорпропамид, глибенкламид, глипизид, толбутамид и другие гипогликемические препараты, гризофульвин, метронидазол, орнидазол, тинидазол, кетоконазол, прокарбазин;
- лекарственные средства, угнетающие функции центральной нервной системы.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в плотно закрытом флаконе в защищенном от света месте при температуре не выше 25 °C.

Хранить в недоступном для детей месте.

СРОК ХРАНЕНИЯ


4 года. Не использовать после срока годности, указанного на упаковке.

УСЛОВИЯ ОТПУСКА

Без рецепта врача.

УПАКОВКА

По 50 мл во флаконе из темного стекла, снабженном полиэтиленовой капельницей.



НД РБ

6120 - 2018


навинчивающейся пластиковой крышкой с контролем первого вскрытия. Каждый флакон помещается в картонную пачку вместе с инструкцией по применению.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ЗАО «Валентис», шс. Молету 11, 08409 Вильнюс, Литва,
тел. +37052701225, факс +370 5 2701223

ВЛАДЕЛЕЦ ЛИЦЕНЗИИ

ЗАО «Валентис», шс. Молету 11, 08409 Вильнюс, Литва,
тел. +37052701225, факс +370 5 2701223



Kvalifikuotas asmuo
farmakologiniams budrumui
Greta Astrauskaitė

