


7237 - 2019

Листок-вкладыш – информация для пациента

Боботик, 66,66 мг/мл, капли для приема

Симетикон



Перед приемом препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для вас сведения.

1. *Всегда принимайте препарат в точности с листком-вкладышем или рекомендациями лечащего врача, работника аптеки или медицинской сестры.*
2. *Сохраните листок-вкладыш. Возможно, вам потребуется прочитать его еще раз.*
3. *Если вам нужны дополнительные сведения или рекомендации, обратитесь к работнику аптеки.*
4. *Если у вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу, работнику аптеки или медицинской сестре. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.*
5. *Если состояние не улучшается или оно ухудшается, вам следует обратиться к врачу.*

Содержание листка-вкладыша:

1. Что из себя представляет препарат Боботик, и для чего его применяют.
2. О чем следует знать перед приемом препарата Боботик.
3. Прием препарата Боботик.
4. Возможные нежелательные реакции.
5. Хранение препарата Боботик.
6. Содержимое упаковки и прочие сведения.

1. Что представляет собой препарат Боботик, и для чего его применяют.

Действующим веществом препарата Боботик является симетикон, соединение, которое уменьшает поверхностное натяжение, облегчая выделение газов. Симетикон препятствует образованию крупных газово-слизистых конгломератов, вызывающих болезненное вздутие живота. Вздутие может возникать, в частности, в результате заглатывания воздуха во время еды, употребления трудно перевариваемых блюд, приема антацидов (особенно тех, которые содержат карбонаты).

Симетикон после перорального приема не всасывается из желудочно-кишечного тракта и выводится из организма в неизменном виде с фекалиями.

Показания к применению:

- Для симптоматического лечения состояний, сопровождающихся чрезмерным скоплением газов в желудочно-кишечном тракте (ощущение переполнения в брюшной полости, длительное вздутие живота, послеоперационный метеоризм);
- В качестве вспомогательного средства при подготовке пациентов к диагностическим исследованиям органов брюшной полости, таким как рентгенологические и ультразвуковые исследования, а также к эндоскопическому исследованию желудка и двенадцатиперстной кишки.

2. О чем следует знать перед приемом препарата Боботик.

Не принимайте препарат Боботик:

- Если у вас наблюдается повышенная чувствительность к симетикону или к какому-либо вспомогательному веществу (перечислены в разделе 6 Листка-вкладыша).
- Если у вас диагностированы кишечная непроходимость или обструктивные заболевания ЖКТ.
- Боботик противопоказан детям в возрасте до 28 дней.

Другие препараты и препарат Боботик

Сообщите лечащему врачу или работнику аптеки о том, что вы принимаете, недавно принимали или можете начать принимать какие-либо другие препараты.

Симетикон предположительно может нарушать всасывание пероральных антикоагулянтов (препаратов, разжижающих кровь).

Применение симетикона может давать ложноположительные результаты диагностических тестов с применением гваяковой смолы, однако не влияет на результаты быстрого уреазного теста (диагностика *Helicobacter pylori*). Если вам предстоит прохождение таких лабораторных тестов, сообщите работнику лаборатории, что применяли препарат Боботик.

Левотироксин может связываться с симетиконом. Если вы или ваш ребенок получаете лечение от заболеваний щитовидной железы, сообщите об этом вашему лечащему врачу. При одновременном приеме препарата Боботик и левотироксина всасывание левотироксина может нарушаться.

Препарат Боботик с пищей и напитками

При применении препарата Боботик не следует употреблять газированные жидкости.

Беременность и грудное вскармливание

Если вы беременны или кормите грудью, думаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или фармацевтом.

Отсутствуют контролируемые исследования по применению у женщин во время беременности и грудного вскармливания.

Препарат можно использовать во время беременности только в тех случаях, когда, по мнению врача, польза для матери превышает потенциальный риск для плода.

Отсутствуют данные о применении в период грудного вскармливания.


Управление транспортными средствами и работа с механизмами

Препарат Боботик не оказывает влияния на способность к управлению транспортными средствами и обслуживанию механизмов.

Препарат Боботик содержит метилпарагидроксибензоат и пропилпарагидроксибензоат.

Есть литературные данные, что в редких случаях эти вещества могут вызывать аллергические реакции (возможно замедленного типа).

3. Прием препарата Боботик.



Всегда принимайте препарат в полном соответствии с листком-вкладышем или рекомендациями лечащего врача, работника аптеки или медицинской сестры. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом, работником аптеки или медицинской сестрой.

Симптоматическое лечение состояний, сопровождающихся чрезмерным скоплением газов в желудочно-кишечном тракте:

- Дети от 28 дней до 3 лет - 8 капель (20 мг симетикона) 4 раза в день
- Дети от 3 до 6 лет - 14 капель (35 мг симетикона) 4 раза в день
- Дети старше 6 лет и взрослые - 16 капель (40 мг симетикона) 4 раза в день

Препарат обычно применяется три раза в день после приема пищи и перед сном.

Подготовка к диагностическим исследованиям:

Рентгенографическое и ультразвуковое исследование желудочно-кишечного тракта

Накануне исследования:

Дети от 28 дней до 3 лет - 10 капель (25 мг симетикона) два раза в день

Дети от 3 до 6 лет - 16 капель (40 мг симетикона) два раза в день

Дети старше 6 лет и взрослые - 20 капель (50 мг симетикона) два раза в день

В день исследования утром, натощак, следует принять дозу препарата однократно.

Способ применения

Для внутреннего применения.

1 мл продукта содержит около 27 капель.

Перед употреблением следует взболтать до получения однородной эмульсии. Для точного дозирования препарата во время отсчитывания капель флакон следует держать вертикально.

Перед применением Боботик можно смешивать с небольшим количеством охлажденной кипяченой воды, детским питанием или негазированной жидкостью.

Продукт не содержит сахара, его могут использовать пациенты с сахарным диабетом.

Лечение следует продолжать до исчезновения симптомов.

Вскрытую упаковку следует использовать в течение 2 месяцев.

Если вы приняли препарата Боботик больше, чем следовало

Не описаны случаи передозировки или отравления препаратом.

В случае приема большей дозы лекарственного препарата, чем рекомендуемая, следует обратиться к лечащему врачу или работнику аптеки.

Если вы забыли принять препарат Боботик

Не принимайте двойную дозу, чтобы компенсировать пропущенную дозу.

При наличии вопросов по применению препарата обратитесь к лечащему врачу, работнику аптеки или медицинской сестре.


4. Возможные нежелательные реакции

Подобно всем лекарственным препаратам препарат Боботик может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

Не отмечено побочных действий, связанных с применением препарата Боботик.

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом, работником аптеки или медицинской сестрой. Данная рекомендация



распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях в информационную базу данных по нежелательным реакциям на лекарственные препараты, включая сообщения о неэффективности лекарственных препаратов, выявленным на территории государства-члена. Сообщая о нежелательных реакциях, вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

5. ХРАНЕНИЕ ПРЕПАРАТА БОБОТИК

Храните препарат в местах недоступных и не видимых для детей.

Хранить в оригинальной упаковке при температуре от 15°C до 25°C.

Срок годности 3 года.

Вскрытую упаковку следует использовать в течение 2 месяцев.

Не применяйте препарат после истечения срока годности, указанного на картонной пачке и флаконе. Датой истечения срока годности является последний день месяца. Не выливайте препараты в канализацию. Уточните у работника аптеки, как избавиться от препаратов, которые больше не потребуются. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

6. СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ И ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ

Препарат Боботик содержит

Действующим веществом является симетикон (диметикон активированный двуокисью кремния) 66,66 мг/мл.

Вспомогательными веществами являются: натрия сахаринат (E 954), метилпарагидроксибензоат (E 218), пропилпарагидроксибензоат (E 216), кармеллоза натрия, лимонной кислоты моногидрат (E 330), ароматизатор малиновый, вода очищенная.

Внешний вид препарата Боботик и содержимое упаковки

Густая, непрозрачная жидкость белого или почти белого цвета с фруктовым запахом. По 30 мл во флаконы из темного стекла с полиэтиленовой пробкой-капельницей и завинчивающейся полиэтиленовой крышкой.

Флакон, снабженный этикеткой и листком-вкладышем, помещен в индивидуальные картонные коробки.

Условия отпуска

Отпускается без рецепта.

Держатель регистрационного удостоверения и производитель

Медана Фарма АО

98-200 Серадз

ул. В. Локетка 10

Польша