



по медицинскому применению препарата

ПИМАФУЦИН® (PIMAFCIN®)

Торговое название: ПИМАФУЦИН®

Международное непатентованное название: натамицин

Лекарственная форма: крем для наружного применения

Состав:

1 г крема содержит:

активные ингредиенты: натамицин 20 мг.

вспомогательные вещества: цетостеариловый спирт, натрия лаурилсульфат, пропиленгликоль, воск цетилэфирный, децилолеат, метилпарагидроксibenзоат, пропилпарагидроксibenзоат, вода очищенная.

Описание: крем от белого до светло-желтого цвета.

Фармакотерапевтическая группа: противогрибковые препараты для местного применения; антибиотики.

Код АТХ: D01AA02

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Фармакодинамика

Механизм действия

Натамицин является полиеновым антибиотиком фунгицидного действия, связывает стеролы клеточных мембран, нарушая их целостность и функции, что приводит к гибели микроорганизмов. Дрожжевые грибы рода *Candida albicans* чувствительны к действию натамицина.

Фармакокинетика

Всасывание

Натамицин активен локально и практически не всасывается кожей или слизистыми оболочками после применения.

Показания к применению

Кожные инфекции, вызванные *Candida albicans*.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения дозы

Крем наносят на пораженную поверхность кожи 1 или несколько (до 4-х) раз в сутки.

Крем следует наносить на пораженную кожу от одного до нескольких раз в день (4 раза).

Лечение кандидоза кожи занимает, в среднем, 2-3 недели.

Побочные действия

Системно-органные классы	Редкий ($\geq 1/10000$, $< 1/1000$)
Нарушения общего состояния и связанные со способом нанесения препарата	Реакции гиперчувствительности, жжение, раздражение

Реакции гиперчувствительности: в месте нанесения может возникнуть жжение или раздражение.

Если симптомы сохраняются длительное время, они могут быть проявлениями реакции гиперчувствительности на консерванты в составе препарата.

Сообщение о нежелательных побочных реакциях

Если у вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях в информационную базу данных по нежелательным реакциям (действиям) на лекарственные препараты, включая сообщение о неэффективности лекарственных препаратов. Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

Взаимодействие с лекарственными средствами

Неизвестны.

Особые предупреждения и меры предосторожности при использовании

Отсутствуют.

Беременность и лактация

Насколько известно, крем Пимафуцин может применяться во время беременности и кормления грудью без какой-либо опасности для плода или ребенка.

7879 - 2021

Влияние препарата на способность управлять транспортными средствами и работать с опасными механизмами

Препарат не оказывает влияния на способность управлять транспортными средствами и работать с опасными механизмами.

Передозировка препарата

Нет подробностей.

Форма выпуска

Крем для наружного применения 2% в тубах алюминиевых или пластиковых по 30 г. По 1 тубе вместе с инструкцией по применению в пачке картонной.

Условия хранения

При температуре 15-25 °С, в недоступном для детей месте.

Срок годности

3 года. Не использовать по истечении срока годности.

Условия отпуска из аптек

По рецепту врача.

Владелец регистрационного документа

ЛЕО Фарма А/С, Дания

Индустрипаркен 55, ДК-2750 Баллеруп, Дания

Производитель

«Теммлер Италия С.р.Л.», Виа деле Индустри, 2,

20061 Каругате, Милан, Италия