

ИНСТРУКЦИЯ
 по медицинскому применению препарата
ПЕПСАН-Р

Торговое название: ПЕПСАН-Р

Лекарственная форма: гель для приема внутрь

Состав на 1 саше (10 г)

Действующие вещества:

Диметикон.....	3,000 г
Гвайазулен.....	0,004 г

СОГЛАСОВАНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Приказ Министерства здравоохранения
Республики Беларусь
от « 08 10 2019 № 1205

Вспомогательные вещества:

Сорбитол 70% кристаллизуемый.....	1,429 г
(Соответствующее количество сорбита.....	1,000 г
Каррагенаты	0,130 г
Цикламат натрия	0,012 г
Метилпарагидроксибензоат	0,015 г
Масло мяты перечной	0,003 г
Очищенная вода	5,407 г

Описание

Гель голубого цвета с мятным запахом.

Фармакотерапевтическая группа

Средства для лечения функциональных расстройств желудочно-кишечного тракта.

Код АТХ: A03AX

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Комбинированный препарат. Оказывает противовоспалительное действие, уменьшает газообразование в кишечнике.

Гвайазулен – обладает противовоспалительным эффектом, усиливает регенеративные процессы.

Диметикон – гидрофобное полимерное вещество с низким поверхностным натяжением, снижающее газообразование в кишечнике и покрывающее защитной пленкой стенки пищеварительного канала, обладает противовспенивающим действием.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Гастралгия (в качестве симптоматического средства), функциональные расстройства желудочно-кишечного тракта, проявляющиеся метеоризмом.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

БЕРЕМЕННОСТЬ И ГРУДНОЕ ВСКАРМЛИВАНИЕ

Возможно применение в период беременности и грудного вскармливания.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ

Внутрь. Принимать содержимое от 1 до 2 пакетиков 2-3 раза в сутки перед едой (курс лечения определяется индивидуально), либо в случае возникновения боли.

НД РБ

8050 - 2016

СОГЛАСОВАНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Приказ Министерства здравоохранения
Республики Беларусь

Дети

Препарат не рекомендуется для применения в педиатрической практике, в связи с недостаточностью данных по эффективности и безопасности.

ПОБОЧНЫЕ РЕАКЦИИ

В редких случаях возможны аллергические реакции, такие как сыпь, зуд кожи, боли и вздутие живота.

ПЕРЕДОЗИРОВКА

Возможно усиление побочных реакций.

ЛЕКАРСТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И ДРУГИЕ ВИДЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Не выявлено.

ВЛИЯНИЕ НА СПОСОБНОСТЬ УПРАВЛЯТЬ АВТОТРАНСПОРТОМ И РАБОТАТЬ С МЕХАНИЗМАМИ

Не выявлено.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Препарат не содержит сахара и поэтому не противопоказан лицам, страдающим сахарным диабетом. ПЕПСАН-Р не обладает рентгенконтрастными свойствами.

В состав препарата входит сорбитол, поэтому не следует принимать данный препарат пациентам с редкой наследственной непереносимостью фруктозы.

Это лекарственное средство содержит метилпарагидроксибензоат и может вызвать аллергические реакции.

Если симптомы заболевания сохраняются или состояние ухудшается, рекомендуется обратиться к врачу.

ФОРМА ВЫПУСКА

Гель для приема внутрь. По 10 г геля в саше из многослойного материала (отбеленная крафт-бумага/полиэтилен низкой плотности/алюминиевая фольга/полиэтилен низкой плотности). По 30 саше вместе с инструкцией по применению в картонной пачке.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

При температуре не выше 25 °C в недоступном для детей месте.

СРОК ГОДНОСТИ

2 года. Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

УСЛОВИЯ ОТПУСКА ИЗ АПТЕК

Без рецепта.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Фарматис

Zone d'Activites Est n1 –BP20

60190 Estrees-Saint-Denis,

Франция

ДЕРЖАТЕЛЬ РУ И ВЫПУСК СЕРИИ

Лаборатории РОЗА-ФИТОФАРМА, Франция.