

## Инструкция

для пациентов по медицинскому применению препарата  
**ЭНТЕРОЖЕРМИНА® / ENTEROGERMINA®**

*Внимательно прочитайте этот листок-вкладыш, прежде чем начать прием препарата. Если у Вас возникнут дополнительные вопросы, проконсультируйтесь с Вашим лечащим врачом.*

*Этот препарат предназначен для Вас. Не следует передавать его другим людям. Это может нанести вред их здоровью, даже если симптомы их заболевания схожи с теми, которые наблюдаются у Вас.*

*Сохраняйте этот листок-вкладыш. Вам может понадобится прочитать его еще раз.*

**Торговое название препарата:** Энтерожермина® / Enterogermina®.

**Международное непатентованное название:** отсутствует.

**Лекарственная форма:** суспензия для приема внутрь

**Состав**

В одном флаконе (5 мл) содержится:

*активное вещество:* споры *Bacillus clausii*, полирезистентные к антибиотикам – 2 миллиарда;

*вспомогательное вещество:* вода очищенная – до 5 мл.

**Описание:** опалесцентная, беловатая жидкость с характерным запахом.

**Фармакотерапевтическая группа:** Антидиарейные микроорганизмы.

**Код АТХ:** A07FA.

**Показания к применению**

Лечение и профилактика кишечного дисбактериоза и последующего эндогенного дисвитаминоза.

Лечение по восстановлению кишечной микробной флоры, изменённой в ходе лечения антибиотиками или химиотерапевтическими средствами.

Острые и хронические желудочно-кишечные расстройства у младенцев и детей младшего возраста, характерные для интоксикации или кишечного дисбактериоза и авитаминоза.

**Дозировка и способ применения**

**ТОЛЬКО ДЛЯ ПРИЕМА ВНУТРЬ.  
 НЕ ВВОДИТЬ ИНЪЕКЦИОННО!**

**ПРЕПАРАТ СЛЕДУЕТ ВЫПИТЬ!**

**Не принимать никаким другим способом!**

**Дозировка**

**Взрослым:** 2-3 флакона в день, если иное не прописано лечащим врачом.

Рекомендуемые интервалы между приемами однократной дозы препарата (1 флакона) составляют 3-4 часа.




**Младенцам (от 3-х недель) и детям:** 1-2 флакона в день, если иное не прописано лечащим врачом

Если суточная доза препарата составляет один флакон в день, препарат должен быть принят один раз в день (1 флакон принимается целиком). Если суточная доза превосходит 1 флакон, рекомендуемые интервалы между приемами однократной дозы препарата (1 флакона) составляют 3-4 часа.

Лечащий врач, используя другие дозировки препарата, может рекомендовать иную суточную дозировку, в зависимости от состояния пациента.

### **Способ применения**

Оторвите один флакон от ленты флаконов. Встряхните флакон. Проверните верхнюю часть флакона по часовой стрелке и оторвите её. Вылейте содержимое флакона в подслащённую воду, молоко, чай или апельсиновый сок или выпейте препарат без предварительного разбавления.



### **Противопоказания**

Повышенная чувствительность к действующему веществу или какому-либо из ингредиентов препарата.

### **Особые указания и предосторожности применения**

#### **Особые указания**

- В случае использования Энтерожермины во время курса антибиотикотерапии, рекомендуется принимать препарат между двумя последовательными приемами дозы антибиотика (например, через 2-3 часа после приема антибактериального препарата)
- .Возможное наличие видимых включений во флаконах Энтерожермины® обусловлено агрегатами спор *Bacillus clausii*, поэтому оно не означает, что препарат претерпел изменения.
- Встряхивайте флакон перед применением.

### **Меры предосторожности**

**ТОЛЬКО ДЛЯ ПРИЕМА ВНУТРЬ! НЕ ВВОДИТЬ ИНЪЕКЦИОННО!  
ПРЕПАРАТ СЛЕДУЕТ ВЫПИТЬ!**


**Не принимать никаким другим способом!**

При неправильном применении лекарственного средства возможно развитие тяжелых аллергических реакций, таких как анафилактический шок

Не храните препарат после вскрытия флакона, чтобы избежать загрязнения суспензии.

### **Беременность и грудное вскармливание**

Прием данного лекарственного препарата не противопоказан во время беременности и



грудного вскармливания.

#### **Побочное действие**

При постмаркетинговых исследованиях выявлены следующие возможные побочные реакции:

- аллергические реакции: такие, как сыпь и крапивница;
- заболевания кожи и подкожной клетчатки: ангионевротический отек.

#### **Передозировка**

На настоящий момент клинических проявлений передозировки не зарегистрировано.

#### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие формы взаимодействия**

Лекарственные взаимодействия в результате одновременного приема с другими лекарственными средствами не известны.

#### **Влияние на способность управлять транспортными средствами или другими механизмами**

Препарат не влияет на способности, необходимые для управления транспортными средствами и машинным оборудованием.

#### **Форма выпуска**

По 5 мл во флаконе из полиэтилена. По 10 или 20 флаконов вместе с инструкцией по применению в картонной пачке.

#### **Условия хранения**

Хранить при температуре не выше 30 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

#### **Срок годности**

2 года.

После вскрытия флакона лекарственное средство должно быть использовано незамедлительно во избежание загрязнения суспензии.

#### **Условия отпуска из аптек**

Без рецепта.

#### **Производитель**

Санофи С.П.А., Италия.

#### **Адрес производства:**

viale Europa 11  
21040 Origgio (VA)  
ИТАЛИЯ